

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 2974		Société : MUPRAS	
<input type="checkbox"/> Actif <input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)		<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : ABBAO ABDELHAI			
Date de naissance : 23-4-1952			
Adresse : 79, Bd Ibn Tacheefine Apt 600			
Tél. : 0660 4890 96 Total des frais engagés : Dhs			

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : 10/07/2023			
Nom et prénom du malade : ABBAO ABDELHAI Age: <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Lien de parenté :			
Nature de la maladie : trouble psychiatrique			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **RS**

Signature de l'adhérent(e) : **(Signature)**

Le : **10/07/2023**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/07/2023	consult		3.000H	INP : 1111622614
	pay			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE A. HEDKA Dr. A. H. Hedka Ch. El Hedka Route de M... 36	10/07/23	231,00

ANALYSES - RADIographies

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée et l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>											
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>											
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>											
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>											
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>											
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	<p>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">H</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">D</td><td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">25533412 21433552</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">00000000 00000000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">B</td><td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">00000000 00000000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">G</td><td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">35533411 11433553</td></tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				H		D	25533412 21433552		00000000 00000000	B	00000000 00000000	G	35533411 11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
H															
D	25533412 21433552														
	00000000 00000000														
B	00000000 00000000														
G	35533411 11433553														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>											
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>											
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>											

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. CHEKIRA Asmae

PSYCHIATRE
PSYCHOTHÉRAPEUTE

Lauréate de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

Ancien Médecin au CHU Hassan II de Fès

Ancien Médecin à l'Hôpital IBN AL HASSAN de Fès

Diplômée en Thérapie Cognitive et Comportementale

Psychiatrie de l'enfant, l'adolescent, l'adulte
et le sujet âgé - Psychothérapie - Addictologie

Troubles du sommeil



الدكتورة شقيره أسماء

طبيبة أخصائية في الأمراض النفسية والعقلية

محلجة نفسية

خريجة كلية الطب والصيدلة بفاس

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس

طبيبة سابقة بمستشفى ابن الحسن بفاس

دبلوم في العلاج المعرفي السلوكي

الطب النفسي للأطفال والراهقين. الكبار
والأشخاص المسنون - العلاج النفسي - طب الإدمان
اضطرابات النوم

Nom et Prénom : Abdelhakim Abbaodi Fès, le : 10/02/2023

Dr. AMARANI SOUTE SANIA
Lotiss. El Hadjik 2 - N° Q2/214
Route de Meknès - FES
Tel. 05 35 69 64 99

1555



Dr. AMARANI
SOUTE SANIA
Lotiss. El Hadjik
Route de Meknès - FES
Tel. 05 35 69 64 99

4mn

387 x 2) 774,00 - 0 - 0

(512 x 3) 153,60

2) Risperidone GT 2



0 - 0 - 1/2 tt d

4mn

231,00

PHARMACIE AL MARINA
Dr. AMARANI SOUTE SANIA
Lotiss. El Hadjik 2 - N° Q2/214
Route de Meknès - FES
Tel. 05 35 69 64 99

CHEKIRA ASMAE
Centre Psychothérapie
Anzarane Idrissia
Bureau N° 6 - Atlas - Fès (Ancien Moulins Idrissia)
Tel. 05 35 73 44 16 / 06 56 03 13 27

شارع بئر أنزان . مكاتب الأدرسية. الطابق الأول. مكتب رقم 6. أطلس - فاس . (مطاحن الأدرسية سابقا)

Av. Bir Anzarane - Bureaux Idrissia , 1^{er} Etage, Bureau N° 6 - Atlas - Fès (Ancien Moulins Idrissia)

05 35 73 44 16 ● 06 56 03 13 27 ● cabinetdrchekira@gmail.com

RDU,

vendredi 10 novembre 2023

9 : 30

NOTICE : INFORMA



6 118001 040384
LAROXYL 25 mg
(Chlorhydrate d'amitriptyline)
60 comprimés pelliculés
BOTTU S.A. PPV: 38 DH 70

Laroxyl 25 Amitriptyline



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE – code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament sert à :

Énurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'enurésie.

Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent altérer l'action d'autres médicaments et cela peut parfois entraîner des effets indésirables graves. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, tel que :

- des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAQ) par

psychiatriques.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments vous pourriez avoir besoin d'une dose différente de rispéridone.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précède s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser RISPERIDONE GT[®].

ALIMENTS ET BOISSONS

Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture. Vous devez éviter de boire de l'alcool pendant le traitement par RISPERIDONE GT[®].

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives.

Sans objet.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

• Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez le prendre.

• Les symptômes suivants peuvent apparaître chez les nouveau-nés dont les mères ont utilisé RISPERIDONE GT[®] durant le dernier trimestre (les trois derniers mois de leur grossesse) : tremblement, raideur et/ou faiblesse musculaire, endormissement, agitation, problème de respiration et difficultés à s'alimenter. Si votre bébé développe l'un de ces symptômes, vous devez contacter votre médecin.

• RISPERIDONE GT[®] peut augmenter votre taux d'une hormone appelée « prolactine » qui peut avoir un impact sur la fertilité.

Sportifs
Sans objet.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE UN VÉHICULE OU À UTILISER DES MACHINES :

Des sensations de vertige, une fatigue et des problèmes de vision peuvent survenir au cours du traitement par RISPERIDONE GT[®]. Vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines avant d'en avoir parlé avec votre médecin.

RISPERIDONE GT[®] contient du lactose

RISPERIDONE GT[®] contient du lactose (un type de sucre). Si vous avez été informé par votre médecin que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE RISPERIDONE GT[®] ?

vos yeux, yeux rougissants, formation de croûtes au niveau du bord des paupières, écoulement oculaire.

Si vous présentez une réaction allergique à la cataracte, un état appelé syndrome de l'iris hypertonique peropératoire (SIHP), contactez votre ophtalmologue. Si vous avez besoin d'une chirurgie de la cataracte, informez votre ophtalmologue que vous prenez ou avez pris RISPERIDONE GT[®]. Si vous avez besoin d'une chirurgie de la cataracte, informez votre ophtalmologue que vous prenez ou avez pris ce médicament.

Nombre dangereusement faible d'un certain type de globules blancs dans vos sangs.

Réaction allergique sévère caractérisée par de la fièvre, la bouche sèche, la vision floue, la peau rose ou rouge, une éruption cutanée et peut-être une crise d'urticaire.

Prise excessive d'eau pouvant être dangereuse.

Battement cardiaque irrégulier.

Caillot sanguin dans les jambes, caillot sanguin dans les poumons.

Difficultés à respirer pendant le sommeil (apnée du sommeil).

Inflammation du pancréas, obstruction intestinale.

Gonflement de la langue, lèvres gercées, éruption cutanée liée au médicament.

Pellicules.

Cassure des fibres musculaires et douleurs musculaires (rhabdomyosite).

Retard des règles, élargissement des glandes mammaires.

Diarrhée, dégorgeement mammaires.

Augmentation de l'insuline (hormone qui contrôle le niveau de sucre dans le sang).

Priapisme (érection prolongée du pénis qui peut nécessiter un traitement chirurgical).

Durcissement de la peau.

Température corporelle diminuée, diminution de la température corporelle, des jambes.

Symptôme de sevrage médicamenteux.

Jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse).

Effets indésirables très rares (affectant moins de 1 personne sur 10 000) :

Complications d'un diabète non contrôlé pouvant engager la vie pronostic vital.

Réaction allergique grave avec un gonflement qui peut bloquer la gorge et entraîner des difficultés respiratoires.

Absence de mouvements musculaires intestinaux manant d'une constipation.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec RISPERIDONE GT[®] :

absorption.

absorption.

absorption.

absorption.

absorption.

absorption.

absorption.

Lot : TA0032A
Per : 01/2026

PPV : 51DH20



psychiatiques.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments vous pourriez avoir besoin d'une dose différente de rispéridone.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précède s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser RISPERIDONE GT[®].

ALIMENTS ET BOISSONS

Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture. Vous devez éviter de boire de l'alcool pendant le traitement par RISPERIDONE GT[®].

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

INTERACTION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une idée, conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre

vous pouvez le prendre.

Enfants peuvent apparaître chez les nouveau-nés dont les mères ont utilisé durant le dernier trimestre (les trois derniers mois de leur grossesse) et/ou faiblesse musculaire, endormissement, agitation, problème de respiration et/ou. Si votre bébé développe l'un de ces symptômes, vous devez contacter votre

peut augmenter votre taux d'une hormone appelée « prolactine » qui peut avoir un

CONDUIRE UN VÉHICULE OU À UTILISER DES MACHINES

Le fatigue et des problèmes de vision peuvent survenir au cours du traitement ne devrez pas conduire ou utiliser des machines avant d'en avoir parlé avec

du lactose

et du lactose (un type de sucre). Si vous avez été informé par votre médecin que à certains sucre, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

POURQUOI PRENDRE RISPERIDONE GT[®] ?

vos yeux, yeux roulants, formation de croutes au niveau du bord des paupières.

Problèmes oculaires pendant une chirurgie de la cataracte. Pendant une chirurgie de la cataracte, un état appelé syndrome de l'iris hypotonique peropératoire (SIHP) peut survenir si vous prenez ou avez pris RISPERIDONE GT[®]. Si vous avez besoin d'une chirurgie de la cataracte, assurez-vous d'informer votre ophtalmologiste que vous prenez ou avez pris ce médicament.

Nombre dangereusement faible d'un certain type de globules blancs nécessaires pour lutter contre les infections dans votre sang.

Réaction allergique sévère caractérisée par de la fièvre, la bouche, visage, lèvre ou langue gonflée, un essoufflement, des démangeaisons, une éruption cutanée et parfois une chute de la tension artérielle.

Prise excessive d'eau pouvant être dangereuse.

Battlement cardiaque irrégulier.

Caillot sanguin dans les jambes, caillot sanguin dans les poumons.

Difficultés à respirer pendant le sommeil (apnée du sommeil), respiration rapide et superficielle.

Inflammation du pancréas, obstruction intestinale.

Gonflement de la langue, lèvres gercées, éruption cutanée liée au médicament.

Pellicules.

Cassure des fibres musculaires et douleurs musculaires (rhabdomyolyse).

Retard des règles, élargissement des glandes mammaires, élargissement des seins, écoulements mammaires.

Augmentation de l'insuline (hormone qui contrôle le niveau de sucre sanguin) dans votre sang.

Priapisme (érection prolongée du pénis qui peut nécessiter un traitement chirurgical).

Durcissement de la peau.

Température corporelle diminuée, diminution de la température corporelle, refroidissement des bras et des jambes.

Symptôme de sevrage médicamenteux.

Jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse).

Effets indésirables très rares (affectent moins de 1 personne sur 10 000) :

Complications d'un diabète non contrôlé pouvant engager le pronostic vital.

Réaction allergique grave avec un gonflement qui peut impliquer la gorge et entraîner des difficultés respiratoires.

Absence de mouvements musculaires intestinaux menant à une occlusion.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec l'utilisation d'un autre médicament appelé la

Médicaments agissant au niveau de votre cerveau pour vous aider à vous calmer (benzodiazépines) ou certains médicaments de la douleur (opiacés), médicaments contre l'allergie (certains antihistaminiques), la rispéridone pouvant augmenter l'effet sédatif de tous ces médicaments.

Médicaments qui peuvent changer l'activité électrique de votre cœur, tels que les médicaments contre le paludisme, les problèmes de rythme cardiaque, les allergies (antihistaminiques), certains antidépresseurs ou d'autres médicaments destinés à des problèmes mentaux.

peuvent entraîner un ralentissement des battements du cœur.

lèvent une baisse du potassium dans le sang (par exemple, certains diurétiques).

la tension artérielle augmentée. **RISPERIDONE GT[®]** peut diminuer la tension

de Parkinson (par exemple levodopa),

alors que les urines (diurétiques) utilisés dans les problèmes cardiaques ou les crises de votre corps dus à une accumulation de quantités trop importantes d'hydrochlorothiazide). **RISPERIDONE GT[®]** pris seul ou avec du furosemide réduit le risque d'accident vasculaire cérébral ou de décès chez les

vent diminuer "effet de la rispéridone :

(médicaments de l'épilepsie),

Lot: TAO032A
Per: 01/2026
PPV: 51DHZD

en traitement avec ces médicaments vous pourriez avoir besoin d'une dose

vent augmenter l'effet de la rispéridone :

(autres types de maladie du cœur),

paroxétine, fluoxétine, antidépresseurs tricycliques,

bêta-bloquants (utilisés pour traiter une tension artérielle élevée),

Cimétidine, ranitidine (qui bloquent l'acidité de l'estomac),

Itraconazole et kétoconazole (médicaments pour le traitement des infections fongiques),

Certains médicaments utilisés dans le traitement du VIH/SIDA, comme le ritonavir.

Vérapamil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et/ou anomalie du rythme cardiaque.

Infection de l'estomac ou des intestins, incontinence fécale, selles très dures, difficiles à évacuer, flatulence.

Urticaire, démangeaison, perte de cheveux, épaissement de la peau, eczéma, sécheresse cutanée, décoloration de la peau, acne, démangeaison squameuse du cuir chevelu ou de la peau, troubles cutanés, lésions cutanées.

Augmentation des CPK (créatine phosphokinase) dans votre sang, enzyme qui est parfois libérée lors de rupture musculaire.

Posture anormale, raideur articulaire, enflure des articulations, faiblesse musculaire, douleur au cou.

Dysfonctionnement érectile, trouble de l'éjaculation.

Envies fréquentes d'uriner, incapacité à uriner, douleur en urinant.

Perte des règles, absence de menstruation ou autres problèmes avec vos règles (chez la femme).

Développement des seins chez les hommes, écoulement de lait au niveau des seins, dysfonctionnement sexuel, douleur mammaire, gène mammaire, écoulement vaginal.

Gonflement du visage, de la bouche, des yeux ou des lèvres.

Frictions, augmentation de la température corporelle.

Sensation de soif, sensation de malaise, gène au niveau de la poitrine, ne pas se sentir bien, gène.

Augmentation des transaminases hépatiques dans votre sang, augmentation des GGT (une enzyme hépatique appelée gamma-glutamyltransférase) dans votre sang, augmentation des enzymes du foie de votre sang.

Douleur liée à l'administration.

Effets indésirables rares (affectent 1 à 10 personnes sur 10 000) :

Infection.

Sécrétion inappropriée d'une hormone qui contrôle le volume d'urine.

Présence de sucre dans les urines, hypoglycémie, taux élevé de triglycéride sanguin (un type de graisse).

Manque d'émotion, incapacité à atteindre l'orgasme.

Syndrome main des neuroleptiques (confusion, réduction ou perte de la conscience, forte fièvre, raideur musculaire sévère).

Problèmes de vaisseaux sanguins dans le cerveau.

Problèmes de vaisseaux sanguins dans le cerveau.

Coma dû à un diabète non contrôlé.

Secousses de la tête.

Glaucome (augmentation de la pression dans le globe oculaire) notamment dans les mouvements de



Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE – code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament sert à :

- Soigner la dépression chez les adultes (épisodes dépressifs majeurs)
- Soulager les douleurs neuropathiques chez les adultes
- Prophylaxie des céphalées de tension chez les adultes
- Traitement de fond de la migraine chez les adultes
- Soigner l'enurésie (pipi au lit) nocturne chez les enfants de 6 ans et plus, uniquement lorsque des causes organiques, telles que spina bifida et troubles associés, ont été exclues et en l'absence de réponse à tous les autres traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, y compris les relaxants musculaires et la desmopressine. Ce médicament doit être prescrit uniquement par des médecins expérimentés dans la prise en charge de l'enurésie persistante.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé:

- si vous êtes allergique à l'amitriptyline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez récemment eu une attaque cardiaque (infarctus du myocarde)
- si vous avez eu des problèmes cardiaques tels que des troubles du rythme que l'on détecte à l'électrocardiogramme (ECG), un bloc cardiaque, ou une insuffisance coronarienne
- si vous prenez des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO).
- si vous avez pris des IMAO au cours des 14 derniers jours
- si vous avez pris du moclobémide la veille
- si vous souffrez d'une pathologie hépatique sévère.

Si vous êtes traité par LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé, vous devez arrêter de prendre ce médicament et attendre 14 jours avant de commencer un traitement par IMAO.

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé.

Des troubles du rythme cardiaque et une hypotension peuvent survenir si vous prenez une dose élevée d'amitriptyline. Cela peut également survenir si vous prenez un autre médicament qui peut augmenter l'effet de l'amitriptyline.

Énurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'enurésie.

Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent altérer l'action d'autres médicaments et cela peut parfois entraîner des effets indésirables graves. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, tel que :

- des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), par ex. phénelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide ou tranylcypromine (pour la dépression), ou sélégiline (pour la maladie de Parkinson). Ces médicaments ne doivent pas être pris en même temps que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé (voir la rubrique 2 Ne prenez pas LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé),
- adrénaline, éphédrine, isoprénaline, noradrénaline, phényléphrine et phénylpropanolamine (ceux-ci peuvent être présents dans des médicaments contre la toux ou le rhume, et dans certains anesthésiques),
- des médicaments contre l'hypertension, par exemple des inhibiteurs des canaux calciques (par ex. diltiazem et vérapamil), guanéthidine, bétanidine, clonidine, reserpine et méthyldopa,
- médicaments anticholinergiques comme certains médicaments pour traiter la maladie de Parkinson et des troubles gastro-intestinaux (par ex. atropine, hyoscymine),
- thioridazine (pour la schizophrénie),
- tramadol (analgésique),
- médicaments contre les infections fongiques (par ex. fluconazole, terbinafine, kéroconazole et itraconazole),
- sédatifs (par ex. barbituriques),
- antidépresseurs (par ex. ISRS [fluoxétine, paroxétine, fluvoxamine], duloxétine et bupropion),
- médicaments pour certaines maladies cardiaques (par ex. bêta-bloquants et antiarythmiques),
- cimétidine (contre les ulcères d'estomac),
- méthylphénidate (pour le TDAH),
- ritonavir (pour le VIH),
- contraceptifs oraux,
- rifampicine (pour les infections),
- phénytoïne et carbamazépine (pour l'épilepsie),
- millepertuis (hypericum perforatum), plante utilisée pour soigner la dépression
- médicaments pour la thyroïde
- acide valproïque.

Vous devez également informer votre médecin si vous prenez ou avez récemment pris un médicament pouvant affecter le rythme cardiaque, par ex.

- les médicaments pour soigner les rythmes cardiaques irréguliers (par ex. quinidine et sotalol)
- astémizole et terfénadine (pour les allergies et le rhume des

Lot: TA0032A
Per: 01/2026
PPV: 51DH20

Pathologie:

La dose recommandée est la suivante:

Adultes :
La dose initiale est de 2 mg par jour, elle peut être augmentée à 4 mg par jour le second jour.

Votre dose pourra ensuite être adaptée par votre médecin en fonction de la façon dont vous répondez au traitement.

Votre dose initiale sera normalement de 0,5 mg deux fois par jour.

Votre dose pourra ensuite être progressivement augmentée par votre médecin à 1 mg jusqu'à 2 mg deux fois par jour.

Votre médecin vous indiquera ce qui est le mieux pour vous.

Dans le traitement des accès maniaques

Adultes :

Votre dose initiale sera progressivement augmentée par votre médecin en fonction de votre réponse au traitement.

La majorité des personnes se sentent mieux avec des doses de 1 à 6 mg une fois par jour.

Personnes âgées :

Votre dose initiale sera généralement de 0,5 mg deux fois par jour.

Votre dose pourra être progressivement augmentée par votre médecin à 1 mg jusqu'à 2 mg deux fois par jour en fonction de votre réponse au traitement.

Dans le traitement de l'agressivité persistante chez les personnes présentant une démence d'Alzheimer.

Adultes (Personnes âgées infirmes) :

Votre dose initiale sera généralement de 0,25 mg deux fois par jour.

Votre dose pourra être progressivement augmentée par votre médecin en fonction de votre réponse au traitement.

La majorité des personnes se sentent mieux avec 0,5 mg deux fois par jour. Certains patients peuvent avoir besoin de 1 mg deux fois par jour.

La durée du traitement chez les patients présentant une maladie d'Alzheimer ne doit pas dépasser 6 semaines.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne doivent pas être traités par RISPERIDONE GT[®] pour la schizophrénie ou les accès maniaques.

Dans le traitement du trouble des conduites

La dose dépendra du poids de votre enfant:

Pour un enfant de moins de 50 kg

Le poids sera normalement de 0,25 mg une fois par jour.

Le poids sera de 0,25 mg à 0,75 mg une fois par jour.

Normalement de 0,5 mg une fois par jour.

Normalement tous les deux jours par paliers de 0,5 mg par jour.

Le poids sera de 0,5 mg à 1 mg une fois par jour.

Le poids sera normalement de 0,25 mg une fois par jour.

Les troubles des conduites ne doit pas dépasser 6 semaines.

Les troubles des conduites ne doit pas dépasser 6 semaines.

obéissance scolaire ou hépatique >

soit à traiter, toutes les doses initiales et les doses suivantes de rispéridone

ne doivent pas dépasser 6 semaines.

soit avec prudence chez ce groupe de patients.

Etats indésirables supplémentaires chez les enfants et les adolescents:

Les effets indésirables suivants ont été rapportés plus souvent chez les enfants et les adolescents (5 à 17 ans) que chez les adultes : avoir envie de dormir ou se sentir moins alerte, nausée (déjeuner), maux de tête, augmentation de l'appétit, vomissements, symptômes du rhume, congestion nasale, douleurs abdominales, sensation de vertiges, toux, fièvre, tremblements (secousses), diarrhée et incontinence (absence de contrôle) urinaire.

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'oubliez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois mentionné.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer ces médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ca que contient RISPERIDONE GT[®]
La substance active est:

Risperidone (DCI) 1 mg
Risperidone (DCI) 2 mg

Risperidone (DCI) 3 mg

Les autres composants sont: amidon de maïs, lactose, cellulose microcristalline, stearate de magnésium, hydroxyisoprénol, Bursulfate de sodium, sucre colloidale anhydre, dioxyde de titane, propylène glycol, taïc jaune suscité (Risperidone GT 2mg), jaune de quinoléine (Risperidone GT 3 mg). [Var la nutrique 2, RISPERIDONE GT[®] contient du lait)]

Nom et adresse de l'EP/étiquette de l'AMM au Maroc:

ATLAS PHARM
Quatrième Industriel de Barmched,
Route principale numéro 7, Rue C
Maroc.

Fabricant:
Atlas Pharma
Rua do Tucaida Grande, nº2, Abrunheira
2710-080 Sintra - Portugal

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée: 24/11/2015
Conditions de prescription et de livraison A (liste I)
Informations réservées aux professionnels de santé - sans objet.