

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-000546

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10705 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HILAL SANAA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0664860909 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 13/09/23

Nom et prénom du malade : HILAL Sanaa Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Respiratoire

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 13/09/23

Signature de l'adhérent(e) : 



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Recoulement des Actes
13/01/13	G		300,00	Docteur BEN MALLA Spécialiste en Pneumologie Case d'Alainneur - Avenue A Tél.: 022 82 23 42

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	13/9/93	697,30

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES RADIOGRAPHIQUES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Docteur JEN MALL</i> Case 227 228 229 230 231 232	13/07/23	EPR 3 Kit	600,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F		DETERMINATION DU COEFFICIENT		

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

### **[Création, remont, adjonction]**

## Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

The diagram shows a dental arch with 28 numbered teeth. The teeth are arranged in four quadrants: upper right (1-4), upper left (5-8), lower left (9-12), and lower right (13-16). The arch is centered on a coordinate system with four axes: D (left), G (right), H (up), and B (down). The teeth are numbered sequentially from 1 to 16, with 1 at the top center and 16 at the bottom center. The diagram illustrates the concept of quadrant teeth, where teeth 1-4 are in the upper right quadrant, 5-8 are in the upper left, 9-12 are in the lower left, and 13-16 are in the lower right.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# CABINET MEDICAL DES MALADIES RESPIRATOIRES

## Docteur BENMALLEM Mustapha

## Spécialiste des Maladies Respiratoires

C.E.S de l'Université de Paris

Asthme - Maladies des Poumons - Tuberculose

## ALLERGIE RESPIRATOIRE

## SEVRAGE TABAGIQUE

الدكتور بن لمعن مصطفى  
اختصاصي في الأمراض الصدرية  
خريج جامعة باريس  
الضيقية - داء السل - أمراض الرئة  
مرض الحساسية  
الإقلاع عن التدخين

الدار البيضاء، في : 13/9/2023 Casablanca, le :

Mr.

Norain STILAL Sauaa

## Synthetische Säcke 19 (Gute 12)

Wood's diet x 2/3 per cent 5g

② Reducing

14530 3912 bush apes <sup>reps</sup> + 5j. a day

### ③ Tealblue Spray

248052611/e x 473 x 350  
20284 END BID

④ *Sectide 250 dusas* (3)

~~697316n/ee x 270 + 2s~~

97 - شارع 2 مارس زنقة أثينا - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 82 23 42  
Résidence El Mechouar - N° 97 - Avenue 2 Mars Angle d'Anthènes - Casablanca - Tél. 05 22 82 23 42

Nettoyage du Diskus :  
tenez l'embout tenu et  
nettoyez l'embout tenu.

Si vous avez utilisé  
Consultez immédiatement l'important d'après  
vous avez pris accès  
parlez-en à votre médecin  
accélération du rythme  
ressentir des vertiges  
douleurs articulaires.

Si vous avez pris des  
en parlez à votre médecin  
au long cours peut  
secrétées par les glandes.

Si vous oubliez de prendre  
Ne prenez pas deux doses  
prendre. Prenez la dose manquée.

Si vous arrêtez de prendre  
Il est très important de prendre  
votre médicament. Consultez  
votre pharmacien.

Si vous arrêtez de prendre  
Il est très important de prendre  
votre médicament. Consultez  
votre pharmacien.



## SERETIDE DISKUS

100 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
250 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
500 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
poudre pour inhalation en récipient unidose  
propionate de fluticasone/salmétérol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Seretide Diskus et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Seretide Diskus ?
3. Comment utiliser Seretide Diskus ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Seretide Diskus ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.



Poudre pour inhalation en récipient unidose

28 60 doses

## 1. Qu'est-ce que SERETIDE DISKUS ?

Classe pharmacothérapeutique : Adrénergique ou d'autres médicaments, à l'exclusion de Seretide. Seretide est un médicament contenant un propionate de fluticasone :

- Le salmétérol est un bêta-2 mimétique d'action. Les bronchodilatateurs aident à faciliter l'entrée et la sortie d'air au moins 12 heures.
- Le propionate de fluticasone est un corticostéroïde qui réduit l'irritation dans les poumons.

Votre médecin vous a prescrit ce médicament pour des troubles respiratoires tels que :

- Asthme,
- Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) avec des exacerbations des symptômes de type Obstructive (BPCO).

Vous devez utiliser Seretide tous les jours. Cela permettra de contrôler correctement

Seretide permet d'éviter la survenue d'asthme. Cependant, Seretide ne doit pas être utilisé pour l'essoufflement ou de sifflement. Dans un médicament bronchodilatateur dit « de courte durée, comme le salbutamol. Vous devez utiliser un inhalateur dit « de secours » d'action rapide.

## 2. Quelles sont les informations à connaître ?

N'utilisez jamais Seretide Diskus : Si vous êtes allergique à l'un des ingrédients

contenus dans ce médicament.

Avez-vous des réactions allergiques à d'autres médicaments ?

Adinez-vous à une autre maladie ?

• Utilisez-vous d'autres médicaments ?

• Utilisez-vous d'autres médicaments ?

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV:248,00 DH  
ID:651897  
Barcode  
6 118001 141104

Nettoyage du Diskus :  
tenez l'embout tenu et  
nettoyez l'embout tenu.

Si vous avez utilisé  
Consultez immédiatement l'important d'après  
vous avez pris accès  
parlez-en à votre médecin  
accélération du rythme  
ressentir des vertiges  
douleurs articulaires.

Si vous avez pris des  
en parlez à votre médecin  
au long cours peut  
secrétées par les glandes.

Si vous oubliez de prendre  
Ne prenez pas deux doses  
prendre. Prenez la dose manquée.

Si vous arrêtez de prendre  
Il est très important de prendre  
votre médicament. Consultez  
votre pharmacien.

**SERETIDE**  
Produits d'entretien pour Diskus

Poudre pour inhalation et récipient unidose

28/60 doses



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### SERETIDE DISKUS

100 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
250 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
500 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
poudre pour inhalation en récipient unidose  
propionate de fluticasone/salmétérol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Seretide Diskus et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Seretide Diskus ?
3. Comment utiliser Seretide Diskus ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Seretide Diskus ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. Qu'est-ce que SERETIDE DISKUS

Classe pharmacothérapeutique : Adrénergique ou d'autres médicaments, à l'exclusion de Seretide. Seretide est un médicament contenant du propionate de fluticasone :

- Le salmétérol est un bêta-2 mimétique d'action. Les bronchodilatateurs aident à faciliter l'entrée et la sortie d'air au moins 12 heures.
- Le propionate de fluticasone est un corticostéroïde qui réduit l'irritation dans les poumons.

Votre médecin vous a prescrit ce médicament pour des troubles respiratoires tels que :

- Asthme,
- Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) avec des exacerbations des symptômes de type Obstructive (BPCO).

Vous devez utiliser Seretide tous les jours. Cela permettra de contrôler correctement

Seretide permet d'éviter la survenue d'asthme. Cependant, Seretide ne doit pas être utilisé pour l'essoufflement ou de sifflement. Dans un médicament bronchodilatateur dit « de courte durée, comme le salbutamol. Vous devez utiliser un inhalateur dit « de secours » d'action rapide.

## 2. Quelles sont les informations à connaître ?

N'utilisez jamais Seretide Diskus : Si vous êtes allergique à l'un des ingrédients

contenus

ou

Adr

• ou

re

• ou

GlaxoSmithKline Maroc

Aïn El Aouda

Région de Rabat

PPV:248,00 DH

ID:651897

Barcode

6 118001 141104

# Ventoline 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé

SALBUTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?
3. Comment utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Bronchodilatateur Béta-2 mimétique à action  
durée par voie inhalée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

Ce médicament contient un bêta-2 mimétique : le salbutamol.

C'est un bronchodilatateur (*il augmente le calibre des bronches*) à action rapide (en minutes) et de courte durée (4 à 6 heures) qui s'administre par voie inhalée (*en l'embout buccal de l'inhalateur*).

Il est indiqué en cas de **crise d'asthme** ou pour soulager une **gêne respiratoire** due à une maladie asthmatique ou de certaines maladies des bronches.

Il peut également vous être prescrit en **traitement préventif de l'asthme**.

Si vous avez de l'asthme, en fonction de sa sévérité, votre médecin peut compléter d'un traitement de fond continu par un ou plusieurs corticoïdes par voie inhalée.

Ventoline 100 mcg  
Aérosol, 200 doses.



6 118001 141258

Lot

EXP

PPV

M J 30  
12 2024  
45,30 DH

# PREDNI® 20 Cooper

Comprimé effervescent sécable - Boîte de 20

(Prednisolone)

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE CETTE NOTICE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOUS.**

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?**

1. Qu'est-ce que Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ?

3. Comment prendre Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ?

6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE - Code ATC : H02AB06 (H. Hormones non sexuelles).

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

**Indications thérapeutiques :**

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 10 kg. Ce médicament est utilisé dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet des greffes d'organes.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ?**

**Ne prenez jamais Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable**

• Si vous êtes allergique à la substance active (prednisolone) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

• Si vous avez une infection.

• Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).

• Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.

• Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).

**Avertissements et précautions**

Ce médicament doit être pris sous une stricte surveillance médicale. Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les prématurés et les nouveau-nés à terme. Cependant, chez les nourrissons prématurés traités par d'autres médicaments de la même classe, une échographie cardiaque doit être effectuée pour surveiller la structure et la fonction du muscle cardiaque.

**Avant le traitement, prévenez votre médecin :**

• Si vous avez été vacciné récemment.

• Si vous avez eu ou avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin.

• Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée.

• Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose).

• Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement.

• Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

présentant une intolérance galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 25,2 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par unité. Cela équivaut à 1,26 % de l'apport alimentaire quotidien maximal demandé de sodium pour un adulte.

**3. COMMENT PRENDRE Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ?**

**Posologie**

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 10 kg. La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et de la maladie traitée. Elle est strictement individuelle. Le dosage de PREDNI 20 Cooper est adapté si vous débutez un traitement ou si vous devez prendre un traitement sur une courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes.

Si vous devez prendre ce traitement sur une durée prolongée et à des doses inférieures à 20 mg par jour, il existe des dosages plus appropriés.

**Mode d'administration**

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Vous devez dissoudre les comprimés dans un verre d'eau. Avalez le contenu du verre de préférence au cours du repas, en une prise le matin.

**Durée de traitement**

Elle est déterminée par votre médecin.

Il est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni l'arrêter brutalement sans l'avis de votre médecin.

En cas de traitement prolongé, suivez les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Si vous avez pris plus de Predni 20 Cooper comprimé effervescent sécable que vous n'auriez dû : Consultez immédiatement votre médecin.

Si vous oubliez de prendre Predni 20 Cooper comprimé effervescent sécable :

Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement. Cependant, si vous oubliez de prendre une dose, continuez le traitement normalement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ce médicament, indispensable à votre santé, est le plus souvent bien toléré lorsque l'on suit les recommandations et notamment le régime

**LOT N°:**

**UT. AV :**

**PPV (DH) :**

10,00



... des saignements et des perforations digestives.

• Une inflammation du pancréas surtout chez l'enfant.

• Une fragilisation de la peau, un retard de cicatrisation, de l'acné.

• Une désorientation dans le temps et l'espace (confusion).



**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la reître.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice ?**

- 1) Qu'est-ce que SAPHIR® 1g/125mg et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2) Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SAPHIR® 1g/125mg ?
- 3) Comment prendre SAPHIR® 1g/125mg ?
- 4) Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5) Comment conserver SAPHIR® 1g/125mg ?
- 6) Informations supplémentaires.

#### **1) QU'EST-CE QUE SAPHIR® 1G/125MG ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

SAPHIR® est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'efficacité (être inactives). L'autre constitutif actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

SAPHIR® est utilisé chez l'adulte et chez les enfants pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

#### **2) QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SAPHIR® 1G/125MG ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

##### **Ne prenez jamais SAPHIR® 1g/125mg :**

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

**Ne prenez pas SAPHIR® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessous.**

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SAPHIR®.

##### **Faites attention avec SAPHIR® 1g/125mg :**

Adresssez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SAPHIR® 1g/125mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SAPHIR®.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon ses résultats, il pourra vous prescrire un autre médicament.

##### **Réactions nécessitant une attention particulière :**

SAPHIR® peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez SAPHIR®, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires :

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier/ère que vous prenez SAPHIR®. En effet, SAPHIR® peut influer sur les résultats de ces types de tests.

**ENFANTS**

Sans objet.

**Prises d'autres médicaments et SAPHIR® 1g/125mg :**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec SAPHIR®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose de SAPHIR®.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec SAPHIR®, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

SAPHIR® peut influer sur l'action du rifabutreoxate (un médicament utilisé pour traiter le sida ou les maladies rhumatismales).

SAPHIR® peut influer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet de greffes d'organes).

**Aliments et boissons et SAPHIR® 1g/125mg :**

Sans objet.

##### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement:**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

##### **Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :**

SAPHIR® peut provoquer des effets indésirables dont les symptômes peuvent diminuer la capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne sentez pas bien.

Ce médicament contient du saccharose, du potassium et du sodium :

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isoamylase (maladies héritées rares).
- Ce médicament contient du potassium. A prendre en compte chez les patients insuffisants rénaux ou chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en potassium.

• Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

##### **3) COMMENT PRENDRE SAPHIR® 1G/125MG ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

##### **Posologie :**

###### **Adultes et enfants de 40 kg ou plus :**

- Dosage initial : 1 sachet deux fois par jour
- Dosage habituel : 1 sachet deux fois par jour

###### **Enfants pesant moins de 40 kg :**

Les sachets SAPHIR® 1g/125mg ne sont pas recommandés.

###### **Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques :**

- En cas des problèmes rénaux, une réduction de la dose peut être nécessaire. Le médecin pourra vous prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas des problèmes au foie, des analyses du sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

###### **Mode d'administration :**

- Juste avant la prise de SAPHIR®, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.

- Ajoutez le mélange au début d'un repas ou un peu avant.

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée : espacées d'au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.

- Ne prenez pas SAPHIR® pendant plus de 2 semaines. Si vos symptômes de ce type persistent, consultez un médecin.

**Si vous vous êtes pris plus de SAPHIR® 1g/125mg que vous n'auriez**

**la prise d'une quantité excessive de SAPHIR® 1g/125mg qui peut entraîner des nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en au plus tôt possible. Montrez la boîte de médicament au médecin.**

**Si vous vous êtes oublié de prendre SAPHIR® 1g/125 mg :**

**Si vous avez oublié de prendre votre dose, prenez-la dès que vous y pensez, environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.**

**Si vous vous êtes arrêté de prendre SAPHIR® 1g/125 mg :**

**Vous devrez continuer de prendre SAPHIR® jusqu'à la fin du traitement.**

**Si vous sentez mieux, toutes les doses sont importantes pour certaines bactéries, dont celles qui causent les récidives.**

**Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.**

#### **4) QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement. Ce médicament peut entraîner les effets indésirables mentionnés ci-dessous.

##### **Réactions nécessitant une attention particulière :**

###### **Réactions allergiques :**

- éruption cutanée,
- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) pour

de taches rouges ou violettes sur la peau, mais peuvent parties du corps,

• fièvre, douleurs articulaires, ganglions dans le cou, l'aisselle et

• gonflement, parfois du visage ou difficultés respiratoires,

• malaise brutal avec chute de la pression sanguine.

Si vous présentez un de ces symptômes, arrêtez l'administration de SAPHIR®.

**5) INFLAMMATION DU GROS INTESTIN :**

• Inflammation du gros intestin entraînant mucus, des douleurs gastriques et/ou diarrhée.

Si vous présentez ces symptômes, arrêtez le médicament.

**Effets indésirables très fréquents :**

• Ce médicament peut affecter plus d'une personne sur dix :

• diarrhée.

**Effets indésirables fréquents :**

• Ce médicament peut affecter moins de 1 personne sur dix :

• nausées, en particulier aux doses élevées.

Si vous présentez ces effets indésirables, arrêtez le médicament.

**Effets indésirables peu fréquents :**

• augmentation de certains substances.

**Effets indésirables rares :**

• Ce médicament peut affecter moins de 1 personne sur cent :

• éruption cutanée, pouvant former de nombreux points noirs entourés d'une zone rouge (érythème polymorphe).

Si vous remarquez un de ces symptômes, arrêtez le médicament.

**Effets indésirables rares pouvant être mortels :**

• faible nombre de cellules pancréatiques

• faible nombre de globules blancs.

**Autres effets indésirables :**

• autres effets indésirables non déclarés mais leur fréquence exacte est inconnue.

• réactions allergiques (voir ci-dessous).

• inflammation du gros intestin (voir ci-dessous).

• inflammation de la membrane péri-oesophagique.

• réactions cutanées graves :

• éruption atrophiante avec cloques et des lésions dans la bouche, du nez, des yeux et dans la

**Saphir® 1g/125 mg** سفیر®  
16 Sachets كبس 16



6 118000 082569

• prolongation du temps de cible, la

• personnes prennent

• personnes prennent

• personnes prennent

• personnes prennent

PPV: 116DH00  
PER: 05-26  
LOT: M 1647

Docteur Ben Mallek Mustapha  
Pneumologue  
97 Avenue 2 Mars Casa Mers Sultan

Casablanca le 13/12/2023

Facture Compte rendu de E.F.R

M. Mine HILAL Samaa

a subi une E.F.R (spirometries) ce jour cotée 3K15 et payé à six cent dirhams (600 dirhams).

Résultat Trouble Ventilatoire obstructif modéré  
réversible aux fréquences.





**EXPLORATION  
FONCTIONNELLE  
RESPIRATOIRE**

DYN'R Matériel Médical  
BP 71  
73 Rue de Louge  
31603 MURET Cedex  
05-62-23-19-00

Examen du  
13/09/2023

Nom : HILAL  
Prénom : Sanaa  
Médecin traitant :  
Réf. Norme :  
Normes : ERS 93 - Zapletal  
Vérification de Calibration : 2.0% Ins. -2.5% Exp. Du : 13/01/2021 Filtre : Dyn'R  
Corr. BTPS : 1.101 20.0 °C 103.0 kPa 55.0 %H<sup>2</sup>O

Id. :  
Sexe : Féminin  
Taille : 166 cm  
Poids : 80 Kg  
Né(e) le : 03/11/1976  
Age : 46 Ans  
Tabagisme : NON-FUMEUR




Heure PRE : 10:48 Heure POST : 11:07

POST : Airomir Autohaler Dose : 200 µg

	Théo.	Pré 3	%Th	Post 2	%Th	# Pré%	# Th%
CVF (l)	3.27	3.07	94	3.23	99	5	5
VEMS (l)	2.81	2.12	76	2.48	88	17	13
VEMS / CVF (%)	81	69	85	77	95	11	9
DEP (l/s)	6.64	4.74	71	5.99	90	27	19
DEM 75 (l/s)	5.80	3.97	68	5.52	95	39	27
DEM 50 (l/s)	4.08	1.79	44	2.55	62	42	19
DEM 25 (l/s)	1.70	0.57	34	0.81	47	41	14
DEM 25-75 (l/s)	3.43	1.46	42	2.21	64	52	22

Trouble Vain Laboratoire obstructif  
du à une réversibilité aux B<sub>2</sub>  
mimétique



Docteur BEN MALLEM Mostapha  
Pneumonologue  
Rue d'Alépou 1000  
Casablanca  
Maroc  
Tél: 02 23 42