

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="radio"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="radio"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

M23-U022172'

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2202

Société : 175972

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL GHA RFAoui FATNA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 62 65 58 46 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 31/08/2022

Nom et prénom du malade : EL GHA RFAoui FATNA Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Mustapha NAJI

OMNIPRACTICIAN, Ancien Médecin des Hôpitaux Militaires Extension n° 353 - Casablanca, Tel 0522 65 07 04

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/08/23	C		200,00 Dhs	<i>Dr Mustapha Naji</i> Ornithopratique Ancien Médecin des Hôpitaux Militaires Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca Tél 0522 69 07 04
14/09/23	C		69	<i>Dr Mustapha Naji</i> Ornithopratique Ancien Médecin des Hôpitaux Militaires Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca Tél 0522 69 07 04

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE JNANE LOU</i> <i>Dr. MUKHAD AMINA</i> <i>Oulad Azoua</i>	31/08/23	302,70
	14/09/23	1447,70

INPE 092065044

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
14/09/23	mtt 1/4	600,00 Dhs

Dr Mustapha Naji
Ornithopratique
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca
Tél 0522 69 07 04

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX
				
				
ODF PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553		
	D 00000000	G 00000000		MONTANTS DES SOINS
	B 00000000			
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط
خريج كلية الطب بالرباط
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

عيادة



طب الأطفال

داء السكري - الكوليسترول

ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب

أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل

الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي

Casablanca, le :

١٤.٠٩.٢٣

Nom et Prénom :

Elgharfaoui Fatma

oft en kantoor

Dr Mustapha NAJI
Omnipraticien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca
Tél 052 65 07 04

Dr Naji Mustafa

Lauréat de l'Ecole Royale de Santé Militaire de Rabat

Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat

Ancien médecin militaire à l'Hôpital Militaire de Rabat

Ancien médecin de l'hôpital militaire français de paris

Nom et prénom: EL GHARFAOUI FATNA

Casablanca le, 14/09/2023

COMPTE RENDU OSTEODENSITOMETRIE

L'étude de la densité osseuse au niveau des tibias et radius objective :

- une ostéoporose au niveau du radius
- une densité osseuse normale au niveau du tibia

Dr Mustapha Naji
Omnipraticien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissàsfa Extension n° 353 - Casablanca
Tél 0522 65 07 04

Dr Naji Mustafa

Lauréat de l'Ecole Royale de Santé Militaire de Rabat

Lauréat de la Faculté de Médecine de Rabat

Ancien médecin militaire à l'Hôpital Militaire de Rabat

Ancien médecin de l'hôpital militaire français de paris

Facture N°: 5072

Casablanca le, 14-09-2023

Nom et prénom: EL GHARFAOUI FATNA

Radiographie : Osteodensitometrie

Montant : 600.00dh

Dr Mustapha NAJI
Omnipraticien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca
Tél 0522 65 07 04

الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط
خريج كلية الطب بالرباط
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس



طب الأطفال

عِدَادَةٌ

طب الأطفال
داء السكري - الكوليسترون
ارتفاع الضغط الدموي - التهاب
أمراض الغدد / عقم الزوجين
الطب النفسي - أمراض الجهاز

Casablanca, le :

31 AOÛT 2023

Nom et Prénom :

31 AUG 2020 Elghanfarri Fatma

#2,10

Rauper L.

~~1-2-5~~ x 14y

A7, 40x12

Dolichos x 12m.

$$0 - 1 - \overset{?}{\textcircled{S}}) \times 14j$$

卷之三

Cortamyl 20. $\frac{1}{2}$ - 2 ~~>~~ 1kg

302,70

D. MUKHADAMINA
THARMAQIB BINNAE TOUL
N. & IMM. 7 QUIGE AZOUZ
AI FERAH 2 - CASABLANCA

AL FAREH - CESTELLES
N° 4 imm. 7 Quai d'Alzette
DÉPARTEMENTAL MINIATURE

Dr Mustapha NAJI
Oncopratricien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca
Tel 0522 65 07 04

ليسانسة العليا، رقم 353 - (أمام نهاية الحافلة 21) - الدار البيضاء - الهاتف: 04 07 65 22

16/09/03

① J2

CC21

الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط
خريج كلية الطب بالرباط
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

عيادة

طب الأطفال
داء السكري - الكوليسترول
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



Casablanca, le : 14.09.23

Nom et Prénom : Elghazouani Fatma

144,50

Raufer 20: 1 - 7 - 0 

45,80

Contamyl 20: $\frac{1}{2}$ - 5 - 0 

149,00 x 2

Flexenat: 0 - 0 - 2 

169,00 + 86,40

Dalix 90: 0 - 1 - 0 

PHARMACIE JNANE LOUZ
Dr. MUKHAD AMINA

N° 4 Imm. 7 Ouled Azouz
Al Farah 2 - Casablanca

Audrenet 70:

Mustapha NAJ
Oncopratien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Elissafia Extension n° 353 - Casablanca
Tél 0522 65 07 04 

176,00 x 4

PHARMACIE JNANE LOUZ

Dr. MUKHAD AMINA
N° 4 Imm. 7 Ouled Azouz
Al Farah 2 - Casablanca

T: 1447,70

Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable

ANORIS

Vé
ce
im

- Cela
de
me
votre
- Si vous
parlez-en à votre
s'applique aussi
mentionné dan

45,80



CORTANCYL 20 MG
CP SEC B20

1. QU'EST-CE QUE DANS QUELS CA

Classe pharmacoth

GLUCOCORTICOIDE

(H. Hormones systé

Indications théra

Ce médicament est un ~~comprimé~~

anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utilisée dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.


الاستعمال أثناء الحمل والرضاعة
إذا كنت حاملاً أو تتويني الحمل، اخباري طبيبك قبل تناول راسبير® 20 ملг و 40 ملг،
أقراص مقاومة لحموضة المعدة.
سيخبرك طبيبك عن مدى إمكانية تناول راسبير® 20 ملг و 40 ملг، أقراص مقاومة
لحموضة المعدة، خلال هذه الفترة.
لا تتوقف معطبات حول ما إذا كان راسبير® يتسرّب لحليب الأم. لذلك لا يجب تناول
راسبير® 20 ملغ و 40 ملغ، أقراص مقاومة لحموضة المعدة، خلال الرضاعة.

الوجبات.
الوقاية من القرحة المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب اللاسترويدية
الراشدين البالغين أكثر من 18 سنة: تحدد الجرعة الاعتيادية في قرص واحد من راسبير®
20 ملغ مرة واحدة في اليوم.

علاج الأفراز المفرط لحمض المعدة بسبب متلازمة زولينجر إيسون
الراشدين البالغين أكثر من 18 سنة: تحدد الجرعة الاعتيادية في قرص واحد من راسبير®
40 ملغ مررتين في اليوم. سيحدد طبيبك الجرعة ومدة العلاج حسب احتياجاتك. تحدد الجرعة
القصوى في 80 ملغ مررتين في اليوم.
استمرار العلاج بعد الوقاية بتناول إزوميرازول عبر الوريد لدى عودة التزيف الناتج عن

راسبير® 20 ملغ مرة واحدة في اليوم لمدة 4 أسابيع. قد يكون العلاج الإضافي لمدة 4 أسابيع
من أجل ضمان الشفاء التام.
إذا كنت تعاني من مرض حاد بالكلب، يمكن اخذك
تحدد الجرعة الاعتيادية بعد تعافي المرء
في اليوم.
إذا لم يكن يعاني المريء من أي آلام
راسبير® 20 ملغ مرة واحدة في اليوم
بتناول قرص واحد من راسبير® 20 ملغ
في حال الإصابة بجرثومة الاثني عشر
الاثني عشر والوقاية من عودة فرحة المعدة
الراشدين والأطفال بدءاً من 12 سنة:
راسبير® 20 ملغ مررتين في اليوم خلا
سيطلب منك طبيبك تناول مضادات حموضة
علاج فرحة المعدة المرتبطة بتناول مضاد
الراشدين البالغين أكثر من 18 سنة:

20 ملغ مرة واحدة في اليوم خلال 4 إلى 5 سبعين.
الوقاية من القرحة المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب اللاسترويدية
الراشدين البالغين أكثر من 18 سنة: تحدد الجرعة الاعتيادية في قرص واحد من راسبير®
20 ملغ مرة واحدة في اليوم.
علاج الأفراز المفرط لحمض المعدة بسبب متلازمة زولينجر إيسون
الراشدين البالغين أكثر من 18 سنة: تحدد الجرعة الاعتيادية في قرص واحد من راسبير®
40 ملغ مررتين في اليوم. سيحدد طبيبك الجرعة ومدة العلاج حسب احتياجاتك. تحدد الجرعة
القصوى في 80 ملغ مررتين في اليوم.
استمرار العلاج بعد الوقاية بتناول إزوميرازول عبر الوريد لدى عودة التزيف الناتج عن



Liste des excipients à effet notoire : saccharose (sphères de sucre).

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

RACIPER® contient une substance active appelée ésoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

RACIPER® 20 mg, comprimés gastro-résistants sont utilisés dans le traitement des maladies suivantes:

Adultes et jeunes gens âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,

Adultes

- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

RACIPER® 40 mg, comprimés gastro-résistants sont utilisés dans le traitement des maladies suivantes:

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison,
- Poursuite du traitement après prévention avec Esoméprazole par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal.

4. POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT

Faites attention avec RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.
- Si vous avez des problèmes rénaux sévères.

Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant toute administration de RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants.

RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants peuvent masquer des symptômes d'autres maladies. Si vous prenez RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants, vous devez informer immédiatement votre médecin si :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,
- Vous vomissez de la nourriture ou du sang,
- Vous avez des selles noires teintées de sang.

En cas de prescription d'un traitement « à la demande » en fonction des besoins, vous devez contacter votre médecin si les symptômes persistent ou se modifient.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Excipients à effet notoire: Saccharose. En raison de la présence de saccharose, l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

8. INTERACTIONS

UTILISATION D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants peuvent interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et réciproquement.

Vous ne devez pas prendre RACIPER® si vous prenez le médicament suivant :



Esoméprazole magnésium

20mg et 40mg

Comprimés gastro-résistants en boîtes de 7, 14 et 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Chaque comprimé gastro-résistant contient 20mg ou 40mg de substance active : Esoméprazole (sous forme d'Esoméprazole magnésium).

Les autres composants sont : Sphères de sucre, Hydroxypropylcellulose (HPC-L), Crospovidone (PPXL-10), Povidone (PVP K -30), Macrogol 400, Talc purifié, Hypromellose phthalate (HP-55S), Hypromellose phthalate (HP-50), Diethylphthalate, Macrogol 6000, Cellulose microcristalline PH101, Cellulose microcristalline PH112, Crospovidone (PPXL), Fumarate de sodium stéaryl, Opadry 03B86651 marron, Macrogol 4000, Alcool isoprénique, Acétate d'hydroxypropyle, E惧urifiante.

RACIPER® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 118 001 300723

Informez immédiatement votre médecin

entrainer une défaillance cardiaque qui pourra décider de l'administration de magnésium.

· Inflammation de l'estomac et de l'intestin : RACIPER® peut entraîner une atteinte de l'immunitaire. Vous pouvez développer une infection avec des symptômes d'infection importante, ou de

· Déficit des globules blancs entraînant un déficit dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

Ne soyez pas inquiet par cette liste d'effets indésirables possibles, vous pouvez n'en avoir aucun.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

l'anémie (ne peut pas être estimée à partir des

comprimés gastro-résistants pendant plus de 6 mois). Le niveau de magnésium dans votre sang diminue. De faibles symptômes peuvent apparaître, tels qu'une fatigue, des contractions musculaires, des convulsions, des sensations vertigineuses, une confusion mentale, une perte de coordination. Si l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. Les symptômes peuvent également apparaître lorsque le niveau de magnésium dans le sang. Votre médecin ou pharmacien pourront surveiller votre taux de magnésium.

globules blancs entraînant un déficit que possible si vous avez une infection avec une fatigue générale très importante, ou de

· Des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

Ne soyez pas inquiet par cette liste d'effets indésirables possibles, vous pouvez n'en avoir aucun.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

PPV:1A1 DH 50

DOLICOX®

Etoricoxib

60 mg

90 mg

120 mg

Comprimé pelliculé

DOLICOX 90 mg

Etoricoxib

7 Comprimés pelliculés



6 118000 041948

e notice avant de prendre ce

la relire.
oute, demandez plus d'informations

t. Ne le donnez jamais à quelqu'un
pourrait lui être nocif.
ous remarquez un effet indésirable
édecin ou à votre pharmacien.

te active par unité de prise : 60 mg

te active par unité de prise : 90 mg

PPV : 86DH40
PER : 06/26
LOT : M2012



DOLICOX® 120 mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement [inflammation] des articulations et des muscles chez les patients atteints de goutte.

Posologie

Les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, ne doivent être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Ne pas dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

Artrose

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Patients avec problèmes hépatiques.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

Douleur aiguë

L'etoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

En cas d'insuffisance hépatique légère (maladie du foie), vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg un jour sur deux, ou de 30 mg par jour.

* Mode d'administration :

Votre ordre.

Le ou les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours ou en dehors des repas.

* Durée du traitement

Ne prenez jamais DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Allergie (hypersensibilité) à l'etoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé,
- Allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2,
- Ulcère de l'estomac évolutif ou saignement gastro-intestinal,
- Maladie grave de foie,
- Maladie grave des reins,
- Grossesse et allaitement au prévision de grossesse (voir Rubrique « Grossesse et allaitement »),
- Enfants et adolescents de moins de 16 ans,

- Maladie inflammatoire de l'intestin, telle que la colite,

- Diagnostic de maladie cardiaque à type d'

d'angine de poitrine, antécédents de crise d'

artères périphériques, ou toute sorte d'accident

ischémique transitoire. L'etoricoxib pourrait

cardio-vasculaire et d'accident cérébral,

utilisé chez les patients ayant déjà eu des pro-

cérébral,

- Hypertension artérielle non contrôlée par

votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que vous

Si vous pensez que l'un de ces points vous

avoir consulté votre médecin au préalable.

Effets indésirables :

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60 provoquer des effets indésirables, mais ils ne

monde.

Si vous présentez un de ces symptômes, vo-

60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé

- Apparition ou aggravation d'un essoufflement

chevilles,

jeu et des yeux [je

stante ou permanen-

ent inclure des pro-

ment du visage, de

spirer,

ésirables possibles

hez plus de 1 pati-

1 à 10 patients su-

vez 1 à 10 patient

10 patients sur 10

moins de 1 patient

avants peuvent sur-

comprimé pelliculé

eur à l'estomac.

- Alvéolite, Gonflement des jambes et/ou des

- Étouffissemens, maux de tête, Palpitations, pression artérielle, Sifflements ou difficultés respiratoires, brûlures d'estomac, diarrhée, indigestion, inflammation de l'œsophage, ulcérations sanguins évaluant le fonctionnement du foie pseudo-grippal.

Peu fréquents :

- Gastroentérite, infection des voies respiratoires, nombre de globules rouges, diminution du nombre de plaquettes, hypersensibilité, augmentation d'anxiété, dépression, diminution du discernement n'existent pas, altération du goût, insomnie, somnolence, vision trouble, irritation et rougeur, anomalie du rythme cardiaque, fréquence, sensation d'oppression, de pression ou de pic de chaleur, accident vasculaire cérébral, artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins, ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, nausées, la bouche, ulcère de l'estomac, inflammation grave et ailleurs jusqu'à l'hémorragie, syndrome de crampes musculaires, douleur musculaire, sang, modification des examens sanguins ou troubles rénaux graves, douleur thoracique.

Peu fréquents pour DOLICOX® 120mg :

voies respiratoires hautes, Ulcération de la b

Rares

- Angio-oedème (réaction allergique sévère q- Confusion, agitation, Problèmes hépatiques, - Insuffisance hépatique, jaunissement de la peau, - Diminution du taux de sodium dans le sang, Très rares pour DOLICOX® 120mg, (surveiller)

Réactions allergiques (qui peuvent être causées par un avis médical) (sifflements respiratoires ou

inflammation de la paroi de l'estomac ou ulcère jusqu'à l'hémorragie, troubles hépatiques, trai- la pression artérielle, confusion, voir, ressentir

Fréquence indéterminée (ne pouvant être é

jaunissement de la peau et des yeux [jaute

cardiaque rapide.

Si vous ressentez un des effets mentionnés ci-dessous, il peut s'agir d'un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

votre pharmacien.

Mises en garde spéciales et précautions p

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre phar-

90mg & 120 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez des antécédents de saignement c

- Vous êtes déshydraté(e),

DOLICOX®

Etoricoxib

60 mg

90 mg

120 mg

Comprimé pelliculé

DOLICOX

Etoricoxib

14 Comprimés pelliculés



6 118000 041955

Etoricoxib

Excipient à eff.

Classe pharm.

DOLICOX® 60

classe des inh.

La classe phar-

coxibs.

Indications th:

DOLICOX® 60

(inflammation)

DOLICOX® 90

(inflammation)

rhumatoïde et

DOLICOX® 120

durée de la dos:

DOLICOX® 120

(inflammation)

Pasologie

Les comprimés pe-

rents, ne par les do-

Ne pas dépasser la dose,

d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre DOLICOX®

60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

Arsphose

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Patients avec problèmes hépatiques.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

Douleur aiguë

L'étoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

Patients avec problèmes hépatiques

En cas d'insuffisance hépatique légère [maladie du foie], vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg un jour sur deux, ou de 30 mg par jour.

* Mode d'administration :

Votre ordre.

Le ou les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours ou en dehors des repas.

* Durée du traitement

Ne prenez jamais DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Allergie (hypersensibilité) à l'étoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé.

- Allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2.

- Ulcère de l'estomac évolutif ou saignement gastro-intestinal.

- Maladie grave du foie.

- Maladie grave des reins,

- Grossesse et allaitement ou prévision de grossesse (voir Rubrique « Grossesse et allaitement »).

Enfants et adolescents de moins de 16 ans.

• notice avant de prendre ce

la relire.
suite, demandez plus d'informations.

Ne le donnez jamais à quelqu'un
pourrait lui être nocif,
vous remarquez un effet indésirable
décidé ou à votre pharmacien.

active par unité de prise : 60 mg

active par unité de prise : 90 mg

active par unité de prise : 120 mg

- Maladie inflammatoire de l'intestin, telle que colite,

- Diagnostic de maladie cardiaque à type d'angine de poitrine, antécédents de crise d'artères périphériques, ou toute sorte d'accident ischémique transitoire. L'étoricoxib pourrait cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, et utilisé chez les patients ayant déjà su des pro

cérébral,

- Hypertension artérielle non contrôlée par

votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que vous

Si vous pensez que l'un de ces points vous

avoir consulté votre médecin au préalable.

Effets indésirables :

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60

provocuer des effets indésirables, mais ils ne

monde.

Si vous présentez un de ces symptômes, veu-

60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé

- Apparition ou aggravation d'un essoufflement

chevilles,

- Coloration jaune de la peau et des yeux [ja-

troubles hépatiques,

- Douleur d'estomac importante ou per-

pseudo-grippal.

Peu fréquents :

- Gastroentérite, infection des voies respiratoires, nombre de globules rouges, diminution du

plaquettes, hypersensibilité, augmentation de l'anxiété, dépression, diminution du discernement, n'existent pas, altération du goût, insomnie, somnolence, vision trouble, irritation et rougeur,

anomalie du rythme cardiaque, fréquence de sensation d'oppression, de pression ou de palpitations, de chaleur, accident vasculaire cérébral, artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins, ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, mal de tête, ulcère de l'estomac, inflammation grave et aigüe jusqu'à l'hémorragie, syndrome de la mort subite, syndrome de la mort subite, gonflement du visage, éruption cutanée, crampes spasmes musculaires, douleur musculaire, modification des examens sanguins ou troubles rénaux graves, douleur thoracique.

Peu fréquents pour DOLICOX® 120mg :

- voies respiratoires hautes, Ulcération de la b-

Rares

- Angio-oedème [réaction allergique sévère] ou

- Confusion, agitation, Problèmes hépatiques,

- Insuffisance hépatique, jaunissement de la peau,

- Diminution du taux de sodium dans le sang;

Très rares pour DOLICOX® 120mg, (surveiller

Réactions allergiques [qui peuvent être suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation] ou

inflammation de la paroi de l'estomac ou ulcère jusqu'à l'hémorragie, troubles hépatiques, trouble de la pression artérielle, confusion, voir, ressentir

Fréquence indéterminée [ne peuvent être évaluées que par l'application de la peau et des yeux [ja-

couardise rapide].

Si vous ressentez un des effets mentionnés ci-dessous, il peut s'agir d'un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

Si vous ressentez un des effets mentionnés ci-dessous, il peut s'agir d'un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

Mises en garde spéciales et précautions p-

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre phar-

90mg & 120 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez des antécédents de saignement ou

- Vous êtes déshydraté(e),

Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement ce médicament car des informations importantes pour :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'au moins une maladie virale ou votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné pas à d'autrui, même si les signes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

CORTANCYL 20 MG

CP SEC B20



SANOFI

- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la variole, la coqueluche, la polio, la tuberculose, la grippe, etc.).

45,80

-
- Si vous souffrez d'une hypertension artérielle élevée dans le sang), ou une tension artérielle élevée.
 - Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
 - Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
 - Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
 - Si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire,
 - Si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing,
 - Si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffriez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »).
 - Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable si vous souffrez de :
 - Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale.

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.

ADRONAT® 70 MG

Acide Alendronique

COMPOSITION

Acide Alendronique.....	70
Équivalent à alendronate monosodique trihydraté	91,36

Excipients: q.s.p 1 comprimé.

FORMES PHARMACEUTIQUES

Comprimés dosés à 70 mg: Etui de 4 comprimés

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Bisphosphonates

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TraITEMENT de l'ostéoporose postménopausique. ADRONAT® réduit le risque

CONTRE-INDICATIONS

- Maladies de l'oesophage et autres facteurs qui retardent le transit oesophagien, tel que la sténose et l'achalasie.
- Incapacité de se mettre en position verticale ou de se tenir assis en position verticale pendant au moins 30 minutes.
- Hypersensibilité à l'alendronate ou à l'un des excipient.
- Hypocalcémie.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'ADRONAT® peut provoquer localement des effets irritants et l'aggravation d'une maladie sous-jacente, l'ADRONAT® gastro-intestinale haute évolutive, telle que dysphagie, mal de tête récents (dans l'année écoulée) d'affection gastro-intestinale en évolution, ou une intervention chirurgicale du tube digestif.
- Des réactions oesophagiennes (parfois sévères et nécessitant l'hospitalisation) et des érosions oesophagiennes, rarement suivies de sténoses avec l'alendronate. Les patientes doivent être informées du risque de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.
- De rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.
- Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.
- Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.
- L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).
- Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.
- L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.
- Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.
- L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.
- Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

ADRONAT 70 mg

Acide Alendronique
4 comprimés



6 118 000 041320

N° PV 176DH90
PER 33/20
L01 M737



... au niveau de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.

... de rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.

... Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.

... Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.

... L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).

... Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.

... L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.

... Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.

... L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.

... Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

ADRONAT® 70 MG

Acide Alendronique

COMPOSITION

Acide Alendronique.....	70
Équivalent à alendronate monosodique trihydraté	91,36

Excipients: q.s.p 1 comprimé.

FORMES PHARMACEUTIQUES

Comprimés dosés à 70 mg: Etui de 4 comprimés

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Bisphosphonates

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TraITEMENT de l'ostéoporose postménopausique. ADRONAT® réduit le risque

CONTRE-INDICATIONS

- Maladies de l'oesophage et autres facteurs qui retardent le transit oesophagien, tel que la sténose et l'achalasie.
- Incapacité de se mettre en position verticale ou de se tenir assis en position verticale pendant au moins 30 minutes.
- Hypersensibilité à l'alendronate ou à l'un des excipient.
- Hypocalcémie.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'ADRONAT® peut provoquer localement des effets irritants et l'aggravation d'une maladie sous-jacente, l'ADRONAT® gastro-intestinale haute évolutive, telle que dysphagie, mal de tête récents (dans l'année écoulée) d'affection gastro-intestinale en évolution, ou une intervention chirurgicale du tube digestif.
- Des réactions oesophagiennes (parfois sévères et nécessitant l'hospitalisation) et des érosions oesophagiennes, rarement suivies de sténoses avec l'alendronate. Les patientes doivent être informées du risque de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.
- De rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.
- Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.
- Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.
- L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).
- Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.
- L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.
- Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.
- L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.
- Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

ADRONAT 70 mg

Acide Alendronique
4 comprimés



6 118 000 041320

N° PV 176DH90
PER 33/20
L01 M737



... au niveau de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.

... de rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.

... Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.

... Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.

... L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).

... Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.

... L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.

... Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.

... L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.

... Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

ADRONAT® 70 MG

Acide Alendronique

COMPOSITION

Acide Alendronique.....	70
Équivalent à alendronate monosodique trihydraté	91,36

Excipients: q.s.p 1 comprimé.

FORMES PHARMACEUTIQUES

Comprimés dosés à 70 mg: Etui de 4 comprimés

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Bisphosphonates

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TraITEMENT de l'ostéoporose postménopausique. ADRONAT® réduit le risque

CONTRE-INDICATIONS

- Maladies de l'oesophage et autres facteurs qui retardent le transit oesophagien, tel que la sténose et l'achalasie.
- Incapacité de se mettre en position verticale ou de se tenir assis en position verticale pendant au moins 30 minutes.
- Hypersensibilité à l'alendronate ou à l'un des excipient.
- Hypocalcémie.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'ADRONAT® peut provoquer localement des effets irritants et l'aggravation d'une maladie sous-jacente, l'ADRONAT® gastro-intestinale haute évolutive, telle que dysphagie, mal de tête récents (dans l'année écoulée) d'affection gastro-intestinale en évolution, ou une intervention chirurgicale du tube digestif.
- Des réactions oesophagiennes (parfois sévères et nécessitant l'hospitalisation) et des érosions oesophagiennes, rarement suivies de sténoses avec l'alendronate. Les patientes doivent être informées du risque de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.
- De rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.
- Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.
- Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.
- L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).
- Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.
- L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.
- Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.
- L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.
- Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

ADRONAT 70 mg

Acide Alendronique
4 comprimés



6 118 000 041320

N° PV 176DH90
PER 33/20
L01 M737



... au niveau de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.

... de rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.

... Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.

... Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.

... L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).

... Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.

... L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.

... Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.

... L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.

... Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

ADRONAT® 70 MG

Acide Alendronique

COMPOSITION

Acide Alendronique.....	70
Équivalent à alendronate monosodique trihydraté	91,36

Excipients: q.s.p 1 comprimé.

FORMES PHARMACEUTIQUES

Comprimés dosés à 70 mg: Etui de 4 comprimés

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Bisphosphonates

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TraITEMENT de l'ostéoporose postménopausique. ADRONAT® réduit le risque

CONTRE-INDICATIONS

- Maladies de l'oesophage et autres facteurs qui retardent le transit oesophagien, tel que la sténose et l'achalasie.
- Incapacité de se mettre en position verticale ou de se tenir assis en position verticale pendant au moins 30 minutes.
- Hypersensibilité à l'alendronate ou à l'un des excipient.
- Hypocalcémie.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'ADRONAT® peut provoquer localement des effets irritants et l'aggravation d'une maladie sous-jacente, l'ADRONAT® gastro-intestinale haute évolutive, telle que dysphagie, mal de tête récents (dans l'année écoulée) d'affection gastro-intestinale en évolution, ou une intervention chirurgicale du tube digestif.
- Des réactions oesophagiennes (parfois sévères et nécessitant l'hospitalisation) et des érosions oesophagiennes, rarement suivies de sténoses avec l'alendronate. Les patientes doivent être informées du risque de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.
- De rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.
- Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.
- Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.
- L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).
- Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.
- L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.
- Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.
- L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.
- Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

ADRONAT 70 mg

Acide Alendronique
4 comprimés



6 118 000 041320

N° PV 176DH90
PER 33/20
L01 M737



... au niveau de l'oesophage si elles ne suivent pas strictement les instructions d'administration.

... de rares cas d'ulcères gastriques ou duodénaux ont été rapportés, dont certains cas sévères s'accompagnant de complications.

... Une ostéonécrose de la mâchoire a été rapportée chez des patientes présentant une ostéoporose recevant des bisphosphonates par voie orale. Un examen dentaire préventif approprié doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patientes ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticoïdes, mauvaise hygiène buccodentaire). Pendant le traitement, ces patientes doivent éviter, si possible, les interventions dentaires invasives.

... Les patientes doivent être averties qu'en cas d'oubli d'une dose d'ADRONAT® 70mg, elles doivent prendre un comprimé le lendemain matin du jour où elles s'en aperçoivent. Elles ne doivent pas prendre deux comprimés le même jour, mais revenir à la prise hebdomadaire du comprimé en se basant sur le jour choisi initialement.

... L'ADRONAT® n'est pas recommandé chez les patientes présentant une insuffisance rénale caractérisée par un taux de filtration glomérulaire (TFG) inférieur à 35 ml/min, (Cf. Posologie et mode d'administration).

... Les causes d'ostéoporose autres qu'un déficit en œstrogènes et l'âge doivent être prises en considération.

... L'hypocalcémie doit être corrigée avant de commencer le traitement avec l'ADRONAT® (Cf. Contre indications). De même, les autres troubles du métabolisme osseux (tels que les déficits en vitamine D et l'hypoparathyroïdisme) doivent également être efficacement corrigés. Chez les patientes présentant ces troubles, la calcémie et les symptômes d'hypocalcémie doivent être surveillés lors du traitement par ADRONAT®.

... Le fait d'assurer un apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important chez les patientes recevant des corticoïdes.

... L'ADRONAT® n'a pas été étudié chez l'enfant et ne doit pas lui être administré.

... Les aliments, boissons (autres que de l'eau plate faiblement minéralisée) et certains médicaments contenant des cations polyvalents (tels que calcium, magnésium, fer et aluminium) peuvent interférer avec l'absorption de l'ADRONAT® et ne doivent pas être pris simultanément.

FLEXANAT®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.
Voie Orale.

Ce produit est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer

+ dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible



FSSAI No. : 1072199900886

Pour plus d'informations sur nos produits:
Site Web : www.inquirehealth.com
Email : contact@inquirehealth.com



8 9 0 6 1 1 5 6 2 0 6 7 1

N° CE: 20212107651/V1/DMP/CA/18

N° Lot:

Fab:

À consommer avant la date EXP :

PPC : 149.00 MAD

MFLC.103
02/2023
01/2026

... mg, Stearate de Magnésium Lubrifiant, ...
Dicalcium de phosphate Liant, Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. À avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.

FLEXANAT®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.
Voie Orale.

Ce produit est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer

+ dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible



FSSAI No. : 1072199900886

Pour plus d'informations sur nos produits:
Site Web : www.inquirehealth.com
Email : contact@inquirehealth.com



8 9 0 6 1 1 5 6 2 0 6 7 1

N° CE: 20212107651/V1/DMP/CA/18

N° Lot:

Fab:

À consommer avant la date EXP :

PPC : 149.00 MAD

MFLC.103
02/2023
01/2026

... mg, Stearate de Magnésium Lubrifiant, ...
Dicalcium de phosphate Liant, Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. À avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.