

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-452390



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

1537

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

HOUBAN MOHAMED

Date de naissance :

16.06.50

Adresse :

BD JAHIA HOUSSAIN, RUE 61 N°3

NA 500

Tél. :


066 7089 117

Total des frais engagés :

#470,4 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

23 AOUT 2023

Nom et prénom du malade :

HOUBAN MOHAMED RAM

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

le Dr H. Vessie - Professeur

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

NADOR

Le : 23/08/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Houban

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/10/11	C	1	(150) <i>até</i>	INP : 081092769 Dr Hassan Hamed Medecine Generale Ble Massoum Nada Tunisie 1000 32

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Babel Bd. Tchahicien, N°65 - NADOR. N°SÉ: 092022558 - Tél: 05.36.60.55.44	23/08/23	32040

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G B			
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hassan ROBIO

Médecin Général

Diplôme d'Echographie

Diplôme d'expertise & Réparation du dommage Corporel

Ex- Médecin à l'hôpital AL HASSANI - NADOR

Vite médicale pour obtention du permis de conduire

الدكتور الحسن روبيو

الطب العام

دبلوم الفحص بالصدى

دبلوم الخبرة الطبية وتقدير الانضرار الجسدية

طبيب سابق بالمستشفى الحسني بالناظور

الفحص الطبي لليل رخصة السياقة

Nador le : 23 AOUT 2023

HOUARAN

ناظور

10970x2

TENEF LP

Dr Hassan ROBIO
Medecine Generale
FAR Rue Moscou N°4 Nador
Tel 0536 60 00 32

141

2

Pharmacie Babel

Pharmacie Babel
Bd. Taha Hcien, N°65 - NADOR
Tél: 05.36.60.55.44
NPE: 082013558 - Tel: 05.36.60.55.44

10100

2

Quinolox 200 mg

2x5

2x5

32040

Pharmacie Babel
Bd. Taha Hcien, N°65 - NADOR
Tél: 05.36.60.55.44
NPE: 082013558 - Tel: 05.36.60.55.44

Dr Hassan ROBIO
Medecine Generale
FAR Rue Moscou N°4 Nador
Tel 0536 60 00 32



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TENEF® L.P. 0,4 mg
Gélules à libération prolongée
 Chlorhydrate de tamsulosine
 Boîtes de 10 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TENEF L.P. 0,4 mg et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TENEF L.P. 0,4 mg ?

3. Comment prendre TENEF L.P. 0,4 mg ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver TENEF L.P. 0,4 mg ?

6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que TENEF L.P. 0,4 mg et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

TENEF L.P. contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

TENEF L.P. est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hyperplasie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TENEF L.P. 0,4 mg ?

Ne prenez jamais TENEF L.P. 0,4 mg dans les cas

suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).
- si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).

- si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.

- si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).

- si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TENEF L.P.

Vous devez prévenir votre médecin si :

- vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).

- vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle). Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).

- vous avez plus de 65 ans.

- vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être le signe d'une réaction au médicament. Dans ce cas, arrêtez le traitement et consulter votre médecin.

Des malaises peuvent survenir avec TENEF L.P. et des médicaments apaisants. Si vous avez des signes de vertiges ou de faiblesse ou vous sentez des sensations de malaise disparaître.

Si vous devez vous faire opérer pour un glaucome

Si vous devez vous faire opérer pour une opacification du cristallin (cataracte) ou pour une opacification de la membrane vitréenne (maculopathie), vous avez été ou êtes actuellement traité par TENEF L.P., il vous faut consulter un ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions

appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

- conservez une activité physique (marcher, courir ou faire du sport...),
- faites attention à votre alimentation : ne pas faire de repas trop riches, trop épices et/ou trop alcoolisés,
- ne buvez pas trop le soir,
- maintenez un transit intestinal régulier.

Utilisation chez les enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans, car il n'a pas d'effet thérapeutique dans cette population.

Autres médicaments et TENEF L.P. 0,4 mg

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec des médicaments de la même classe thérapeutique (alpha1-bloquants). Cette association peut entraîner une diminution de la tension artérielle.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin si vous êtes traités en même temps avec des médicaments qui peuvent diminuer l'élimination de TENEF L.P. (par exemple kétconazole, érythromycine).

TENEF L.P. 0,4 mg avec les aliments et les boissons

Sans objet

Grossesse, allaitement et fertilité

TENEF L.P. n'est pas indiqué chez la femme. La tolérance de ce médicament au cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel ne sont pas connus.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été

LOT 222896
 EXP 10.2025
 P.P.V. 109.70



Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TENEF® L.P. 0,4 mg
Gélules à libération prolongée
Chlorhydrate de tamsulosine
Boîtes de 10 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TENEF L.P. 0,4 mg et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TENEF L.P. 0,4 mg ?

3. Comment prendre TENEF L.P. 0,4 mg ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver TENEF L.P. 0,4 mg ?

6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que TENEF L.P. 0,4 mg et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

TENEF L.P. contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

TENEF L.P. est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hyperplasie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TENEF L.P. 0,4 mg ?

Ne prenez jamais TENEF L.P. 0,4 mg dans les cas

suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).
- si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).

- si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.

- si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).

- si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissemens et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TENEF L.P.

Vous devez prévenir votre médecin si :

- vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).

- vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle). Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).

- vous avez plus de 65 ans.

- vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) ou être le signe d'une réaction à ce médicament. Dans ce cas, arrêtez le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

Des malaises peuvent survenir pendant le traitement par TENEF L.P. et des médicaments apparaissent. Ces signes de vertiges ou de faiblesses peuvent survenir lorsque vous vous asseyez ou vous allongez et peuvent disparaître lorsque vous vous étirez.

Si vous devez vous faire opérer pour un glaucome

Si vous devez vous faire opérer pour un glaucome, cataracte (opacité du cristallin) ou si vous avez été ou êtes actuellement traité par TENEF L.P., informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions

appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie
Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

- conservez une activité physique (marcher, courir ou faire du sport...).
- faites attention à votre alimentation : ne pas faire de repas trop riches, trop épicés et/ou trop alcoolisés.
- ne buvez pas trop le soir.
- maintenez un transit intestinal régulier.

Utilisation chez les enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans, car il n'a pas d'effet thérapeutique dans cette population.

Autres médicaments et TENEF L.P. 0,4 mg

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec des médicaments de la même classe thérapeutique (alpha1-bloquants). Cette association peut entraîner une diminution de la tension artérielle.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même si l'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin si vous êtes traités en même temps avec des médicaments qui peuvent diminuer l'élimination de TENEF L.P. (par exemple kétocanazole, érythromycine).

TENEF L.P. 0,4 mg avec les aliments et les boissons

Sans objet

Grossesse, allaitement et fertilité

TENEF L.P. n'est pas indiqué chez la femme. La tolérance de ce médicament au cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel ne sont pas connus.

LOT 222896
EXP 10.2025
PPV 109.70



3. Comment prendre TENEF L.P. 0,4 mg ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les