

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° W21-697635

176616

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

560

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

ABAKEL HAFED

Date de naissance :

1-07-1943

Adresse :

LOT BNI-YAKHLEF N°249
RUE ALGIAFRANE Mohammed

Télé. :

Idem

Total des frais engagés :

645,90

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

15/09/2023

Nom et prénom du malade :

ABAKEL HAFED

Age :

64

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

HTA

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare

avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MOHAMMED

Le : 22/09/2023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/09/23	Cyco	300,00		INP : 006011160 CT SCUJ CHAMPS Confidentialité et sécurité de la vie privée Conformité RGPD Date : 23/09/2023

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
CE : 00298722100048 TEL : 02 33 32 76 66 SIREN : 341181818 SARL AASSLAN PHARMACEUTIQUE ASSOCIEE	15/09/23	345,90

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CABINET DE CONSULTATION & D'EXPLORATION CARDIOVASCULAIRE EL ALIA

Dr Soumia MHANNA

Spécialiste en pathologie cardiovasculaire

Echographie doppler
Holter tensionnel et Rythmique
Epreuve d'effort

Diplômée de l'Université de Médecine de Casablanca

Diplômée en Echocardiographie de Bordeaux

Ancienne Interne au CHU de Bicêtre Paris

الدكتورة سوميّة مهنة

أخصائية في أمراض القلب والشرايين

الفحص بالصدى والتخطيط الكهربائي
التسجيل المستمر للضغط الدموي وتخطيط القلب
تخطيط القلب أثناء الجهد

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
حاصلة على دبلوم الفحص بالصدى ببوردو
طبيبة داخلية سابقاً مستشفيات باريس

15/09/2023

Mohammedia, le:

Mr ABAKIL Hafed

1 - Irvel 75 mg

$$44.70 \times 2 = 89.40$$

1 Comprimé par jour MATIN . 1J/2

2 - Cardioaspirine 100 mg

$$97.40\bar{3} = 83.10$$

1 Comprimé, midi, après les repas,

3 - LD-NOR 10

$$57.80 \times 3 = 173.40$$

1 Comprimé, soir, 20H

134590

REGIME PEU SALE / TT 03 MOIS

A handwritten signature of "Dr SOUMIA MHANNA" is written diagonally across a business card. The card contains the following text:

Dr SOUMIA MHANNA
Consultant Speech Pathologist
CABINET ACCENTS
Mobile: 03 23 35 59 59
Email: dr.mhanna@outlook.com.au
N° 318, CR Mohammadi
029822100008
02 23 33 56 66
N° 1-AU
NE ASSAL

MAJSID GHOSNE ASSALA
PHARMACEUTICALS
SARL AU
Mohammadi
N 318, CR 33, ZG 66
Tél.: 05 23 33 36
Tél.: 00 298722100004R
CE : 00298722100004R
Le Beni Yakké

®

CARDIOASPIRINE

Attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
N'ez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en
mptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Les effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
é dans cette notice, parlez en à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

6 118001 090280



®

CARDIOASPIRINE

Attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
N'ez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en
mptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Les effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
é dans cette notice, parlez en à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

6 118001 090280



®

CARDIOASPIRINE

Attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
N'ez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en
mptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Les effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
é dans cette notice, parlez en à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

6 118001 090280



(maladies héréditaires rares).

IRVEL® contient du sodium : Ce médicament contient essentiellement «sans sodium».

3. COMMENT PRENDRE IRVEL® ?

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement de dose.

Poseologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence Mode et voie d'administration :

IRVEL® se prend par voie orale. Avalez les comprimés à prendre IRVEL® au cours ou en dehors des repas. Vous de même heure chaque jour. Il est important que vous continuiez Poseologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- Chez les patients ayant une pression artérielle élevée La dose habituelle est de 150 mg une seule fois par jour (2). jusqu'à 300 mg en une prise par jour (4 comprimés de 75 sur la pression artérielle.

- Chez les patients ayant une pression artérielle élevée Chez les patients ayant une pression artérielle élevée et une atteinte rénale associée est de 300 mg une fois par jour (4).

art de

Le médecin peut conseiller la prise d'une dose plus faible, en particulier lors de la mise en route du traitement chez certains patients tels que les patients sous hémodialyse ou les patients âgés de plus de 75 ans. L'effet maximal de baisse de la pression artérielle est obtenu quatre à six semaines après le début du traitement.

- Utilisation chez les enfants « et les adolescents » IRVEL® ne doit pas être administré aux enfants de moins de 18 ans. Si un enfant avale des comprimés, prévenez immédiatement votre médecin.

**75 mg, 150 mg et 300 mg
Comprimés pelliculés, boîtes de 14 et 28**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que IRVEL® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IRVEL® ?
- 3- Comment prendre IRVEL® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver IRVEL® ?
- 6- Informations supplémentaires

(maladies héréditaires rares).

IRVEL® contient du sodium : Ce médicament contient essentiellement «sans sodium».

3. COMMENT PRENDRE IRVEL® ?

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement de dose.

Poseologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence Mode et voie d'administration :

IRVEL® se prend par voie orale. Avalez les comprimés à prendre IRVEL® au cours ou en dehors des repas. Vous de même heure chaque jour. Il est important que vous continuiez Poseologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- Chez les patients ayant une pression artérielle élevée La dose habituelle est de 150 mg une seule fois par jour (2). jusqu'à 300 mg en une prise par jour (4 comprimés de 75 sur la pression artérielle.

- Chez les patients ayant une pression artérielle élevée Chez les patients ayant une pression artérielle élevée et une atteinte rénale associée est de 300 mg une fois par jour (4).

art de

Le médecin peut conseiller la prise d'une dose plus faible, en particulier lors de la mise en route du traitement chez certains patients tels que les patients sous hémodialyse ou les patients âgés de plus de 75 ans. L'effet maximal de baisse de la pression artérielle est obtenu quatre à six semaines après le début du traitement.

- Utilisation chez les enfants « et les adolescents » IRVEL® ne doit pas être administré aux enfants de moins de 18 ans. Si un enfant avale des comprimés, prévenez immédiatement votre médecin.

**75 mg, 150 mg et 300 mg
Comprimés pelliculés, boîtes de 14 et 28**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que IRVEL® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IRVEL® ?
- 3- Comment prendre IRVEL® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver IRVEL® ?
- 6- Informations supplémentaires

LD-NOR®

10 mg*, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau au moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez ce qui vous convient le mieux. Prenez LD-NOR à la même heure tous les jours à la même heure.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacie.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé dépend de l'effet obtenu. Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, contactez immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé que la dose quotidienne habituelle, consultez immédiatement votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé une ou plusieurs fois, prenez la dose manquée au plus proche pour avis.

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement une dose supplémentaire au plus proche pour compenser la dose manquée.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé sans objets, contactez immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pour un résultat optimal.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Par : *[Signature]* à personnes aux 4 000

LOT : 230730
EXP : 05/2026
PPV : 57,80DH

LD-NOR®

10 mg*, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau au moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez ce qui vous convient le mieux. Prenez LD-NOR à la même heure tous les jours à la même heure.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacie.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé
Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, contactez immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé
Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-

dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé
Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement une autre dose à la prochaine prise normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose manquée.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé
Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pour un résultat optimal.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

LOT : 230730
EXP : 05/2026
PPV : 57,80DH

LD-NOR®

10 mg*, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau au moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez ce qui vous convient le mieux. Prenez LD-NOR à la même heure tous les jours à la même heure.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacie.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé
Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, contactez immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé
Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-

dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé
Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement une autre dose à la prochaine prise normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose manquée.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé
Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pour un résultat optimal.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Par : ~~pour affecter l'heure à personnes aux 4 000~~

LOT : 230730
EXP : 05/2026
PPV : 57,80DH