

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Matricule : 3916 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : ABD LM7ID TAYAB

Date de naissance : 04 - 02 - 1953

Adresse : Derb Foukara RUE S NI 104 Casab

Tél. : 0661361373 Total des frais engagés : 1167,70 Dhs

Cachet du médecin :



Date de consultation : 19/09/2013

Nom et prénom du malade : TAYAB SAID Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Alfred MUPRAS

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 10 OCT 2013


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.


Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19/9/2023			1500 Dh	

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourmisseur	Date	Montant de la Facture
	19/9/23	1017,70

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
MONTANTS DES SOINS				MONTANTS DES SOINS
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
H	25533412	21433552		
	00000000	00000000		
D	00000000	00000000		
	35533411	11433553		
B				
G				
[Création, remont, adjonction]				DATE DU DEVIS
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
DATE DE L'EXECUTION				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				



Casablanca le :

19/9/8023

TAYAB RAID  
5x 32,70

Tegretol CR 300 { Trait de  
1/2 g le mat } 03 mois

6x 31,90 g le soir  
1/2 g + 21,50 g

Voltarene gel 60,00  
Nephlic 0,2 g.

Prasol 20 52,80 3/4th M 14

1017,70 1/2 g

درب بوشنتوف زقة 19 رقم 5 شارع بنى امكيلد الطابع الأول الدارالبيضاء

Derb Bouchentouf Rue 19 N° 5 1er étage Bd.Beni M'Guild Casablanca

Tél: 05.22.80.42.83



PPV : 52DH80  
PER : 03/24  
LOT : K2832-2

20 mg

ce avant de prendre ce médicament.

vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI) ..... 20 mg

Excipients qsp

1 gélule

#### FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastrorésistants.

- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

#### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

#### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

##### Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

##### Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel  $\geq 10$  kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

##### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

#### COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéruse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours.

Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :




LOT : M0655  
EXP : 05 2025  
PPV : 60,00 DH



# قولطارين 1% ايمولجيل توبيك

- فصال مولم في الأصابع والركبتيين:
- الجرعة المستعملة في كل تطبيق تكون بنسبة 4 غ من الجيل. ويطابق ذلك شريطًا طوله 10 سم (انظر الرسم).



مدة العلاج  
في غياب صفة طيبة، يحدد العلاج في 5 أيام.  
طريقة الاستعمال  
عن طريق موضعى.  
إدخال الجيل بذلك لطيف ومتواصل على المنطقة المولمة أو الالتهابية.

غسل اليدين جيداً بعد كل استعمال، ما عدا في حالة تطبيقه بنفسك لعلاج  
فصال مولم في الأصابع.

الاعراض والتاليمات في حالة جرعة مفرطة  
إذا استعملت قولطارين ايمولجيل توبيك 1%، جيل أكثر مما يجب.

في حالة جرعة مفرطة أو تسمم عن طريق الخطأ، ابلغ الطبيب على الفور  
4 ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

وصفات التأثيرات غير المرغوب فيها  
كثيل كافة الأدوية لدى البالغين في حالة التهاب أو تأثير الأعضاء العلوية  
جيل، تأثيرات غير مرغوب فيها، رغم أن ذلك لا يخص جميع الأشخاص.

استثنائياً قد تظهر تفاعلات قد تكون حادة:  
• تفاعلات حساسية حادة: طفح (بثور)، حكة، فقاعات.

• مشاكل تنفسية مثل الربو (تنفس صعب وقصير، شعور بقدرة تنفسية  
محدودة).

• علامات عامة مثل التأق (انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحنجرة).  
يجب توقف العلاج فوراً وإبلاغ الطبيب أو الصيدلي.

يشكل شائعاً أكثر، قد تظهر تأثيرات غير مرغوب فيها، عامة ما تكون حقيقة  
وموقتة.

• تأثيرات موضعية جلدية مثل الاحمرار، تهيج جلدي، تأكل أو تقرحات  
موضعية.

• استثنائياً جداً، تزايد الحساسية للشمسم،  
• تأثيرات عامة أخرى لمضادات الالتهابات غير الستيرويدية، حسب كمية

الجيل المطبقة، المساحة المعالجة وحالتها، مدة العلاج، استعمال أو عدم  
استعمال ضماد مغلق.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بذلك.  
إذا لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيها لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا أصبحت

يرجح الإللاع بانتهاء على هذه النشرة بأكملها قبل استعمال هذا الدواء.

• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اقصد الطبيب أو الصيدلي.

• لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه لشخص آخر،  
حتى في حال وجود أعراض مشابهة. لأنك قد تسبب المضر له.

• ما هو قولطارين ايمولجيل توبيك 1%، جيل وما هي الحالات التي يجب  
استعماله فيها؟

• ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال قولطارين ايمولجيل  
توبيك 1%، جيل؟

• كيف يجب استعمال قولطارين ايمولجيل توبيك 1%، جيل؟

• ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

• كيف يجب حفظ قولطارين ايمولجيل توبيك 1%، جيل؟

• معلومات إضافية  
• ما هو قولطارين ايمولجيل توبيك 1%، جيل وما هي الحالات التي يجب  
استعماله فيها؟

الفترة الصيدلانية العلاجية  
هذا الدواء ضار للالتهابات ومهدئ (يخفف الألم)، على شكل جيل يطبق  
على الجلد، فقط في المنطقة المولمة.

دواعي الاستعمال  
يوصى هذا الدواء لدى البالغين في حالة التهاب أو تأثير الأعضاء العلوية  
والسفلى (التهاب أو تأثير العضلات) في الوزن بعد عملية أو صدمة (ال扭伤،  
المفصل، رض) وفي تخفيف ألم الفصال في الأصابع والركبتيين.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال قولطارين ايمولجيل  
توبيك 1%، جيل؟

موانع الاستعمال  
لا تستعمل أبداً قولطارين ايمولجيل توبيك 1%، جيل في الحالات التالية:

• ابتداء من 25 أسبوعاً من انقطاع الطمث (بداية الشهر السادس من  
الحمل):

• في حالة الحساسية لهذا الدواء أو دواء مشابه، وخاصة مضادات  
الالتهابات غير الستيرويدية الأخرى، الأسيرين:

• في حالة حساسية لأحد السوائل:

• على جلد مصاب، على اختلاف الإصابات: إصابات نازة، إكزيما، إصابة  
موبيدة، حرق أو جر.

في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال: تدابير خاصة  
يجب الانتهاء عند استعمال قولطارين ايمولجيل توبيك 1%، جيل.

تحذيرات خاصة

**ISPERID® COOPER 1mg et 2 mg,**  
comprimés pelliculés en boîtes de 30.

**ISPERID® COOPER 3mg et 4 mg,**  
comprimés pelliculés en boîtes de 30.

Référence :

230609

03/2025

des

PPV : 81.90 DH

la

pour d'autres questions, interrogez votre

médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ISPERID® COOPER et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISPERID® COOPER ?

3. Comment prendre ISPERID® COOPER ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ISPERID® COOPER ?

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé et DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : le type d'activité : ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé appartiennent à un groupe de médicaments appelés « antipsychotiques ».

Indications thérapeutiques :

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé est utilisé dans les cas suivants :

• La schizophrénie, où vous pouvez entendre ou percevoir des choses qui ne sont pas là, avoir des croyances erronées ou ressentir une suspicion inhabituelle, ou vous sentir confus.

• L'épisode maniaque, au cours duquel vous pouvez vous sentir exalté, avoir une élévation de l'humeur, être agité, enthousiaste ou hyperactif. L'épisode maniaque survient au cours d'une maladie appelée « trouble bipolaire ».

• Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les personnes présentant une maladie d'Alzheimer qui peuvent nuire à elles-mêmes ou aux autres. Des traitements alternatifs non médicamenteux doivent avoir été utilisés au préalable.

• Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les enfants (âgés au moins 5 ans) et les adolescents présentant un déficit intellectuel et des troubles des conduites.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut aider à atténuer les symptômes de votre maladie et empêcher vos symptômes de réapparaître.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament.

Contre indication :

• Ne prenez jamais ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique à la rispéridone, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

• Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé si :

• Vous avez un problème cardiaque. Les exemples incluent un rythme cardiaque irrégulier ou si vous êtes sujet à une tension artérielle élevée ou si vous utilisez des médicaments pour votre tension artérielle. ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut entraîner une baisse de la tension artérielle. Votre docteur pourra nécessiter une adaptation.

• Vous avez connaissance de tout facteur qui pourra favoriser la survenue d'un accident vasculaire cérébral, tel que tension artérielle élevée, un trouble cardiovaseculaire ou l'essentiel trouble des vaisseaux sanguins du cerveau.

• Vous avez déjà présenté des mouvements involontaires de la langue, de la bouche et du visage.

• Vous avez déjà eu des symptômes incluant une température élevée, une raideur musculaire, une transpiration ou un état de conscience diminué (également connu comme le Syndrome Malin des Neuroleptiques).

• Vous avez une maladie de Parkinson ou une démence.

• Vous savez que vous avez eu par le passé un faible taux de globules blancs (qui peut ou non avoir été causé par d'autres médicaments).

• Vous êtes stéatobétique.

• Vous êtes asthénique.

• Vous êtes un homme et vous avez déjà eu une érection prolongée ou douloureuse.

• Vous avez des difficultés à contrôler votre température corporelle ou la température élevée.

• Vous avez des problèmes rénaux.

• Vous avez des problèmes hépatiques.

• Vous avez un niveau anormalement élevé d'hormone prolactine dans votre sang ou si vous avez une tumeur, potentiellement liée à la prostate.

• Vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formation de callosi sanguins, car la prise d'antipsychotiques a été associée à la formation de callosi sanguins.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Puisqu'il faut toujours prendre pour lutter contre les infections dans votre sang a été très rarement observé chez les patients prenant ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé, votre médecin peut vérifier votre numération de globules blancs.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut entraîner une prise de poids. Une prise de poids importante peut nuire à votre santé. Votre médecin doit régulièrement mesurer votre poids.

Parce que des diabètes ou la déterioration de diabètes préexistants ont été observés avec les patients prenant ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé, votre médecin doit vérifier les signes d'un taux élevé de sucre dans le sang. Chez les patients ayant un diabète préexistant, le glucose présent dans le sang doit être régulièrement contrôlé.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé augmente fréquemment le taux d'une hormone appelée « prolactine » dans le sang. Ceci peut causer des effets indésirables tels que des troubles menstruels ou des problèmes de fertilité chez les femmes, un gonflement des seins chez les hommes (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »). Si ces effets indésirables apparaissent, l'évaluation du taux de prolactine dans le sang est recommandée.

Pendant un opération des yeux pour une nébulosité du cristallin (cataracte), la pupille (le cercle noir au centre de votre œil) peut ne pas se dilater correctement. De même, l'iris (la partie colorée de l'œil) peut devenir flasque pendant l'intervention et ceci pourra entraîner une lésion oculaire. Si vous devez être opéré des yeux, assurez-vous d'informer votre ophtalmologue qui vous prenez actuellement ce médicament.

Personnes âgées/démences :

Chez les personnes âgées/démences, il y a une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Vous ne devez pas prendre de rispéridone si votre démence est causée par un accident vasculaire cérébral.

• Au cours du traitement par la rispéridone vous devez voir fréquemment votre médecin.

Un traitement médical doit être immédiatement mis en place si vous ou la personne qui s'occupe de vous remarquez un changement brutal de votre état mental ou une soudaine faiblesse ou insensibilité au niveau du visage, des bras ou

des jambes, en particulier d'un seul côté, ou une écoulement continu même pendant une période de temps courte. Ces symptômes peuvent être des signes d'accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents :

Avant de débuter un traitement dans le trouble des conduites, les autres causes de comportement agressif doivent avoir été exclues.

Si au cours du traitement par la rispéridone une fatigue survient, une modification de l'heure d'administration peut améliorer les difficultés attentionnelles.

Avant de débuter le traitement, votre poids ou celui de votre enfant pourra être mesuré et il pourra être contrôlé régulièrement au cours du traitement.

Une augmentation de la croissance chez des enfants qui ont pris la rispéridone a été rapportée dans une petite étude peu concluante, mais on ignore si c'est un effet du médicament ou si cela est dû à une autre raison.

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Il est particulièrement important de parler avec votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

• Médicaments agissant au niveau de votre cerveau pour vous aider à vous calmer (benzodiazépines) ou certains médicaments de la douleur (opiacés), médicaments contre l'alergie (contenant antihistaminiques), la rispéridone pouvant augmenter l'effet sédatif de tous ces médicaments.

• Médicaments qui peuvent changer l'activité électrique de votre cerveau, tels que les médicaments contre le paludisme, les problèmes de rythme cardiaque, les alergies (antihistaminiques), certains antidiabétiques ou d'autres médicaments destinés à des problèmes mentaux.

• Médicaments qui entraînent un ralentissement des battements du cœur.

• Médicaments qui entraînent une baisse du potassium dans le sang (par exemple certains diurétiques).

• Médicaments qui traitent la tension artérielle augmentée ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut diminuer la tension artérielle.

• Médicaments de la maladie de Parkinson (par exemple levodopa).

• Médicaments augmentant l'activité du système nerveux central (psychomimétiques), tels que le méthylphénidate.

• Comprimés facilitant l'élimination des urines (diurétiques) utilisés dans les problèmes cardiaques ou les gonflements de certaines parties de votre corps dus à une accumulation de quantités trop importantes d'eau (par exemple furosemide ou chlorothiazide). ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé pris seul ou avec du furosemide peut entraîner une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral ou de décès chez les personnes âgées/démences.

Les médicaments suivants peuvent diminuer l'effet de la rispéridone :

• Rénifampique, (un médicament pour traiter certaines infections).

• Carbamazépine, phénytoïne (médicaments de l'épilepsie).

• Phénothiazine (médicaments utilisés dans le traitement des psychoses ou pour calmer).

• Cimétidine, ranitidine (qui bloquent l'acidité de l'estomac).

• Itraconazole et ketoconazole (médicaments pour le traitement des infections fongiques).

• Certains médicaments utilisés dans le traitement du VIH/SIDA, comme le ritonavir.

• Verapamil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et/ou anomalie du rythme cardiaque.

• Sértraline et fluoxamine, médicaments utilisés pour traiter la dépression et d'autres troubles psychiatriques.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments vous pourrez avoir besoin d'une dose différente de rispéridone.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre pharmacien ou à votre pharmacien avant d'utiliser ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Interactions avec d'autres aliments, boissons et/ou l'alcool : Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture. Vous devez éviter de boire de l'alcool pendant le traitement par ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Utilisation pendant la grossesse, l'allaitement et fertilité : Si vous êtes enceinte ou que vous alliez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin déclara si vous pouvez le prendre.

• Les symptômes suivants peuvent apparaître chez les nouveau-nés dont les mères ont utilisé ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé durant le dernier trimestre (les trois derniers mois de leur grossesse) : tremblement, râle et/ou faiblesse musculaire, endormissement, agitation, problème de respiration et difficultés à s'assurer. Si votre bébé développe l'un de ces symptômes, vous devez contacter votre médecin.

• ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut augmenter la taux d'une hormone appelée « prolactine » qui peut avoir un impact sur la fertilité (voir QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?)

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines : Des sensations de vertige, une fatigue et des problèmes de vision peuvent survenir au cours du traitement par ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé. Vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines avant d'en avoir passé avec votre médecin.

Excipient à effet notoire : Lactose.

Relations relatives aux excipients à effets notoires : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre(s), contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

COMMENT PRENDRE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé ?

Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, mode d'emploi voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

La dose recommandée est la suivante :

Dans le traitement de la schizophrénie :

• Adults : La dose usuelle initiale est de 2 mg par jour, elle peut être augmentée à 4 mg par jour le second jour.

• Votre dose pourra ensuite être adaptée par votre médecin.

• La majorité des personnes se sentent mieux avec des doses journalières de 4 à 6 mg.

• Cette dose totale journalière peut être divisée en une ou deux prises. Votre médecin vous indiquera qu'il est mieux pour vous.

Personnes âgées :

• Votre dose initiale sera de 0,5 mg deux fois par jour.

• Votre dose pourra ensuite être progressivement augmentée par votre médecin à 1 mg jusqu'à 2 mg deux fois par jour.

• Votre médecin vous indiquera ce qui est le mieux pour vous.

Dans le traitement des accès maniaques :

• Adults : Votre dose initiale sera généralement de 2 mg une fois par jour.

• Votre dose pourra être progressivement augmentée par votre médecin en fonction de votre réponse au traitement.

• La majorité des personnes se sentent mieux avec des doses de 1 à 6 mg une fois par jour.



**ISPERID® COOPER 1mg et 2 mg,**  
comprimés pelliculés en boîtes de 30 et 60.

**ISPERID® COOPER 3mg et 4 mg,**  
comprimés pelliculés en boîtes de 30.

**LOT :** 230356      **avant**  
**EXP :** 02/2025      **des**  
**PPV :** 81,90DH      **de la**

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ISPERID® COOPER et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISPERID® COOPER ?

3. Comment prendre ISPERID® COOPER ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ISPERID® COOPER ?

6. Informations supplémentaires

1. QUEST-CE QUE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé et DANS QUILS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé appartenant à un

groupe de médicaments appelés « antipsychotiques ».

Indications thérapeutiques :

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé est utilisé dans les cas suivants :

• La schizophrénie, où vous pouvez voir, entendre ou percevoir des choses qui ne sont pas là, avoir des croyances étranges ou ressentir une suspicion inhabituelle, où vous sentir confus.

• L'épilepsie manique, au cours duquel vous pouvez vous sentir avec une élévation de l'humeur, être agité, enthousiaste ou hyperactif. L'épilepsie manique survient au cours d'une maladie appelée « bipolaire ».

• Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les personnes présentant une maladie d'Alzheimer qui peuvent nuire à elles-mêmes ou aux autres. Des traitements alternatifs non médicamenteux doivent avoir été utilisés au préalable.

• Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les enfants (avant au moins 5 ans) et les adolescents présentant un déficit intellectuel et des troubles des conduites.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut aider à atténuer les symptômes de votre maladie et empêcher vos symptômes de réapparaître.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament.

Contra-indication :

Ne prenez jamais ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique à la risépirdone, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé si :

• vous avez un problème cardiaque. Les exemples incluent un rythme cardiaque irrégulier ou si vous êtes sujet à une tension artérielle élevée, ou si vous utilisez des médicaments pour votre tension cardiaque. ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut entraîner une baisse de la tension artérielle. Votre docteur pourra nécessiter une adaptation.

• vous avez connaissance de tout facteur qui pourrait favoriser la survenue d'un accident vasculaire cérébral, tel qu'une tension artérielle élevée, un trouble cardiovaseculaire ou des troubles de l'assainissement sanguin du cerveau.

• vous avez ou présentez des mouvements involontaires de la langue, du bout des doigts et du visage.

• vous avez des symptômes incluant une température élevée, une raideur musculaire, une transpiration ou un état de confusion ou de diminution (également connu comme le Syndrome Malin des Neuropathies).

• vous savez que vous avez eu par le passé un faible taux de globules blancs (qui peut ou non avoir été causé par d'autres médicaments) :

- vous êtes débile.
- vous êtes épileptique.
- vous êtes à homme et vous avez déjà eu une érection prolongée ou tourelouse.
- vous avez des difficultés à contrôler votre température corporelle ou une température élevée.
- vous avez des problèmes rénaux.
- vous avez des problèmes hépatiques.
- vous avez un niveau anormalement élevé d'hormone prolactine dans votre sang ou si vous avez une tumeur, potentiellement liée à la prolactine.
- vous ou quelqu'un de votre famille avec des antécédents de formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques a été associée à la formation de caillots sanguins.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé. Puisqu'un taux dangereusement élevé d'un certain type de globules blancs nécessaires pour lutter contre les infections dans votre sang a été très rarement observé chez les patients prenant ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé, votre médecin peut vérifier votre numération de globules blancs.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut entraîner une perte de poids. Une prise de poids importante peut nuire à votre santé. Votre médecin doit régulièrement mesurer votre poids.

Puisque des diabètes ou la détérioration de diabète préexistants a été observée avec les patients prenant ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé, votre médecin doit vérifier les signes d'un taux élevé de sucre dans le sang. Chez les patients ayant un diabète préexistant, le glucose présent dans le sang doit être régulièrement contrôlé.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé augmente fréquemment le taux d'un homme nommé prolactine dans le sang. Ceci peut causer des effets indésirables tels que des troubles menstruels ou des problèmes de fertilité chez les femmes, un gonflement des seins chez les hommes (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »). Si ces effets indésirables apparaissent, l'évaluation du taux de prolactine dans le sang est recommandée.

Pendant une opération des yeux pour une nébulosité du cristallin (cataracte), la pupille (le cercle noir au centre de votre œil) peut ne pas se dilater correctement. De même, l'iris (la partie colorée de l'œil) peut devenir flasque pendant l'intervention et ceci pourrait entraîner une lésion oculaire. Si vous devez être opéré des yeux, assurez-vous d'informer votre ophtalmologiste que vous prenez actuellement ce médicament.

Personnes âgées/démences :

Chez les personnes âgées/démences, il y a une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Vous ne devez pas prendre de risépirdone si votre démence est causée par un accident vasculaire cérébral.

Si vous êtes traité par la risépirdone vous devez voir fréquemment votre médecin.

Un traitement médical doit être immédiatement mis en place si vous ou votre personne qui s'occupent de vous remarquez un changement brutal de votre état mental ou une soudaine faiblesse ou insensibilité au niveau du visage, des bras ou

des jambes, en particulier d'un seul côté, ou une élocution confuse même pendant une période de temps courte. Ces symptômes peuvent être des signes d'accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents :

Avant de débuter un traitement dans le trouble des conduites, les autres causes de comportement agressif doivent avoir été exclues.

Si au cours du traitement par la risépirdone une fatigue survient, une modification de l'heure d'administration peut améliorer les difficultés attentionnelles.

Avant de débuter le traitement, votre poids ou celui de votre enfant pourra être mesuré et il pourra être contrôlé régulièrement au cours du traitement.

Une augmentation de la croissance chez des enfants qui ont pris de la risépirdone a été rapportée dans une petite étude peu concluante, mais on ignore si c'est un effet du médicament ou si cela est dû à une autre raison.

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important de parler avec votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des produits suivants :

• Médicaments agissant au niveau de votre cerveau pour vous aider à vous calmer (benzodiazépines) ou certains médicaments de la douleur (opioïde), médicaments contre l'allergie (certains antihistaminiques), la risépirdone augmentera l'effet de tous ces médicaments.

• Médicaments qui peuvent changer l'activité électrique de votre cœur, tels que les médicaments contre la maladie des arythmies, les problèmes de rythme cardiaque, les allergies (antihistaminiques), certains antidiabétiques ou d'autres médicaments destinés à des problèmes mentaux.

• Médicaments qui entraînent un ralentissement des battements du cœur.

• Médicaments qui entraînent une baisse du potassium dans le sang (par exemple certains diurétiques).

• Médicaments qui traient la tension artérielle augmentée. ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut diminuer la tension artérielle.

• Médicaments de la maladie de Parkinson (par exemple levodopa).

• Médicaments augmentant l'activité du système nerveux central (psychostimulants, tels que le méthylphénidate).

• Comprimés facilitant l'élimination des urines (diurétiques) utilisés dans les problèmes cardiaques ou les gonflements de certaines parties de votre corps due à une accumulation de quantités trop importantes d'eau (par exemple furosemide ou chlorothiazide). ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé pris seul ou avec le furosemide peut entraîner une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral ou de décès chez les personnes âgées/démences.

Les médicaments suivants peuvent diminuer l'effet de la risépirdone :

• Antipyrine (un médicament pour traiter certaines infections).

• Carbamazépine, phénytoïne (médicaments de l'épilepsie).

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments vous pourrez avoir besoin d'une dose différente de risépirdone.

Les médicaments suivants peuvent augmenter l'effet de la risépirdone :

• Quinidine (utilisée dans certains types de maladie du cœur).

• Antidiabétiques tels que paroxétine, fluoxétine, imipramine, tricycliques.

• Médicaments appels bêta-bloquants (utilisés pour traiter une tension artérielle élevée).

• Phénothiazines (médicaments utilisés dans le traitement des psychoses ou pour calmer).

• Cimétidine, ranitidine (qui bloquent l'acidité de l'estomac).

• Itraconazole et kétoconazole (médicaments pour le traitement des infections fongiques).

• Certains médicaments utilisés dans le traitement de l'VIH/SIDA, comme le ritonavir.

• Vérapamil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et/ou anomalies du rythme cardiaque.

• Sertraline et fluoxamine, médicaments utilisés pour traiter la dépression et d'autres troubles psychiatriques.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments vous pourrez avoir besoin d'une dose différente de risépirdone.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Interactions avec des aliments, boissons et de l'alcool :

Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture. Vous devez éviter de boire de l'alcool pendant le traitement par ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Utilisation pendant la grossesse, l'allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de concevoir une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez le prendre.

Le symptôme suivants peuvent apparaître chez nouveau-nés dont les mères ont utilisé ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé durant le dernier trimestre (trois derniers mois de leur grossesse) : tremblement, raidissement, faiblesse musculaire, endormissement, agitation, problème de respiration et difficultés à s'alimenter. Si votre bébé développe l'un de ces symptômes, vous devriez contacter votre médecin.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut augmenter le taux d'une hormone appelée « prolactine » qui peut avoir un impact sur la fertilité (VOIR QELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?)

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou utiliser des machines :

Le sommeil peut entraîner des vertiges, une fatigue et des problèmes de vision, peuvent survenir au cours du traitement par ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé. Vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines avant d'avoir parlé avec votre médecin.

Exception à effet rotatoire : Lactose.

Mentionnées relatives aux complications à effets notoires :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance certains succès, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladie héréditaire rares).

3. COMMENT PRENDRE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé :

Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, mode et/ou voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

La dose recommandée est la suivante :

Adultes :

• La dose usuelle initiale est de 2 mg par jour, elle peut être augmentée à 4 mg par jour le second jour.

• Votre dose pourra ensuite être adaptée par votre médecin en fonction de la façon dont vous répondez au traitement.

• La majorité des personnes se sentent mieux avec des doses journalières de 4 à 6 mg.

• Cette dose totale journalière peut être divisée en une ou deux prises. Votre médecin vous indiquera ce qui est le mieux pour vous.

• Personnes âgées :

• Votre dose initiale sera normalement de 0,5 mg deux fois par jour.

• Votre dose pourra ensuite être progressivement augmentée par votre médecin à 1 mg jusqu'à 2 mg deux fois par jour.

• Votre médecin vous indiquera ce qui est le mieux pour vous.

Dans le traitement des accès maniaques :

Adultes :

• Votre dose initiale sera généralement de 2 mg une fois par jour.

• Votre dose pourra être progressivement augmentée par votre médecin en fonction de votre réponse au traitement.

• La majorité des personnes se sentent mieux avec des doses de 1 à 6 mg une fois par jour.

**ISPERID® COOPER**  
comprimés pelliculés en boîtes de 30

**ISPERID® COOPER 3 mg et 4 mg,**  
comprimés pelliculés

30

LOT : 230609  
EXP : 03/2025  
PPV : 81,90DH

ne donnez jamais à d'autres personnes. Il pourra leur être tout, même si les signes de leur maladie sont identiques à vos.

\* Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ISPERID® COOPER et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISPERID® COOPER ?
3. Comment prendre ISPERID® COOPER ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ISPERID® COOPER ?
6. Informations supplémentaires

**1. QU'EST-CE QUE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés « antipsychotiques ».

**Indications thérapeutiques :**

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé est utilisé dans les cas suivants :

- La schizophrénie, où vous pouvez voir, entendre ou percevoir des choses qui ne sont pas là, avoir des croyances erronées ou ressentir une suspicion inquiétante, ou vous sentir confus.

- L'épilepsie manique, au cours duquel vous pouvez vous sentir excité, avoir une élévation de l'humeur, être agité, enthousiaste ou hyperactif. L'épilepsie manique survient au cours d'une maladie appelée « bulle bipolaire ».

- Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les personnes présentant une maladie d'Alzheimer qui peuvent nuire à elles-mêmes et aux autres. Des traitements alternatifs non médicamenteux doivent avoir été utilisés au préalable.

- Le traitement à court terme (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les enfants (au moins 5 ans) et les adolescents présentant un déficit intellectuel et des troubles des conduites.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut aider à atténuer les symptômes de votre maladie et empêcher vos symptômes de réapparaître.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé ?**

Liste des informations nécessaire avant la prise du médicament.

**Contre indication :**

Ne prenez jamais ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rispéridone, ou à l'un des autres composants connus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé si :

problème cardiaque. Les exemples indiquent une irrégularité ou si vous êtes sujet à une confusion mentale pendant une période de temps courte. Ces symptômes peuvent être des signes d'accident vasculaire cérébral.

**Enfants et adolescents :**

Avant de débuter un traitement dans le trouble des enfants, les autres causes de comportement agressif doivent être éliminées.

Si au cours du traitement par la rispéridone une fatigue s'ajoute, une modification de l'heure d'administration peut améliorer les difficultés aériennes.

Avant de débuter le traitement, votre poids ou celui de votre enfant pourra être mesuré et il pourra être contrôlé régulièrement au cours du traitement.

Une augmentation de la croissance chez des enfants qui ont pris de la rispéridone a été rapportée dans une petite étude peu concluante, mais on ignore si c'est un effet du médicament ou si cela est dû à une autre raison.

**Interactions avec d'autres médicaments :**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important de parler avec votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des produits suivants :

- Médicaments agissant au niveau de votre cerveau pour vous aider à vous calmer (benzodiazépines) ou certains médicaments de la douleur (opiacés), médicaments contre l'allergie (certains antihistaminiques), la rispéridone pouvant augmenter l'effet sédatif de tous ces médicaments.

- Médicaments qui peuvent changer l'activité électrique de votre cerveau, tels que les médicaments contre le paludisme, les problèmes de rythme cardiaque, les allergies (antihistaminiques), certains antidiépresseurs ou d'autres médicaments destinés à des problèmes mentaux.

- Médicaments qui entraînent un ralentissement des battements du cœur.

- Médicaments qui entraînent une baisse du potassium dans le sang (par exemple certains diurétiques).

- Médicaments qui entraînent la tension artérielle augmentée.

ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut diminuer la tension artérielle.

- Médicaments de la maladie de Parkinson (par exemple levodopa).

- Médicaments augmentant l'activité du système nerveux central (psychotropes), tels que le méthylphenidate.

- Combinés médicaments qui éliminent les urines (diurétiques) ou diminuent dans les problèmes cardiaques ou les gonflements de certaines parties de votre corps due à une accumulation de matières trop importantes d'eau (par exemple furosemide ou chlorothiazide). ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé pris seul ou avec ou du furosemide peut entraîner une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral ou de décès chez les personnes âgées éléments.

Les médicaments suivants peuvent diminuer l'effet de la rispéridone :

- Risperidone (un médicament pour traiter certaines infections).

- Carbamazépine, phénobarbital (médicaments de l'épilepsie).

- Phénobarbital.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments, vous pourrez avoir besoin d'une dose différente de rispéridone.

Les médicaments suivants peuvent augmenter l'effet de la rispéridone :

- Quinidine (utilisée dans certains types de maladie du cœur).

- Antidiépresseurs tels que paroxétine, fluoxétine, antidiépresseurs tricycliques.

- Médicaments appelés bêta-bloquants (utilisés pour traiter une tension artérielle élevée).

- Phénothiazine (médicaments utilisés dans le traitement des psychoses ou pour calmer).

- Cimétidine, ranitidine (qui bloquent l'acidité de l'estomac).

- Itraconazole et kétconazole (médicaments pour le traitement des infections fongiques).

- Certains médicaments utilisés dans le traitement de l'HTSAH, comme le ritonavir.

- Vérapamil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et/ou anomalies du rythme cardiaque.

- Sertaline et fluoxétine, médicaments utilisés pour traiter la dépression et autres troubles psychiatriques.

des jambes, en particulier d'un seul côté, ou une élocution confuse même pendant une période de temps courte. Ces symptômes peuvent être des signes d'accident vasculaire cérébral.

**Enfants et adolescents :**

Avant de débuter un traitement dans le trouble des enfants, les autres causes de comportement agressif doivent être éliminées.

Si au cours du traitement par la rispéridone une fatigue s'ajoute, une modification de l'heure d'administration peut améliorer les difficultés aériennes.

Avant de débuter le traitement, votre poids ou celui de votre enfant pourra être mesuré et il pourra être contrôlé régulièrement au cours du traitement.

Une augmentation de la croissance chez des enfants qui ont pris de la rispéridone a été rapportée dans une petite étude peu concluante, mais on ignore si c'est un effet du médicament ou si cela est dû à une autre raison.

**Interactions avec d'autres médicaments :**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important de parler avec votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des produits suivants :

- Médicaments agissant au niveau de votre cerveau pour vous aider à vous calmer (benzodiazépines) ou certains médicaments de la douleur (opiacés), médicaments contre l'allergie (certains antihistaminiques), la rispéridone pouvant augmenter l'effet sédatif de tous ces médicaments.

- Médicaments qui peuvent changer l'activité électrique de votre cerveau, tels que les médicaments contre le paludisme, les problèmes de rythme cardiaque, les allergies (antihistaminiques), certains antidiépresseurs ou d'autres médicaments destinés à des problèmes mentaux.

- Médicaments qui entraînent un ralentissement des battements du cœur.

- Médicaments qui entraînent une baisse du potassium dans le sang (par exemple certains diurétiques).

- Médicaments qui entraînent la tension artérielle augmentée.

- Médicaments de la maladie de Parkinson (par exemple levodopa).

- Médicaments augmentant l'activité du système nerveux central (psychotropes), tels que le méthylphenidate.

- Combinés médicaments qui éliminent les urines (diurétiques) ou diminuent dans les problèmes cardiaques ou les gonflements de certaines parties de votre corps due à une accumulation de matières trop importantes d'eau (par exemple furosemide ou chlorothiazide). ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé pris seul ou avec ou du furosemide peut entraîner une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral ou de décès chez les personnes âgées éléments.

Les médicaments suivants peuvent diminuer l'effet de la rispéridone :

- Quinidine (utilisée dans certains types de maladie du cœur).

- Antidiépresseurs tels que paroxétine, fluoxétine,

- antidiépresseurs tricycliques.

- Médicaments appelés bêta-bloquants (utilisés pour traiter une tension artérielle élevée).

- Phénothiazine (médicaments utilisés dans le traitement des psychoses ou pour calmer).

- Cimétidine, ranitidine (qui bloquent l'acidité de l'estomac).

- Itraconazole et kétconazole (médicaments pour le traitement des infections fongiques).

- Certains médicaments utilisés dans le traitement de l'HTSAH, comme le ritonavir.

- Vérapamil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et/ou anomalies du rythme cardiaque.

- Sertaline et fluoxétine, médicaments utilisés pour traiter la dépression et autres troubles psychiatriques.

Si vous commencez ou arrêtez un traitement avec ces médicaments vous pourrez avoir besoin d'une dose supplémentaire de rispéridone.

Si vous n'êtes pas certain que ce qui précéde s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien d'avant d'utiliser ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé.

Vous pouvez également prendre ce médicament avec ou sans repas.

Vous devrez prendre ce médicament au moins 15 minutes avant de prendre la grossesse, l'allaitement et fertiliser.

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de concevoir une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez le prendre.

• Les symptômes suivants peuvent apparaître chez les nouveau-nés, dont les mères ont utilisé ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé durant le dernier trimestre (les trois derniers mois de leur grossesse) : tremblement, raidissement, faiblesse musculaire, endormissement, agitation, problème de respiration et difficultés à s'alimenter. Si votre bébé développe l'un de ces symptômes, vous devrez contacter votre médecin.

• ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peut augmenter le taux d'une hormone appelée « prolactine » qui peut avoir un impact sur la fertilité (voir QUELS SONT LES EFFETS DÉSIRABLES ÉVENTUELS ?)

**Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Des sensations de vertige, une fatigue et des problèmes de vision peuvent survenir au cours du traitement par ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé. Vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines avant d'en avoir parlé avec votre médecin.

• **Exception à effet notoire : Lacrime.**

**Mentions relatives aux exceptions à effets notoire :**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains succès, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un délit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladie héréditaire rare).

**3. COMMENT PRENDRE ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé**

Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, mode d'emploi (voie) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

• La dose recommandée est la suivante :

• Dans le traitement de la schizophrénie :

• **Adultes :**

- La dose initiale est de 2 mg par jour, elle peut être augmentée à 4 mg par jour le second jour.

- Votre dose pourra ensuite être adaptée par votre médecin en fonction de la façon dont vous répondez au traitement.

- La majorité des personnes se sentent mieux avec des doses journalières de 4 à 6 mg.

- Cette dose totale journalière peut être divisée en deux ou deux prises. Votre médecin vous indiquera ce qui est le mieux pour vous.

• **Personnes âgées :**

- Votre dose initiale sera normalement de 0,5 mg deux fois par jour.

- Votre dose pourra ensuite être progressivement augmentée par votre médecin à 1 mg jusqu'à 2 mg deux fois par jour.

- Votre médecin vous indiquera ce qui est le mieux pour vous.

**Dans le traitement des accès maniaques :**

• **Adultes :**

- Votre dose initiale sera généralement de 2 mg une fois par jour.

- Votre dose pourra être progressivement augmentée par votre médecin en fonction de votre réponse au traitement.

- La majorité des personnes se sentent mieux avec des doses de 1 à 6 mg une fois par jour.

LOT : 221810  
EXP : 12/2024  
PPV : 81,90 DH

réapparaît. Si votre médecin décide d'arrêter ce traitement, votre posologie pourra être progressivement réduite sur plusieurs jours.  
avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin pharmacien

### SONT LES EFFETS INDESIRABLES

S 7

La posologie sera généralement de 0,25 mg (0,25 mg d'ISPERID® COOPER 1 mg/ml, solution buvable) deux fois par jour.

• Votre dose pourra être progressivement augmentée par votre médecin en fonction de votre réponse au traitement.

• La majorité des personnes se sentent mieux avec 0,5 mg deux fois par jour. Certains patients peuvent avoir besoin de 1 mg deux fois par jour.

• La durée du traitement chez les patients présentant une maladie d'Alzheimer ne doit pas dépasser 6 semaines.

**Utilisation chez les enfants et les adolescents :**  
Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne doivent pas être traités par ISPERID® COOPER pour la schizophrénie ou les accès maniaques.

**Dans le traitement du trouble des conduites :**  
La dose dépendra du poids de votre enfant :

• Pour un enfant de moins de 50 kg :  
La dose initiale sera normalement de 0,25 mg (0,25 ml d'ISPERID® COOPER 1 mg/ml, solution buvable) une fois par jour.

• La dose pourra être augmentée tous les deux jours par patients de 0,25 mg par jour.

• La dose d'entretien usuelle est de 0,25 mg à 0,75 mg (0,25 ml à 0,75 ml d'ISPERID® COOPER 1 mg/ml, solution buvable) une fois par jour.

Pour un enfant de 50 kg ou plus :

• La dose initiale sera normalement de 0,5 mg une fois par jour.

• La dose pourra être augmentée tous les deux jours par patients de 0,5 mg par jour.

• La dose d'entretien usuelle est de 0,5 mg à 1,5 mg une fois par jour.

La durée du traitement dans le trouble des conduites ne doit pas dépasser 6 semaines.

Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas être traités par ISPERID® COOPER pour un trouble des conduites.

**Patients présentant des problèmes rénaux ou hépatiques :**

Indépendamment de la maladie à traiter, toutes les doses initiales et les doses suivantes de rispédoncine doivent être diminuées par deux.

L'augmentation des doses doit être plus lente chez ces patients.

La rispédoncine doit être utilisée avec prudence chez ce groupe de patients.

**Mode et voie d'administration :**  
Administration par voie orale.

Vous devez avaler votre comprimé avec de l'eau.

**Si vous avez pris plus d'ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé que vous n'en aviez dû :**

Contacter immédiatement un médecin. Emportez la boîte de médicament avec vous.

En cas de surdosage vous pourrez vous sentir somnolent ou pâle, ou avoir des mouvements anormaux du corps, des difficultés à vous tenir debout et à marcher, ou avoir des battements anormaux du cœur ou des convulsions.

**Si vous oubliez de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé :**

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rappelez. Cependant, si c'est presque le moment de prendre la prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée et continuez votre traitement comme d'habitude.

Si vous avez oublié deux doses ou plus, contactez votre médecin.

**Si vous avez pris de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre :**

Si vous avez pris de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre, vous ne devrez pas arrêter de prendre ce médicament sans que votre médecin vous ait dit de le faire. Vos symptômes

réapparaîtront. Si votre médecin décide d'arrêter ce traitement, votre posologie pourra être progressivement réduite sur plusieurs jours.

avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin pharmacien

• Troubles du sommeil, irritabilité, dépression, anxiété, agitation.

• **Dystonie :** C'est un état impliquant une contraction involontaire lente ou soutenue des muscles. Bien que n'importe quelle partie du corps peut être touchée (et peut entraîner une posture anormale), la dystonie implique souvent les muscles du visage, y compris les mouvements normaux des yeux, de la bouche, de la langue ou de la mâchoire.

• Sensation vertigineuse.

• **Dyskinesie :** C'est un état impliquant des mouvements musculaires involontaires, et peut inclure des mouvements répétitifs, spastiques ou tortus, ou des secousses.

• **Tremblement (accousses) :**

• **Vision floue, infection de l'œil ou « cell rose » :** • Rythme cardiaque rapide, hypertension artérielle, essoufflement.

• **Mau de gorge, toux, saignements de nez,nez bouché :** • Douleur abdominale, gêne abdominale, vomissement, nausées, constipation, diarrhée, indigestion, sécheresse buccale, mal de dent.

• **Eruption cutanée, rougeur de la peau :**

• **Spasmes musculaires, douleur osseuse ou musculaire, douleur crâniale, douleur articulaire :**

• **Incontinence urinaire (émission involontaire d'urines) :**

• **Confitement du visage, de la bouche, des yeux ou des lèvres :** • Diminution de la température corporelle.

• **Changement dans son façon de marcher :**

• **Sensation de soif, sensation de malaise, gêne au niveau de la poitrine, ne pas se sentir bien, gêne :**

• **Augmentation des transaminases hépatiques dans votre sang, augmentation des GGT (une enzyme hépatique appelée gamma-glutamyltransférase) dans votre sang, augmentation des enzymes du foie de votre sang :**

• **Douleur liée à l'administration :**

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :**

• Infection des voies respiratoires, infection de la vessie, infection de l'œil, infection des amygdales, infection fongique des ongles, infection cutanée, une infection limitée à une seule zone de la peau ou à une partie du corps, infection virale, inflammation cutanée causée par des acariens.

• Diminution d'un type de globules blancs qui aident à vous protéger contre les infections, diminution du nombre de globules blancs, diminution des plaquettes (cellules sanguines qui vous aident à arrêter les saignements), diminution des globules rouges, augmentation des éosinophiles (un type de globules blancs) dans votre sang.

• Réaction allergique.

• Diabète ou augmentation de diabète, augmentation du taux de sucre dans le sang, consommation excessive d'eau.

• Perde de poids, perte d'appétit entraînant maigrissement et faible poids corporel.

• Augmentation du cholestérol dans votre sang.

• Humeur exaltée (manie), confusion, diminution du désir sexuel, nerf梢性, cauchemars.

• Non réponse aux stimuli, perte de conscience, faible niveau de conscience.

• Convulsions (crises), évanouissement.

• Besoin impératif de bouger des parties de votre corps, trouble de l'équilibre, anomalies de la coordination, sensation vertigineuse lors du passage à la position debout, perturbation de l'attention, problème d'élocution, perte ou altération du goût, sensation de la peau à la douleur et au toucher diminuée, sensation de picotement, de piqûre, ou un engourdissement de la peau.

• Hypersensibilité des yeux à la lumière, sécheresse oculaire, augmentation des larmes, rougeur des yeux.

• Césarienne, augmentation de l'urine, augmentation dans les oreilles, douleur de l'oreille.

• **Fibrillation auriculaire (rythme cardiaque anormal), intérrompue : la conduction entre les parties supérieure et inférieure du cœur, conduction électrique anormale du cœur, allongement de l'intervalle QT de votre cœur, ralentissement du rythme cardiaque, trace électrique anormale du cœur (électrocardiogramme ou ECG), sentiment de battements ou pulsations dans votre poitrine (palpitations).**

• **Tension artérielle basse, tension artérielle basse en position debout (par conséquent, certaines personnes prenant ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peuvent se sentir fatiguées, mal à l'aise ou évanouies lorsqu'elles se mettent debout ou redressent soudainement), bouffées de chaleur.**

• **Pneumonie causée par l'inhalation d'aliments, congestion pulmonaire, congestion des voies respiratoires, crachements pulmonaires, respiration sifflante, maux de gorge, troubles des voies respiratoires.**

• Infection de l'estomac ou des intestins, incontinence fécale, selles très dures, difficultés à avaler, flatulence.

• Urticaire, démagréance, perte de cheveux, épaissement de la peau, eczéma, sécheresse cutanée, décoloration de la peau,空调, démagréance squameuse de la peau ou de la peau, troubles cutanés, lésions cutanées.

• Augmentation des CPK (créatine phosphokinase) dans votre sang, enzyme qui est parfois libérée lors de rupture musculaire.

• **Perte anormale, rideau articulaire, enflure des articulations, faiblesse musculaire, douleur au cou :**

• **Envies fréquentes d'uriner, incapacité à uriner, douleur en urinant :**

• **Dysfonctionnement fréctal, trouble de l'éjaculation :**

• **Perte des règles, absence de menstruation ou autres problèmes avec vos règles (chez la femme) :**

• **Développement des seins chez les hommes, écoulement de lait au niveau des seins, dysfonctionnement sexuel, douleur mammaire, gêne mammaire, écoulement vaginal :**

• **Confitement du visage, de la bouche, des yeux ou des lèvres :**

• **Frissons, augmentation de la température corporelle :**

• **Changement dans votre façon de marcher :**

• **Sensation de soif, sensation de malaise, gêne au niveau de la poitrine, ne pas se sentir bien, gêne :**

• **Augmentation des transaminases hépatiques dans votre sang, augmentation des GGT (une enzyme hépatique appelée gamma-glutamyltransférase) dans votre sang, augmentation des enzymes du foie de votre sang :**

• **Douleur liée à l'administration :**

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :**

• Infection.

• **Sécrétion inappropriée d'une hormone qui contrôle le volume d'urine :**

• **Problème des conduites alimentaires lié au sommeil :**

• **Présence de sucre dans les urines, hypoglycémie, taux élevé de triglycérides sanguin (un type de graisse) :**

• **Problème d'émotion, incapacité à atteindre l'orgasme, éjaculation (émission de sperme) ou de réponse pendant l'état éveillé (réaction :**

• **Problèmes de vaisseaux sanguins dans le cerveau :**

• **Secousses de la tête :**

• **Glaucome (augmentation de la pression dans le globe oculaire), problèmes dans les mouvements de vos yeux, yeux rouants, formation de croutes au niveau du bord des paupières.**

• **Pertes oculaires pendant une chirurgie de la cataracte :**

• **Pendant une chirurgie de la cataracte, un état appelé syndrome de l'iris hypotonique peropératoire (SIHP) peut survenir si vous prenez ou avez pris ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé. Si vous avez besoin d'une chirurgie de la cataracte, assurez-vous d'informer votre ophtalmologiste que vous prenez ou avez pris ce médicament.**

• **Nombre dangereusement faible d'un certain type de globules blancs nécessaires pour lutter contre les infections dans votre sang :**

• **Prise excessive d'eau pouvant être dangereuse.**

• **Battement cardiaque irrégulier :**

• **Inflammation du pancréas, obstruction intestinale.**

• **Confitement de la langue, lèvres gercées, éruption cutanée liée au médicament.**

• **Pellicules.**

• **Cassure des fibres musculaires et douleurs musculaires (myopathie).**

• **Retard des règles, élargissement des glandes mammaires, élargissement des seins, écoulements mammaires.**

• **Augmentation de l'insuline (hormone qui contrôle le niveau de sucre sanguin) dans votre sang.**

• **Durcissement de la peau.**

• **Température corporelle diminuée, refroidissement des bras et des jambes.**

• **Symptômes de suravage médicamenteux.**

• **Augmentation de la peau et des yeux (jaunisse).**

**Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) :**

LOT : 221810  
EXP : 12/2024  
PPV : 81,90 DH

réapparaît. Si votre médecin décide d'arrêter ce traitement, votre posologie pourra être progressivement réduite sur plusieurs jours.  
avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin pharmacien

### SONT LES EFFETS INDESIRABLES

S 7

La posologie sera généralement de 0,25 mg (0,25 mg d'ISPERID® COOPER 1 mg/ml, solution buvable) deux fois par jour.

• Votre dose pourra être progressivement augmentée par votre médecin en fonction de votre réponse au traitement.

• La majorité des personnes se sentent mieux avec 0,5 mg deux fois par jour. Certains patients peuvent avoir besoin de 1 mg deux fois par jour.

• La durée du traitement chez les patients présentant une maladie d'Alzheimer ne doit pas dépasser 6 semaines.

**Utilisation chez les enfants et les adolescents :**

Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne doivent pas être traités par ISPERID® COOPER pour la schizophrénie ou les accès maniaques.

**Dans le traitement du trouble des conduites :**

La dose dépendra du poids de votre enfant :

• Pour un enfant de moins de 50 kg :

• La dose initiale sera normalement de 0,25 mg (0,25 ml d'ISPERID® COOPER 1 mg/ml, solution buvable) une fois par jour.

• La dose pourra être augmentée tous les deux jours par patients de 0,25 mg par jour.

• La dose d'entretien usuelle est de 0,25 mg à 0,75 mg (0,25 ml à 0,75 ml d'ISPERID® COOPER 1 mg/ml, solution buvable) une fois par jour.

Pour un enfant de 50 kg ou plus :

• La dose initiale sera normalement de 0,5 mg une fois par jour.

• La dose pourra être augmentée tous les deux jours par patients de 0,5 mg par jour.

• La dose d'entretien usuelle est de 0,5 mg à 1,5 mg une fois par jour.

La durée du traitement dans le trouble des conduites ne doit pas dépasser 6 semaines.

Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas être traités par ISPERID® COOPER pour un trouble des conduites.

**Patients présentant des problèmes rénaux ou hépatiques :**

Indépendamment de la maladie à traiter, toutes les doses initiales et les doses suivantes de rispédone doivent être diminuées par deux.

L'augmentation des doses doit être plus lente chez ces patients.

La rispédone doit être utilisée avec prudence chez ce groupe de patients.

**Mode et voie d'administration :**

Administration par voie orale.

Vous devez avaler votre comprimé avec de l'eau.

Si vous avez pris plus d'ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé que vous n'en aviez dû :

Contacter immédiatement un médecin. Emportez la boîte de médicament avec vous.

En cas de surdosage vous pourrez vous sentir somnolent ou pâle, ou avoir des mouvements anormaux du corps, des difficultés à vous tenir debout et à marcher, ou avoir des battements anormaux du cœur ou des convulsions.

Si vous oubliez de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé :

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rappelez. Cependant, si c'est presque le moment de prendre la prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée et continuez votre traitement comme d'habitude. Si vous avez oublié deux doses ou plus, contactez votre médecin.

Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez décidé de prendre ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé :

Vous ne pouvez pas arrêter de prendre ce médicament sans que votre médecin vous ait dit de le faire. Vos symptômes

réapparaîtront. Si votre médecin décide d'arrêter ce traitement, votre posologie pourra être progressivement réduite sur plusieurs jours.  
avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin pharmacien

• Troubles du sommeil, irritabilité, dépression, anxiété, agitation.

• **Dystonie :** C'est un état impliquant une contraction involontaire lente ou soutenue des muscles. Bien que n'importe quelle partie du corps peut être touchée (et peut entraîner une posture anormale), la dystonie implique souvent les muscles du visage, y compris les mouvements normaux des yeux, de la bouche, de la langue ou de la mâchoire.

• Sensation vertigineuse.

• **Dyskinésie :** C'est un état impliquant des mouvements musculaires involontaires, et peut inclure des mouvements répétitifs, spastiques ou tortus, ou des secousses.

• **Tremblement (accousses) :**

• **Vision floue, infection de l'œil ou « cell rose » :**

• **Rythme cardiaque rapide, hypertension artérielle, essoufflement :**

• **Mau de gorge, toux, saignements de nez,nez bouché :**

• **Douleur abdominale, gêne abdominale, vomissement, nausées, constipation, diarrhée, indigestion, sécheresse buccale, mal de dent :**

• **Eruption cutanée, rougeur de la peau :**

• **Spasmes musculaires, douleur osseuse ou musculaire, douleur丛丛, douleur articulaire :**

• **Incontinence urinaire (émission involontaire d'urines) :**

• **Confitement du visage, des bras ou des jambes, fièvre, douleur de poitrine, faiblesse, fatigue (épuisement), douleur, Crute :**

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :**

• Infection des voies respiratoires, infection de la vessie, infection de l'œil, infection des amygdales, infection fongique des ongles, infection cutanée, une infection limitée à une seule zone de la peau ou à une partie du corps, infection virale, inflammation cutanée causée par des acariens.

• Diminution d'un type de globules blancs qui aident à vous protéger contre les infections, diminution du nombre de globules blancs, diminution des plaquettes (cellules sanguines qui vous aident à arrêter les saignements), diminution des globules rouges, augmentation des éosinophiles (un type de globules blancs) dans votre sang.

• Réactions allergiques :

• Diabète ou augmentation de diabète, augmentation du taux de sucre dans le sang, consommation excessive d'eau.

• Perde de poids, perte d'appétit entraînant maigrissement et faible poids corporel.

• Augmentation du cholestérol dans votre sang.

• Humeur exaltée (manie), confusion, diminution du désir sexuel, nerf梢, cauchemars.

• Non réponse aux stimuli, perte de conscience, faible niveau de conscience.

• Convulsions (crises), évanouissement.

• Besoin impératif de bouger des parties de votre corps, trouble de l'équilibre, anomalies de la coordination, sensation vertigineuse lors du passage à la position debout, perturbation de l'attention, problème d'élocution, perte ou altération du goût, sensation de la peau à la douleur et au toucher diminuée, sensation de picotement, de piqûre, ou un engourdissement de la peau.

• Hypersensibilité des yeux à la lumière, sécheresse oculaire, augmentation des larmes, rougeur des yeux.

• Césarienne, augmentation de larmes, rougeur des yeux.

• Céphalées, augmentation de la tension dans les oreilles, douleur de l'oreille.

• **Fibrillation auriculaire (rythme cardiaque anormal), intérupcion de la conduction entre les parties supérieure et inférieure du cœur, conduction électrique anormale du cœur, allongement de l'intervalle QT de votre cœur, ralentissement du rythme cardiaque, trace électrique anormale du cœur (électrocardiogramme ou ECG), sentiment de battements ou pulsations dans votre poitrine (palpitations).**

• Tension artérielle basse, tension artérielle basse en position debout (par conséquent, certaines personnes prenant ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé peuvent se sentir fatiguées, mal à l'aise ou évanouies lorsqu'elles se mettent debout ou redressent soudainement), bouffées de chaleur.

• Pneumonie causée par l'inhalation d'aliments, congestion pulmonaire, congestion des voies respiratoires, crachements pulmonaires, respiration sifflante, maux de gorge, troubles des voies respiratoires.

• Infection de l'estomac ou des intestins, incontinence fécale, selles très dures, difficultés à avaler, flatulence.

• Urticaire, démagréance, perte de cheveux, épaissement de la peau, eczéma, sécheresse cutanée, décoloration de la peau,空调, démagréance squameuse de la peau ou de la peau, troubles cutanés, lésions cutanées.

• Augmentation des CPK (créatine phosphokinase) dans votre sang, enzyme qui est parfois libérée lors de rupture musculaire.

• **Parure anomale, rideau articulaire, enflure des articulations, faiblesse musculaire, douleur au cou :**

• **Envies fréquentes d'uriner, incapacité à uriner, douleur en urinant :**

• **Dysfonctionnement fréctal, trouble de l'éjaculation.**

• **Perte des règles, absence de menstruation ou autres problèmes avec vos règles (chez la femme) :**

• **Développement des seins chez les hommes, écoulement de lait au niveau des seins, dysfonctionnement sexuel, douleur mammaire, gêne mammaire, écoulement vaginal.**

• **Confitement du visage, de la bouche, des yeux ou des lèvres :**

• **Frissons, augmentation de la température corporelle.**

• **Changement dans votre façon de marcher.**

• **Sensation de soif, sensation de malaise, gêne au niveau de la poitrine, ne pas se sentir bien, gêne.**

• **Augmentation des transaminases hépatiques dans votre sang, augmentation des GGT (une enzyme hépatique appelée gamma-glutamyltransférase) dans votre sang, augmentation des enzymes du foie de votre sang.**

• **Douleur liée à l'administration.**

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :**

• Infection.

• **Sécrétion inappropriée d'une hormone qui contrôle le volume d'urine :**

• **Somnambulisme :**

• **Problème des conduites alimentaires lié au sommeil :**

• **Présence de sucre dans les urines, hypoglycémie, taux élevé de triglycérides sanguin (un type de graisse).**

• **Problème d'émotion, incapacité à atteindre l'orgasme, éjaculation (émission de sperme) ou de répondre pendant l'éjaculation (atténuation).**

• **Problèmes de vaisseaux sanguins dans le cerveau.**

• **Secousses de la tête.**

• **Glaucome (augmentation de la pression dans le globe oculaire), problèmes dans les mouvements de vos yeux, yeux rouants, formation de croutes au niveau du bord des paupières.**

• **Perturbation de la cataracte pendant une chirurgie de la cataracte, syndrome de l'iris hypotonique peropératoire (SIHP) peut survenir si vous prenez ou avez pris ISPERID® COOPER, comprimé pelliculé. Si vous avez besoin d'une chirurgie de la cataracte, assurez-vous d'en informer votre ophtalmologiste que vous prenez ou avez pris ce médicament.**

• **Nombre dangereusement faible d'un certain type de globules blancs nécessaires pour lutter contre les infections dans votre sang.**

• **Prise excessive d'eau pouvant être dangereuse.**

• **Battement cardiaque irrégulier.**

• **Inflammation du pancréas, obstruction intestinale.**

• **Confitement de la langue, lèvres gercées, éruption cutanée liée au médicament.**

• **Pellicules.**

• **Cassure des fibres musculaires et douleurs musculaires (myopathie).**

• **Retard des règles, élargissement des glandes mammaires, élargissement des seins, écoulements mammaires.**

• **Augmentation de l'insuline (hormone qui contrôle le niveau de sucre sanguin) dans votre sang.**

• **Durcissement de la peau.**

• **Température corporelle diminuée, refroidissement des bras et des jambes.**

• **Symptômes de sevrage médicamenteux.**

• **Augmentation de la peau et des yeux (jaunisse).**

**Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) :**

6 118001 030347

○ **TEGRETOL® CR 400 mg**  
Comprimé  
pelliculé sécable  
PPV : 82.70 DH

ITION DE  
L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

## **TEGRETOL® CR 200 mg**

Boîte de 50 comprimés pelliculés  
sécables

## **TEGRETOL® CR 400 mg**

Boîte de 30 comprimés pelliculés  
sécables

DCI : Carbamazépine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **TEGRETOL® CR** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 3- Comment utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **TEGRETOL® CR** ?
- 6- Informations supplémentaires.

### **1- QU'EST-CE QUE TEGRETOL® CR ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Tégrétol est un médicament antiépileptique dont le principe actif est la carbamazépine. Il est utilisé sur prescription médicale pour traiter les adultes et les enfants souffrant de crises de convulsion (épilepsie). Il est aussi utilisé pour le traitement de certaines affections des nerfs comme p. ex. la névralgie du trijumeau ou certaines affections psychiques (manie, psychose maniaco-dépressive), ainsi que lors de troubles apparaissant pendant les cures de désintoxication alcoolique.

### **2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TEGRETOL® CR?**

**Contre-indications :**

Tégrétol ne doit pas être utilisé en cas de réactions d'hypersensibilité (allergie) à la carbamazépine ou à des substances apparentées, ou à l'oxcarbazépine (Trileptal), par ex. ou d'autres médicaments associés à des réactions d'hypersensibilité, comme des antidépresseurs tricycliques (p.ex. amitriptyline, imipramine). Tégrétol ne doit pas être utilisé non plus en cas de traitement de la dépression par certains médicaments appelés inhibiteurs de la mono-amine-oxydase.

En présence de certaines maladies, vous ne pouvez pas prendre Tégrétol qu'après une consultation médical approfondie. Il est important de consulter votre médecin si vous avez ou avez souffert de l'une des maladies suivantes:

- troubles cardiaques
- anémie
- glosite
- maladie de Cushing
- crises d'épilepsie
-

6 118001 030347

○ **TEGRETOL® CR 400 mg**  
Comprimé  
pelliculé sécable  
PPV : 82.70 DH

ITION DE  
L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

## **TEGRETOL® CR 200 mg**

Boîte de 50 comprimés pelliculés  
sécables

## **TEGRETOL® CR 400 mg**

Boîte de 30 comprimés pelliculés  
sécables

DCI : Carbamazépine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **TEGRETOL® CR** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 3- Comment utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **TEGRETOL® CR** ?
- 6- Informations supplémentaires.

### **1- QU'EST-CE QUE TEGRETOL® CR ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Tégrétol est un médicament antiépileptique dont le principe actif est la carbamazépine. Il est utilisé sur prescription médicale pour traiter les adultes et les enfants souffrant de crises de convulsion (épilepsie). Il est aussi utilisé pour le traitement de certaines affections des nerfs comme p. ex. la névralgie du trijumeau ou certaines affections psychiques (manie, psychose maniaco-dépressive), ainsi que lors de troubles apparaissant pendant les cures de désintoxication alcoolique.

### **2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TEGRETOL® CR?**

**Contre-indications :**

Tégrétol ne doit pas être utilisé en cas de réactions d'hypersensibilité (allergie) à la carbamazépine ou à des substances apparentées, ou à l'oxcarbazépine (Trileptal), par ex. ou d'autres médicaments associés à des réactions d'hypersensibilité, comme des antidépresseurs tricycliques (p.ex. amitriptyline, imipramine). Tégrétol ne doit pas être utilisé non plus en cas de traitement de la dépression par certains médicaments appelés inhibiteurs de la mono-amine-oxydase.

En présence de certaines maladies, vous ne pouvez pas prendre Tégrétol qu'après une consultation médical approfondie. Il est important de consulter votre médecin si vous avez ou avez souffert de l'une des maladies suivantes:

- troubles cardiaques
- anémie
- glosite
- maladie de Cushing
- crises d'épilepsie
-

6 118001 030347

○ **TEGRETOL® CR 400 mg**  
Comprimé  
pelliculé sécable  
PPV : 82.70 DH

ITION DE  
L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

## **TEGRETOL® CR 200 mg**

Boîte de 50 comprimés pelliculés  
sécables

## **TEGRETOL® CR 400 mg**

Boîte de 30 comprimés pelliculés  
sécables

DCI : Carbamazépine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **TEGRETOL® CR** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 3- Comment utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **TEGRETOL® CR** ?
- 6- Informations supplémentaires.

### **1- QU'EST-CE QUE TEGRETOL® CR ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Tégrétol est un médicament antiépileptique dont le principe actif est la carbamazépine. Il est utilisé sur prescription médicale pour traiter les adultes et les enfants souffrant de crises de convulsion (épilepsie). Il est aussi utilisé pour le traitement de certaines affections des nerfs comme p. ex. la névralgie du trijumeau ou certaines affections psychiques (manie, psychose maniaco-dépressive), ainsi que lors de troubles apparaissant pendant les cures de désintoxication alcoolique.

### **2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TEGRETOL® CR?**

**Contre-indications :**

Tégrétol ne doit pas être utilisé en cas de réactions d'hypersensibilité (allergie) à la carbamazépine ou à des substances apparentées, ou à l'oxcarbazépine (Trileptal), par ex. ou d'autres médicaments associés à des réactions d'hypersensibilité, comme des antidépresseurs tricycliques (p.ex. amitriptyline, imipramine). Tégrétol ne doit pas être utilisé non plus en cas de traitement de la dépression par certains médicaments appelés inhibiteurs de la mono-amine-oxydase.

En présence de certaines maladies, vous ne pouvez pas prendre Tégrétol qu'après une consultation médical approfondie. Il est important de consulter votre médecin si vous avez ou avez souffert de l'une des maladies suivantes:

- troubles cardiaques
- anémie
- glosite
- maladie de Cushing
- crises d'épilepsie
-

6 118001 030347

○ **TEGRETOL® CR 400 mg**  
Comprimé  
pelliculé sécable  
PPV : 82.70 DH

ITION DE  
L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

## **TEGRETOL® CR 200 mg**

Boîte de 50 comprimés pelliculés  
sécables

## **TEGRETOL® CR 400 mg**

Boîte de 30 comprimés pelliculés  
sécables

DCI : Carbamazépine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **TEGRETOL® CR** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 3- Comment utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **TEGRETOL® CR** ?
- 6- Informations supplémentaires.

### **1- QU'EST-CE QUE TEGRETOL® CR ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Tégrétol est un médicament antiépileptique dont le principe actif est la carbamazépine. Il est utilisé sur prescription médicale pour traiter les adultes et les enfants souffrant de crises de convulsion (épilepsie). Il est aussi utilisé pour le traitement de certaines affections des nerfs comme p. ex. la névralgie du trijumeau ou certaines affections psychiques (manie, psychose maniaco-dépressive), ainsi que lors de troubles apparaissant pendant les cures de désintoxication alcoolique.

### **2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TEGRETOL® CR?**

#### **Contre-indications :**

Tégrétol ne doit pas être utilisé en cas de réactions d'hypersensibilité (allergie) à la carbamazépine ou à des substances apparentées, ou à l'oxcarbazépine (Trileptal), par ex. ou d'autres médicaments associés à des réactions d'hypersensibilité, comme des antidépresseurs tricycliques (p.ex. amitriptyline, imipramine). Tégrétol ne doit pas être utilisé non plus en cas de traitement de la dépression par certains médicaments appelés inhibiteurs de la mono-amine-oxydase.

En présence de certaines maladies, vous ne pouvez pas prendre Tégrétol qu'après une consultation médical approfondie. Il est important de consulter votre médecin si vous avez ou avez souffert de l'une des maladies suivantes:

- troubles cardiaques
- anémie, glosite
- maladie de Crohn
- crises d'épilepsie

6 118001 030347

○ **TEGRETOL® CR 400 mg**  
Comprimé  
pelliculé sécable  
PPV : 82.70 DH

ITION DE  
L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

## **TEGRETOL® CR 200 mg**

Boîte de 50 comprimés pelliculés  
sécables

## **TEGRETOL® CR 400 mg**

Boîte de 30 comprimés pelliculés  
sécables

DCI : Carbamazépine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **TEGRETOL® CR** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 3- Comment utiliser **TEGRETOL® CR** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **TEGRETOL® CR** ?
- 6- Informations supplémentaires.

### **1- QU'EST-CE QUE TEGRETOL® CR ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Tégrétol est un médicament antiépileptique dont le principe actif est la carbamazépine. Il est utilisé sur prescription médicale pour traiter les adultes et les enfants souffrant de crises de convulsion (épilepsie). Il est aussi utilisé pour le traitement de certaines affections des nerfs comme p. ex. la névralgie du trijumeau ou certaines affections psychiques (manie, psychose maniaco-dépressive), ainsi que lors de troubles apparaissant pendant les cures de désintoxication alcoolique.

### **2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER TEGRETOL® CR?**

**Contre-indications :**

Tégrétol ne doit pas être utilisé en cas de réactions d'hypersensibilité (allergie) à la carbamazépine ou à des substances apparentées, ou à l'oxcarbazépine (Trileptal), par ex. ou d'autres médicaments associés à des réactions d'hypersensibilité, comme des antidépresseurs tricycliques (p.ex. amitriptyline, imipramine). Tégrétol ne doit pas être utilisé non plus en cas de traitement de la dépression par certains médicaments appelés inhibiteurs de la mono-amine-oxydase.

En présence de certaines maladies, vous ne pouvez pas prendre Tégrétol qu'après une consultation médical approfondie. Il est important de consulter votre médecin si vous avez ou avez souffert de l'une des maladies suivantes:

- troubles cardiaques
- anémie
- glosite
- maladie de Cushing
- crises d'épilepsie
-