

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0005017

177942

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 569 Société : RAT

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : LACHGUAR Housseme

Date de naissance : 01-01-1945

Adresse : Resid. Hindouss Ghia IM2 APPG DULIA CRA

Tél. : 0522 89 82 97 Total des frais engagés : 631,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Miloud KASSIOUI  
CABINET DE CARDIOLOGIE  
52, Bd Mec VI Kissariaate Tissir  
2ème Etage - CASABLANCA  
Tel: 0522450240/41 Fax: 0522450239

Cachet du médecin : 01/10/2023

Date de consultation : 01/10/2023

Nom et prénom du malade : Benjatia Saadia Age:

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Cardiopax


Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 01/10/2023

Signature de l'adhérent(e) : 

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
du 10/03/2003	Consultation		300.00	<i>DR. MOHAMED KASSIOUI DENTISTE DE CARDIOLOGIE Télé: 0522450240/41 Fax: 0522450239 1er Etage Le Tissarate Tissi Casablanca</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE OMEKA 19. Boulevard EL OULEFA CASABLANCA</i>	10/03/2003	331.00

### ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553	G	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction)	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# CABINET DE CARDIOLOGIE



Dr. Miloud KASSIOUI  
Cardiologue

Diplômé de la Faculté de Médecine d'Angers (France)  
Ancien attaché des Hôpitaux de la Loire  
Ex. Médecin Cardiologue à l'Hôpital Sidi Soufi Casablanca

4/10/02

Casablanca, le .....

Rev FATH Saadia

Sp / Rx Kardegi 75 e 1 =

1401 - Oedel 20

q9.00

14 k m

PHARMACIE OUIMERRAB

Dr. Miloud KASSIOUI

EL OULFA - CASABLANCA

49 Boulevard OUIMERRAB  
Dr. Miloud KASSIOUI  
Kissariate Tissir  
Tél. 0522 45 02 40 / 41 - Fax: 0522 45 02 39

Dr. Miloud KASSIOUI  
CABINET DE CARDIOLOGIE  
52, Bd Mohammed VI - Kissariate Tissir  
2ème Etage - CASABLANCA  
Tél: 0522 45 02 40 / 41 - Fax: 0522 45 02 39

# KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine  
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la lire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament a été prescrit personnellement à vous. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable, qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

ANTI-THROMBOGÈNE/INHIBITEUR DE L'AGGRÉGATION PLAQUETTAIRE, HÉPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose appartient à la famille des inhibiteurs de l'aggrégation plaquettaire.

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

### Indications thérapeutiques :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire. Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose sans l'accord de votre médecin.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

### No prenez jamais KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

• si vous êtes allergique à la substance active (l'acétylsalicylate de DL-lysine) ou à l'un des autres composants contenues dans KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, mentionnés dans la rubrique 6.

• si vous êtes allergique (hypersensibilisé) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS).

• si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour.

• si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),

• si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum,

• si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

• si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,

• si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,

• si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

### Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

• si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,

• si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),

• si vous avez déjà eu des saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),

• si vous avez une maladie des reins ou du foie,

• si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),

• si vous avez des réactions allergiques.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

ne doit pas être administré aux enfants de moins de 16 ans.

Pendant le traitement, il peut survenir :

• faible poids corporel,

• d'association à l'insuffisance rénale,

• pourriez avoir des saignements.

Si une intérêt clinique apparaît, il faut arrêter le médicament.

L'aspirine peut entraîner des effets indésirables.

Enfants et adolescents

Voir paragraphe ci-dessous.

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Autres médicaments et KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine. Autres médicaments en contiennent. Vous ne devez pas prendre en même temps que KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les AINS comme, par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

La combinaison de l'aspirine et KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements.

Il est également les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en même temps que :

• un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'hémorragie de l'estomac ou duodénum,

• un autre médicament à base de ticlidipine ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang) sauf dans certaines situations où votre médecin pourra vous prescrire conjointement de l'aspirine et de clopidogrel,

• un autre médicament à base de benz bromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

• un autre médicament à base d'anagrelide (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),

• le ticagrelor en dehors des indications validées,

• un autre médicament à base de diltérybute (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),

• nicosandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine).

Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :

• méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/ semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers),

• topiques gastro-intestinaux, antiacides et absorbants (médicament utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs),

• anticoagulant oral, thrombolytiques ou héparines (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

• anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicament utilisé dans le traitement de la douleur et de la fièvre),

• ticagrelor (dans les indications validées),

• cabémetinib,

• ibuprofène,

• un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux),

• médicaments mixtes adrénergiques-sérotoninergiques.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments, boissons et alcool.

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté au niveau gastro-intestinal.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Grossesse :** Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN autre médicament contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

**Jusqu'à 100 mg par jour :** Pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin

surveille. Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

même lorsque la prise de ce

medicament est terminée.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

Le risque pour les personnes de 16 ans et plus de KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en cas de grossesse.

# KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine  
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la lire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament a été prescrit personnellement à vous. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable, qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

ANTI-THROMBOGÈNE/INHIBITEUR DE L'AGRÉGATION PLAQUETTAIRE, HÉPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquetttaire.

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

### Indications thérapeutiques :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire. Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose sans l'accord de votre médecin.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

### No prenez jamais KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- si vous êtes allergique à la substance active (l'acétylsalicylate de DL-lysine) ou à l'un des autres composants contenues dans KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique (hypersensibilisé) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS).
- si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour.
- si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),
- si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum,
- si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).
- si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
- si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

### Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),

• si vous avez déjà eu des saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),

• si vous avez une maladie des reins ou du foie,

• si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),

• si vous avez des réactions allergiques.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

ne doit pas être administré aux enfants de moins de 16 ans.

Pendant le traitement, il peut survenir :

• faible poids corporel,

• association à une maladie héréditaire des globules rouges,

• survenue de l'ulcère de l'estomac ou duodénum.

**Si une intérêt clinique est suspecté :**

L'aspirine peut entraîner des effets indésirables.

• si vous êtes une personne âgée, une femme enceinte ou une personne ayant des maladies chroniques, l'aspirine peut entraîner des effets indésirables.

• si vous prenez d'autres médicaments.

# KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine  
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la lire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament a été prescrit personnellement à vous. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable, qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

ANTI-THROMBOGÈNE/INHIBITEUR DE L'AGRÉGATION PLAQUETTAIRE, HÉPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquetttaire.

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

### Indications thérapeutiques :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire. Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose sans l'accord de votre médecin.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

### No prenez jamais KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- si vous êtes allergique à la substance active (l'acétylsalicylate de DL-lysine) ou à l'un des autres composants contenues dans KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique (hypersensibilisé) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS).
- si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour.
- si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),
- si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum,
- si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).
- si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
- si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

### Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),

• si vous avez déjà eu des saignements digestifs ( vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),

• si vous avez une maladie des reins ou du foie,

• si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),

• si vous avez des réactions allergiques.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

ne doit pas être administré aux enfants de moins de 16 ans.

Pendant le traitement, il peut survenir :

• faible poids corporel,

• association à une maladie héréditaire des globules rouges,

• survenue de l'ulcère de l'estomac ou duodénum.

**Si une intérêt clinique est suspecté :**

L'aspirine peut entraîner des effets indésirables.

• si vous êtes une personne âgée, une femme enceinte ou une personne ayant des maladies chroniques, l'aspirine peut entraîner des effets indésirables.

• si vous prenez d'autres médicaments.



PPV (DH) :

LOT N° :

UT.AV. :


LOT: 211543  
PER: 05-2024  
PPV: 140,00 DH

Bou FATAJ Saadi

le 4/10/04



Clinical



25 mm/s 10 mm/mV  $\sim$  0.5 Hz - 40 Hz W 07783