

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 3531

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ZAKARYA CHAIBIA

Date de naissance :

1950

Adresse :

CASABLANCA

Tél. : 0661.635867

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 26/08/2023

Nom et prénom du malade : El Jalela Saphia Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Examen pré-natal

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RECEIPE DES HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/08/23	C	-	200000	Dr. AMR Spécialiste Gynécologie et Bio-EL Pica 0522647755

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	26/08/23	509,95

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Amrani Imane

Spécialiste

Gynécologie - Obstétrique

Stérilité - Maladies du Sein

Chirurgie Gynécologique

Colposcopie - Echographie

Endoscopie Echographique

Ancienne Interne des Hôpitaux de Strasbourg



الدكتورة عمرانى إيمان

الخصائص

أمراض النساء والولادة

العنوان: أمراض الثدي - الحراجة النسوية

الفحص بالمجهر - التشخيص الصوتي

طيبة ساقا بالمستشفى الجامعي يستر اسيورغ (فرنسا)

~~£26.11 28/9.3~~

gew

El Jelob Salim

96.4°

Fluorinizer

49 80
1
2)

Igualpinti
Flagrant P. C. S.
SV

2 g / j p t , 6 c e r , 1 d l 10 p m -


18-

655 . شارع الفداء - الطابق الأول - الدار البيضاء - الهاتف : 27 21 85 22 05 / 27 21 85 22 05

655, Bd. El Fida -1^{er} étage - CASABLANCA - Tél : 05 22 85 27 27 05 22 85 21 27



3) thyroïde figure 088
thyroïde figure 088



4) Diffusion de la maladie 18



T = 50g

Dr. AMRANI Imane
Spécialiste
Gynécologie - Obstétrique
655, Bd. El Fida - Casablanca
Tél.: 0522 85 27 27
INP: 091166124



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Diflucan 50 mg gélules
Diflucan 150 mg gélules
fluconazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Qu'est-ce que cette notice ? :

1. Que c'est quoi Diflucan et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Diflucan
3. Comment prendre Diflucan
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Diflucan
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Diflucan et dans quel cas est-il utilisé ?

Diflucan fait partie d'un groupe de médicaments appelés "antifongiques". La substance active est le fluconazole. Diflucan est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de contracter une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appellée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Ménigrité à cryptococcies - infection fongique de la gorge
- Coccidioidomycose - une maladie du système bronchopulmonaire
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, des organes (p.ex. cœur, poumons) ou les voies urinaires.
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plages dues à une protéose dentaire
- Mycose génitale - infection du vagin ou du pénis
- Infections cutanées - p.ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczème marginé de Hebra, infection des ongles

Vous pourrez aussi recevoir du Diflucan pour :

- Éviter la récidive d'une ménigrité à cryptococcies
- éviter la récidive d'une infection de la gorge
- diminuer le risque de récidive d'une mycose vaginale

éviter de contracter une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge
- Infection à Candida, retrouvées dans le sang, des organes (p.ex. cœur, poumons) ou les voies urinaires.
- Ménigrité à cryptococcies - infection fongique du cerveau

Vous pourrez aussi recevoir du Diflucan pour :

- empêcher de contracter une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)
- éviter la récidive d'une ménigrité à cryptococcies

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Diflucan ?

Ne prenez jamais Diflucan :

- si vous êtes allergique au fluconazole, aux autres médicaments que vous avez pris pour traiter des infections fongiques ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Les symptômes peuvent être de type démangeaisons, rougeur de la peau ou difficultés à respirer.
- si vous prenez de l'astémizole, de la terfenadine (antimédicamenteux antihistaminiques utilisés pour traiter les allergies).
- si vous prenez du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac).
- si vous prenez du pimozide (utilisé pour traiter des troubles mentaux).
- si vous prenez de la quinidinale (utilisée pour traiter les troubles du rythme cardiaque).
- si vous prenez de l'erythromycine (antibiotique pour traiter les infections).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Diflucan :

- si vous avez des problèmes de foie ou de rein;
- si vous souffrez d'une maladie du cœur, y compris des troubles du rythme cardiaque,
- si vous avez des taux anormaux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang,
- si vous développez des réactions cutanées graves (démangeaisons, rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer),
- si vous développez des signes d'insuffisance surrenaliennes, un trouble dans lequel les glandes surrenales produisent des quantités insuffisantes de certaines hormones stéroïdiennes comme le cortisol (fatigue chronique ou prolongée, faiblesse musculaire, perte d'appétit, perte de poids, douleurs abdominales).

Autres médicaments et Diflucan

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez de l'astémizole, de la terfenadine (un antihistaminique pour traiter les allergies) ou du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac); ou du pimozide (utilisé pour traiter les troubles mentaux) ou de la quinidinale (utilisé pour traiter les arythmies cardiaques) ou de l'erythromycine (un antibiotique pour traiter les infections) car ces produits ne doivent pas être pris avec Diflucan (voir la rubrique 4). **Ne prenez jamais**

Pour traiter une infection fongique de la peau et des ongles

Selon le site de l'infection, 50 mg une fois par jour, 150 mg une fois par semaine, 300 mg à 400 mg une fois par semaine pendant 1 à 4 semaines (ou jusqu'à 6 semaines pour le pied d'athlète); pour le traitement des infections des ongles, traitement jusqu'au remplacement de l'ongle infecté)

Pour éviter de contracter une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)

Utilisation chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans
Respectez la posologie indiquée par votre médecin (soit la posologie de l'adulte soit la posologie de l'enfant).

Utilisation chez les enfants jusqu'à 11 ans

La posologie maximale chez l'enfant est de 400 mg par jour.

La posologie sera basée sur le poids de l'enfant en kilogrammes.

Affection

Myosite ou muqueuse et infections de la gorge dues à Candida — la dose et la durée dépendent de la sévérité de l'infection et de sa localisation.

Ménigrité à cryptococcies ou infections fongiques internes dues à Candida

Pour éviter la récidive d'une ménigrité à cryptococcies

Pour empêcher les enfants de contracter une infection à Candida (si leur système immunitaire ne fonctionne pas correctement)

Dose quotidienne

3 mg par kg de poids corporel une fois par jour (une dose de 6 mg par kg de poids corporel peut être utilisée le premier jour)

Utilisation chez les enfants âgés de 0 à 4 semaines

Enfants âgés de 3 à 4 mois :

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 2 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.

Enfants âgés de moins de 2 semaines :

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 3 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 72 heures.

Patients âgés

La dose usuelle adulte devrait être administrée sauf si vous souffrez de problèmes rénaux.

Patients avec des problèmes rénaux

Votre médecin pourra modifier votre dose en fonction de l'état de votre fonction rénale.

Si vous avez pris plus de Diflucan que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de gélules en une fois, vous pourrez vous sentir mal. Contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence de l'hôpital le plus proche. Les symptômes d'un éventuel surdosage peuvent être d'endormir, de voir de ressenti ou de paniquer des choses qui ne sont pas réelles (hallucinations et comportement paranoid). Une prise en charge (avec un traitement symptomatique et un lavage d'estomac, si nécessaire) peut être nécessaire.

Si vous avez pris trop de Diflucan, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoisons ou de Pharmacovigilance.

Si vous oubliez de prendre Diflucan

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rappelez. S'il est presque l'heure de votre dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, posez-les à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer systématiquement chez tout le monde.

Quelques personnes développent des réactions allergiques résistantes un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin si vous avez un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans ce chapitre. Informez immédiatement votre médecin.

- sufflement respiratoire soudain, difficultés à respirer ou

- gonflement des paupières, du visage ou des lèvres

- rougeur de la peau avec démangeaisons sur tout le corps

- réactions cutanées sévères telles qu'une éruption entraînant la langue).

Diflucan peut affecter votre foie. Les signes de problèmes hépatiques

- la fatigue

- une perte d'appétit

- des vomissements

- un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunissement)

Si l'un de ces signes survient, arrêtez de prendre Diflucan et

FLAGYL® 500 mg

Métronidazole

Comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques antibactériens anti-parasitaires de la famille des nitro-5-imidazolés - code ATC : J01XD01 – P01AB01

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections à germes sensibles (bactéries, parasites).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ?

N'utilisez jamais FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au métronidazole, à un médicament de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le métronidazole) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ; • si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten), • si le patient est un enfant âgé de moins de 6 ans (voir Avertissements et précautions).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé.

Mises en garde et précautions d'emploi

Avant d'utiliser FLAGYL, prévenez votre médecin si vous présentez :

- des troubles neurologiques, • des troubles psychiatriques, • des troubles sanguins, • des antécédents de ménigrites sous métronidazole.

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par FLAGYL :

Dès la première dose, il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et soudaine (choe anaphylactique, œdème de Quincke), se manifestant par les symptômes suivants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évanouissements, ou vertiges lors du passage en position debout (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?). Si ces symptômes surviennent, arrêtez d'utiliser ce médicament car votre vie pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.

La survenue, en début de traitement, d'une rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules, et accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose exanthématoïque aiguë généralisée (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?) ; prévenez votre médecin immédiatement car cela impose l'arrêt du traitement ; cette réaction va contre-indiquer toute nouvelle administration de métronidazole seul ou associé dans un même médicament à une autre substance active.

Il faut surveiller l'apparition potentielle ou l'aggravation de troubles nerveux comme une difficulté à coordonner des mouvements, un état de confusion, des convulsions, et une difficulté pour parler, pour marcher, des tremblements, des mouvements involontaires des yeux, ainsi que d'autres manifestations au niveau des mains et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, diminution de la sensibilité du toucher. Ces troubles sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement. Il est alors important d'interrompre le traitement et de consulter immédiatement votre médecin. (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?)

Des troubles du comportement à risque pour le patient peuvent survenir dès les premières prises du traitement, notamment en cas de trouble psychiatriques (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?).

FLAGYL 500 mg
CP.PEL.B20

LOT : 10/2027
PER : 10/2027

P.P.V : 49DH80



6 118000 060062

ment à forte dose et/ou de contrôler régulièrement par le.

us prenez ce médicament si ce de ce médicament peut (recherche de tréponèmes)

que aiguë, compris des cas d'auant une issue fatale, chez des patients atteints du syndrome de Cockayne ont été rapportés avec des produits contenant du métronidazole.

Si vous êtes atteint(e) du syndrome de Cockayne, votre médecin doit également surveiller votre fonction hépatique fréquemment pendant votre traitement par métronidazole et après le traitement.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre le métronidazole si vous présentez les symptômes suivants :

• maux de ventre, anorexie, nausées, vomissements, fièvre, malaise, fatigue, jaunisse, urines foncées, sels de couleur mastic ou démagéaneos.

Enfants

La prise de comprimé est contre-indiquée chez les enfants âgés de moins de 6 ans car il peut avaler le comprimé de travers et s'étouffer. Il existe d'autres présentations pharmaceutiques avec cet antibiotique adaptées au jeune enfant.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLAGYL 500 mg.

Autres médicaments et FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Prévenez en particulier votre médecin si vous prenez :

- des médicaments contenant de l'alcool en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque,
- du busulfan (préconisé dans le traitement de certaines maladies du sang et dans la préparation à la greffe de moelle),
- du disulfiram (utilisé dans la prévention des rechutes au cours de l'alcool-dépendance).

FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Evitez la prise de boissons alcoolisées durant ce traitement en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il convient d'éviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée notamment sur les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges, confusion, hallucinations, convulsions ou troubles de la vision attachés à l'emploi de ce médicament.

FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé contient du gluten.

Ce médicament contient une très faible teneur en gluten (provenant de l'amidon de blé) et est donc peu susceptible d'entraîner des problèmes en cas d'une maladie coeliaque.

Un comprimé ne contient pas plus de 16,43 microgrammes de gluten.

Si vous avez une allergie au blé (différente de la maladie coeliaque), vous ne devez pas prendre ce médicament (voir rubrique * N'utilisez jamais FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé »).

3. COMMENT PRENDRE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ?

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.

La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique.

À titre indicatif, la posologie usuelle est :

avant qu'une inflammation
ment même si vous ne ressentez rien.
La prise de plus d'un comprimé par jour
les effets secondaires peuvent être plus importants.
Ne changez pas de votre propre compte la posologie. Si l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte,
adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fluomizin peut-il provoquer?

La prise ou l'utilisation de Fluomizin peut provoquer les effets secondaires suivants:

Les infections vaginales provoquent généralement des troubles tels que le prurit, les sensations de brûlures et l'écoulement. Ces troubles désagréables disparaissent la plupart du temps pendant le traitement. Dans de rares cas, les troubles d'irritation locale comme le prurit, la sensation de brûlure ou les rougeurs peuvent s'amplifier au début du traitement. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le traitement. Si vous ressentez des troubles ou douleurs plus importantes, consultez votre médecin. Des cas très rares de saignements d'ulcérations vaginales ont été rapportés lorsque la surface vaginale est déjà lésée, par ex. à la suite d'un manque d'oestrogènes ou d'une inflammation assez prononcée. On a observé des cas très rares d'apparition de fièvre. Dans ces cas, il faut interrompre le traitement par Fluomizin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demander le dépliant de la notice pour une liste

A quoi faut-il encore faire attention?

On ne dispose d'aucune étude sur la tolérance de la préparation avec les préservatifs, les diaphragmes ou autres moyens de contraception. Pendant le traitement par le Fluomizin, il est préférable de renoncer aux rapports sexuels. Fluomizin n'est pas compatible avec les savons ou autres substances actives d'agents de surface anioniques. Fluomizin ne peut pas être employé pour d'autres parties du corps.

Date-limite d'utilisation

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la date limite de validité.

Conservation

Conserver Fluomizin dans l'emballage original à une température inférieure à 25°C, hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Distribué par: ZENITHPHARMA
96, Zone Industrielle Bassila Inezgane
Agadir-Maroc
Dr. M. EL BOUHMI, Pharmacien Responsable
AMM N°: 24/18DMP/21/NRQ
P.P.V.: 96.40 BHS

avant qu'une inflammation
ment même si vous ne ressentez rien.
La prise de plus d'un comprimé par jour
les effets secondaires peuvent être plus importants.
Ne changez pas de votre propre traitement sans consulter un professionnel de la santé.
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du Fluomizin est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fluomizin peut-il provoquer?

La prise ou l'utilisation de Fluomizin peut provoquer les effets secondaires suivants:

Les infections vaginales provoquent généralement des troubles tels que le prurit, les sensations de brûlures et l'écoulement. Ces troubles désagréables disparaissent la plupart du temps pendant le traitement. Dans de rares cas, les troubles d'irritation locale comme le prurit, la sensation de brûlure ou les rougeurs peuvent s'amplifier au début du traitement. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le traitement. Si vous ressentez des troubles ou douleurs plus importantes, consultez votre médecin. Des cas très rares de saignements d'ulcérations vaginales ont été rapportés lorsque la surface vaginale est déjà lésée, par ex. à la suite d'un manque d'oestrogènes ou d'une inflammation assez prononcée. On a observé des cas très rares d'apparition de fièvre. Dans ces cas, il faut interrompre le traitement par Fluomizin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demander le dépliant de la sécurité pour une liste complète.

A quoi faut-il encore faire attention?

On ne dispose d'aucune étude sur la tolérance de la préparation avec les préservatifs, les diaphragmes ou autres moyens de contraception. Pendant le traitement par le Fluomizin, il est préférable de renoncer aux rapports sexuels. Fluomizin n'est pas compatible avec les savons ou autres substances actives d'agents de surface anioniques. Fluomizin ne peut pas être employé pour d'autres parties du corps.

Date-limite d'utilisation

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la date limite.

Conservation

Conserver Fluomizin dans l'emballage original à une température inférieure à 25°C, hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Distribué par: ZENITHPHARMA
96, Zone Industrielle Bassila Inezgane
Agadir-Maroc
Dr. M. EL BOUHMI, Pharmacien Responsable
AMM N°: 24/18DMP/21/NRQ
P.P.V.: 96.40 DHS