

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-813591

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

482

Société :

136883

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

AMRI RAHAL 1961

Date de naissance :

Adresse : Selmi 2 Rue 32 IMM 28 N° 07


Tél. :

Total des frais engagés : 285,30 Dhs

Autorisation UNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/09/2015	Acte 65	Coef G	1000000	INPEI 091033498

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Salmia Casablanca 226, Boulevard Al Joutour Salmia - Casablanca Tel.: 05 22 38 01 47 ICE: 002115854000092 IN.P.E.: 092004506	25/09/23	285,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>											
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>											
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>											
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>											
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>											
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H <table border="1"> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> B				25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
25533412	21433552														
00000000	00000000														
D	G														
00000000	00000000														
35533411	11433553														
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>										
					DATE DU DEVIS <input type="text"/>										
					DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

ORDONNANCE

Docteur Ahmed BTIDANI
CARDIOLOGUE
Bd. El Oued 11/154, Jemila 5, Casablanca
Tél: 0524 22 38 01 47 - Fax: 0524 22 38 01 47 05
ICE : 00211585400092
I.N.P.E : 092004506

Casa, Le: 25-9-2023

Mr AMR

R 11/11

1/ ANGLOLOR 5mg (3)

4's

$31,00 \times 3 = 93,00$

1 - 0 - 0 ✓

4's

$31,30 \times 3 = 93,90$

4 ZYLOLORIC 200mg (3)

days

4's

3/ GLUCOPHAGE 500mg (3)

1

$20,80 \times 3 = 62,40$

X ob

PHARMACIE AÏLA CASABLANCA
Mme EL AÏLA GUENNOU INTISSAM
225, Boulevard Al Joutan
Casablanca 2 - Casablanca

Tél: 05 22 38 01 47
ICE : 00211585400092
I.N.P.E : 092004506

Docteur Ahmed BTIDANI
CARDIOLOGUE

Bd. El Oued 11/154, Jemila 5, Casablanca
Tél: 0524 22 38 01 47 - Fax: 0524 22 38 01 47 05
ICE : 00211585400092
I.N.P.E : 092004506

285,30

A

143,00

PPV 33489
PER 37725
EAN 32022



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 6,935

Quantité correspondant à amlodipine.....

5

ANGLOR® 10 mg

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 13,87

Quantité correspondant à amlodipine.....

1

- Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs et de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe des inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension) et de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal. Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament dilate les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus de sang et qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat de la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications du pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour et peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® sont actuellement pas disponibles.

- Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Prenez ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne le prenez pas avec du jus de pamplemousse.

- Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre pharmacien si vous avez des difficultés à prendre votre médicament.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amiodipine ou à l'un des autres composants de ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des éruptions cutanées, des rougeurs ou des difficultés respiratoires.
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'ensemble de l'organisme.
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables. Cependant, ces effets indésirables ne sont pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants ou si vous avez d'autres difficultés avec ce médicament.



A

143,00

PPV 33489
PER 37725
EAN 32022



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 6,935

Quantité correspondant à amlodipine.....

5

ANGLOR® 10 mg

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 13,87

Quantité correspondant à amlodipine.....

1

- Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs et de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe des inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension) et de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal. Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament améliore la circulation dans les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus de sang et qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat de la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications du pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour et peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® sont actuellement pas disponibles.

- Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Prenez ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne le prenez pas avec du jus de pamplemousse.

- Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre pharmacien si vous avez des difficultés à prendre votre médicament.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amiodipine ou à l'un des autres composants de ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des difficultés respiratoires.
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'ensemble de l'organisme.
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables. Cependant, ces effets indésirables ne sont pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants ou si vous avez d'autres difficultés avec ce médicament.



A

143,00

PPV 33489

PER 37725

PPV 33489



Veuillez lire attentivement l'intégral

- avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise ;
Amlodipine Besilate 6,935

Quantité correspondant à amlodipine.....

5

ANGLOR® 10 mg

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise ;
Amlodipine Besilate 13,87

Quantité correspondant à amlodipine.....

1

- Composition qualitative en excipients ;

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs et de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe des inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension) et de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal. Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament dilate les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus de sang et qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat à la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications du pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour et peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® sont actuellement pas disponibles.

- Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boisson. Prenez ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne buvez pas avec du jus de pamplemousse.

- Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre pharmacien si vous avez des difficultés à prendre votre médicament.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amiodipine ou à l'un des autres composants de ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des difficultés respiratoires.
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'ensemble de l'organisme.
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables. Cependant, ces effets indésirables ne sont pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants ou si vous avez d'autres difficultés avec ce médicament.



من مخلف من مخلف من مخلف

لين

الدواء.

طلب المزيد من المعلومات من الطبيب
لـ سواك، حتى ولو كانت لديه نفس

٢٥٠,٨٥

وتصف

الأعراض
إذا تفاقم أمراض المريض غير المرغوب أو إذا لاحظت شيئاً غير مرغوب لم يرد ذكره في مقدمة النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوى هذه النشرة

- 1- ما هو كليكوفاج ، قرص مخلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 6- محتوى العلبة و معلومات إضافية.

١- ما هو كليكوفاج ، قرص مخلف وما هي حالات استعماله؟

A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:
يحتوي كليكوفاج على منقوصين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ "غافانيد".

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكري) المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزن له لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرًا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوفاج على تخفيف معدل الغلوكوز في سكر حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوفاج على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشارك كليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو يفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟

يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع ٢ (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتغذية البدني ودهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستطيع المرضى البالغون تناول كليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للتبغ أو إنسولين). يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول كليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

٢- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟

مواضع الاستعمال:
لا تتناول أبداً كليكوفاج في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من الأرجحية (الحساسية المفرطة) تجاه المقوسيين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

• إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.

• إذا كنت تعاني من سكري غير متوقف به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورة صارمة، غثيان، تقيؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حماض لبني (أنظر "خطر حماض لبني" أسلفه) أو حماض كيتوني، الحماض الكيتوني إصابة تكهن في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسيبات سكري أولى. الأعراض هي تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في التبول، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

• إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (اجتلاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الاجتلاف إلى مشاكل كلوية من شأنها أن تعرشك لخطر الحماض البدني (أنظر "تحذيرات واحتياطات").

• إذا كنت تعاني من إلتهاب حاد، مثلاً إلتهاب الرئتين أو القصبات، أو إلتهاب الكلينين. قد يؤدي الاصيابات الحادة إلى مشاكل في الكلينين من شأنها تعريشك لخطر الحماض البدني (أنظر "انتبه مع كليكوفاج" أدناه).

• إذا كنت تتناول علاجاً ضد القصور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرشك لخطر الحماض البدني (أنظر "تحذيرات واحتياطات").

من مخلف من مخلف من مخلف

لين

الدواء.

طلب المزيد من المعلومات من الطبيب
لـ سواك، حتى ولو كانت لديه نفس

٢٥٠,٨٥

الأعراض إذا تفاقم أمراضه غير المرغوب أو إذا لاحظ شيئاً غير مرغوب لم يرد ذكره في مقدمة النشرة، عليك إما طبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوى هذه النشرة

- 1- ما هو كليكوفاج ، قرص مخلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 6- محتوى العلبة و معلومات إضافية.

١- ما هو كليكوفاج ، قرص مخلف وما هي حالات استعماله؟

A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:
يحتوي كليكوفاج على منقوصين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ يغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكري) المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزن له لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرًا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوفاج على تخفيف معدل الغلوكوز في سكر حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوفاج على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشارك كليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو يفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟

يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع ٢ (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والترينين البدني ودهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستطيع المرضى البالغون تناول كليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للتبغ أو إنسولين). يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول كليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

٢- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟

موانع الاستعمال:
لا تتناول أبداً كليكوفاج في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من الأرجحية (الحساسية المفرطة) تجاه المقوصين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

• إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.

السكري في الدم بصورة صارمة، غثيان، تقيؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حموضة لبني (أنظر "خطر حموضة لبني" أسلفه) أو حموضة كيتوني. الحموضة الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسيبات سكري أولى. الأعراض هي تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في التبول، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

• إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (اجتلاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الاجتلاف إلى مشاكل كلوية من شأنها أن تعرشك لخطر الحموضة اللبني (أنظر "تحذيرات واحتياطات").

• إذا كنت تعاني من إلتهاب حاد، مثلاً إلتهاب الرئتين أو القصبات، أو إلتهاب الكلينين. قد تؤدي الاصيابات الحادة إلى مشاكل في الكلينين من شأنها تعرشك لخطر الحموضة اللبني (أنظر "انتبه مع كليكوفاج" أدناه).

• إذا كنت تتناول علاجاً ضد القصور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرشك لخطر الحموضة اللبني (أنظر "تحذيرات واحتياطات").

من مخلف من مخلف من مخلف

لين

الدواء.

طلب المزيد من المعلومات من الطبيب
لـ سواك، حتى ولو كانت لديه نفس

٢٥٠,٨٥

وتصف

الأعراض
إذا تفاقم أمراض المريض غير المرغوب أو إذا لاحظت شيئاً غير مرغوب لم يرد ذكره في مقدمة النشرة، عليك إما طبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوى هذه النشرة

- 1- ما هو كليكوفاج ، قرص مخلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مخلف؟
- 6- محتوى العلبة و معلومات إضافية.

١- ما هو كليكوفاج ، قرص مخلف وما هي حالات استعماله؟

A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:
يحتوي كليكوفاج على منقوصين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ "غافانيد".

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكري) المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزن له لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرًا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوفاج على تخفيف معدل الغلوكوز في سكر حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوفاج على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشارك كليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو يفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟

يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع ٢ (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتغذية البدني ودهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستطيع المرضى البالغون تناول كليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للتبغ أو إنسولين). يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول كليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

٢- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مخلف؟

مواضع الاستعمال:

لا تتناول أبداً كليكوفاج في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من الأرجحية (الحساسية المفرطة) تجاه المقوسيين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

• إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.

• إذا كنت تعاني من سكري غير متوقف به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورة صارمة، غثيان، تقيؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حماض لبني (أنظر "خطر حماض لبني" أسلفه) أو حماض كيتوني، الحماض الكيتوني إصابة تكهن في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسيبات سكري أولى. الأعراض هي تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في التبول، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

• إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (اجتلاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الاجتلاف إلى مشاكل كلوية من شأنها أن تعرشك لخطر الحماض البدني (أنظر "تحذيرات واحتياطات").

• إذا كنت تعاني من إلتهاب حاد، مثلاً إلتهاب الرئتين أو القصبات، أو إلتهاب الكلينين. قد تؤدي الاصيابات الحادة إلى مشاكل في الكلينين من شأنها تعرشك لخطر الحماض البدني (أنظر "انتبه مع كليكوفاج" أدناه).

• إذا كنت تتناول علاجاً ضد القصور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرشك لخطر الحماض البدني (أنظر "تحذيرات واحتياطات").

LOT 223845
EXP 11 2026
PPV 31.30



ou

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Ce médicament agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies des reins.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de l'enfant).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle.
- Prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnité Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves et graves, tels que une rougeur et une érythème (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut être une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et contactez votre médecin.

LOT 223845
EXP 11 2026
PPV 31.30



ou

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Ce médicament agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies des reins.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de l'enfant).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle.
- Prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves et graves, tels que une rougeur et des gonflements de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut être une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et contactez votre médecin.

LOT 223845
EXP 11 2026
PPV 31.30



ou

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Ce médicament agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies des reins.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de l'enfant).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle.
- Prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves et graves, tels que une rougeur et des gonflements de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut être une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et contactez votre médecin.