

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-819676

Jay
Iouri

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2136

Société : FA M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : CHENTOUF - ABDELGHANI

Date de naissance : 18/11

Adresse : TANGIER

Tél. : 06 28 29 54

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Abdelghani ZEKHNINI
Cardiologue
27, Bd.Mohammed V-Tanger
NIP: 161-141-184

Date de consultation : 2/3/2023

Nom et prénom du malade : CHENTOUF - Abdelghani

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

101

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TANGIER

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 20/09/2023

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie

N° W21-819676

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 20/01/23 | 69 E69 | . | 300 Dhs - | INP Dr. Abdelghani ZEKHNINI Cardiologue 27 Bd.Mohammed V -Tanger INP 131-141-189 |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|--|----------|-----------------------|
| pharmacie TAJ EDDINE Rue Echabid Benlaachen n° 56B Hay Beausset - TANGER T +212 53 93 15 77 T +212 53 93 12 628 | 20.09.23 | ₾ = 1271.70 |

INPE: 162102628

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Particulier | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|---------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | INP : [] |
|---|---|--|-------------|-----------------------------------|
| | | | | CŒFFICIENT DES TRAVAUX [] |
| | | | | MONTANTS DES SOINS [] |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION [] |
| | | | | FIN D'EXECUTION [] |
| O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES | DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE | | | CŒFFICIENT DES TRAVAUX [] |
| | H 25533412 00000000 D 00000000 35533411 | G 21433552 00000000 B 00000000 11433553 | | MONTANTS DES SOINS [] |
| | [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession | | | DATE DU DEVIS [] |
| | | | | DATE DE L'EXECUTION [] |
| VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS | | | | |
| VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION | | | | |

Docteur Abdelghani ZEKHNINI

CARDIOLOGUE-RYTHMOLOGUE
Spécialiste des maladies du cœur et des
vaisseaux

Diplomé de la faculté de médecine de Bruxelles
(UCL)

TANGER, le : 20/09/2023
Ordonnance

M. CHENTOUF abdelhak

165,50 x 3

ATACAND 16 mg : 1/2 comp. par jour le matin



126,10 x 3

COSOPT Collyre 20/5 mg, Collyre en solution 2gtnes /j

87-80 x 3

NEBILET 5 mg : 1/2 comp. par jour le matin



22,40 x 6

ASKARDIL 75 mg : 1 comp. par jour à midi

Traitements 6 mois

TL: 1271,70

Pharmacie TAJ EDDINE
Rue Echahid Benlahcen n°56B
Hay Branes 1^e - TANGER
Tel: 05 39 31 18 27

Dr. Abdelghani ZEKHNINI
Cardiologue
27, Bd Mohammed V - Tanger
NIP: 181-141-189

27, Boulevard MOHAMMED V , 90000, TANGER, MAROC

Tel : 0539 34 31 03 - Email : cardiozek@yahoo.fr

ASKARDIL®

ASKARDIL® acétylsalicylique)

75 mg 30 comprimés dispersibles

PPU 22DH40
EXP 04/2025
LOT 26014 12

imprimés.
comprimés.

medicament car elle contient des

seulement les informations fournies

ation.

me médicin ou à votre pharmacien ou si

notice.

itez aucune amélioration ou si vous vous

DENOMINATION

- ASKARDIL® co
- ASKARDIL® ci

Veuillez lire
information

Vous devez

dans cette

- Gardez ce

- Adressez-

- Si vous re

vous remar

- Vous deve

sentez moins

de

que

contient cette nou

1. Qu'est-ce que ASKARDIL® et dans q

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASKARDIL® ?

3. Comment prendre ASKARDIL® ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ASKARDIL® ?

6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE ASKARDIL® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANTITHROMBOTIQUE/INHIBiteur DE L'AGGREGATION PLAQUETTAIRE HEPARINE EXCLUE

Ce médicament contient de l'aspirine.

ASKARDIL® appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquetttaire.

ASKARDIL® agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

- Indications thérapeutiques

ASKARDIL® est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire.

Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par ASKARDIL® sans l'accord de votre médecin.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASKARDIL® ?

- Ne prenez jamais ASKARDIL® (Contre-indications)

• si vous êtes allergique à la substance active (acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans ASKARDIL®.

• si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS).

• si vous avez déjà eu de l'asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS).

• si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénium.

• si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements, durant la grossesse, à partir du début du 6^{ème} mois (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), pour des doses supérieures à 100 mg par jour.

• si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

• si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

• Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire déstabilisée à la naissance).

• Faîtes attention avec ASKARDIL® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASKARDIL®.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

• si vous avez une maladie héritaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges.

• si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou duodénium ou une inflammation de l'estomac (gastrite).

• si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles).

• si vous avez une maladie des reins ou du foie.

• si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée).

• si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de type pathologiques très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétysalicylique. ASKARDIL® ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Si une intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la dernière prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

- Enfants et adolescents >

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Vous ne devez pas prendre en même temps que ASKARDIL®, d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. L'association de ces médicaments à ASKARDIL® pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements. Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine ou d'autre anti-inflammatoire non stéroïdien.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre ASKARDIL® en même temps que :

• un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénium,

- + un autre médicament à base de ticlopidine ou dosage dans certaines situations où votre médecin prescrit du ticlopidine.
- + un autre médicament à base de benzboromarone (secretion de la glande thyroïde).
- + un autre médicament à base de lévothyroxine (secretion de la glande thyroïde).
- + un autre médicament à base de pemtrexed (médicament dans le sang).
- le vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'arrêter ce médicament. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ce médicament.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments) La consommation d'alcool doit être évitée pendant au niveau gastro-intestinal.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez conseiller à votre médecin ou pharmacien avant de prendre.

Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétyle) contenant de l'aspirine (y compris les médicaments :

- jusqu'à 100 mg par jour : Pendant toute la grossesse, il vous faut à vous prescrire de l'aspirine à faibles doses circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance scrupuleuse de l'ordonnance de votre médecin.
- entre 100 et 500 mg par jour : Par mesure de précaution, il vous faut arrêter ce médicament.
- à partir de 500 mg par jour :
- jusqu'à la fin du 5^{ème} mois de grossesse (jusqu'à ce que vous prescrivez ce médicament sauf si c'est absolu), il vous faut arrêter ce médicament.

Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible.

- à partir du début du 6^{ème} mois jusqu'à la fin de l'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences cardio-pulmonaires et rénales et cela même avec une surveillance attentive.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous êtes enceinte, consultez un gynécologue ou obstétricien afin d'une surveillance attentive.

Fertilité

L'aspirine, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peut entraîner des difficultés pour devenir enceinte, de devenir enceinte.

• Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à faire de l'activité physique :

- Excipient à effet notable

- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcéto

3 - COMMENT PRENDRE ASKARDIL® ?

- Instruction pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

- Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration :

a - Posologie : Ce médicament est réservé à l'adulte.

La dose habituelle est de 1 comprimé dispersible par jour. Votre médecin vous indiquera combien de comprimés.

Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin.

En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

b - Mode et voie d'administration :

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Dissolvez le comprimé d'ASKARDIL® dans un verre d'eau.

c - Fréquence et moment auquel le médicament doit être pris :

Votre médecin vous dira à quel moment de la journée.

d - Durée du traitement :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez prendre ce médicament.

- Utilisation chez les enfants et les adolescents :

Sans objet.

- La barre de cassure n'est pas destinée à briser.

- Si vous avez pris plus d'ASKARDIL® que vous n'en aviez besoin, ou si vous avez pris un surdosage ou en cas d'ingestion accidentelle.

Prévenez rapidement votre médecin, en particulier si vous avez pris plus d'ASKARDIL® que vous n'en aviez besoin.

Un surdosage peut être mortel, en particulier chez les enfants. Des bouffements d'oreille, une sensation de ballonnement dans les cas plus graves de la fièvre, une hypoglycémie, une chute rapide de la tension artérielle, une respiration importante. Si ces signes surviennent, vous devez arrêter immédiatement ce médicament et consulter un hôpital pour que vous y soyez traité.

Un œdème du poumon non lié à une insuffisance cardiaque avec l'aspirine. Cet œdème peut être mortel.

- Si vous oubliez de prendre ASKARDIL® (Conduite à suivre si vous avez oublié de prendre ASKARDIL®) : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose manquante.

- Si vous arrêtez de prendre ASKARDIL® (Risque de rechute) : Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou pharmacien.

4 - QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ASKARDIL® peut provoquer des effets indésirables.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- douleurs abdominales, difficultés de digestion, brûlures.

- inflammation de l'œsophage, de l'estomac, du duodénium.

- ulcération de l'œsophage, de l'estomac, du duodénium.

ASKARDIL®

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

PPU 22DH40
EXP 12/2024
LOT 26014 ?

DENOMINATION DU PRODUIT

- ASKARDIL® comprimé
- ASKARDIL® comprimé

Veuillez lire attentivement les informations importantes. Vous devrez toujours prendre ce médicament dans cette notice ou par :
 - Gardez cette notice, visitez le site www.askardil.com
 - Adressez-vous à votre pharmacien ou si vous ressentez l'un de ces symptômes, vous remarquez un effet secondaire, vous devrez-vous adresser à votre pharmacien ou si vous sentez moins bien.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que ASKARDIL® ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASKARDIL® ?
3. Comment prendre ASKARDIL® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ASKARDIL® ?
6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE ASKARDIL® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANTITHROMBOIQUE/INHIBITEUR DE L'AGGRÉGATION PLAQUETTAIRE HÉPARINE EXCLUE

Ce médicament contient de l'aspirine.

ASKARDIL® appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquetttaire.

ASKARDIL® agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

- Indications thérapeutiques

ASKARDIL® est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire.

Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par ASKARDIL® sans l'accord de votre médecin.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ASKARDIL® ?

- Ne prenez jamais ASKARDIL® (Contre-indications)

- si vous êtes allergique à la substance active (acide acétysalicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans ASKARDIL®.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS).
- si vous avez déjà eu de l'asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS).
- si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements.
- durant la grossesse, à partir du début du 6^{me} mois (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), pour des doses supérieures à 100 mg par jour.
- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur;
- si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.
- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).
- **Faites attention avec ASKARDIL® [Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi]**
Adressessez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASKARDIL®.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- si vous avez une maladie des reins ou du foie,
- si vous avez une hypertension artérielle [tension artérielle élevée],
- si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétysalicylique. ASKARDIL® ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

S'il y a intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la dernière prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

- **Enfants et adolescents** »

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Vous ne devez pas prendre en même temps que ASKARDIL® d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. L'association de ces médicaments à ASKARDIL® pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements. Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez, afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre ASKARDIL® en même temps que :
 - un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,

- un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel,
- un autre médicament à base de benz bromarone (goutte),
- un autre médicament à base de lévothyroxine (sécrétion de la glande thyroïde),
- un autre médicament à base de permétrex (médicament dans le sang),
- le vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'attendre ce médicament.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ce médicament.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments)

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez conseiller à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétyle) contenant de l'aspirine (y compris les médicaments si :

- jusqu'à 100 mg par jour : Pendant toute la grossesse, amenez à votre pharmacien de l'aspirine à fables dans certaines circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance scrupuleuse de l'ordonnance de votre pharmacien.
- entre 100 et 500 mg par jour : Par mesure de précaution, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.
- à partir de 500 mg par jour :

- jusqu'à la fin du 5^{me} mois de grossesse (jusqu'à la fin de la grossesse) : Si vous prenez ce médicament, vous pouvez prescrire ce médicament sauf si c'est absolulement nécessaire.

Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible.

- à partir du début du 6^{me} mois jusqu'à la fin de l'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué. Votre pharmacien peut vous conseiller de faire des examens de suivi de votre enfant peuvent avoir des conséquences cardio-pulmonaire et rénal et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous êtes enceinte, contactez immédiatement un gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adéquate soit réalisée.

- Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel, ce médicament peut être absorbé par l'enfant.

- Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aspirine, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peut entraîner des difficultés pour devenir enceinte, si vous êtes enceinte, demandez conseil à votre pharmacien.

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des objets

- Exipient à effet notable

- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétonurie.

3 - COMMENT PRENDRE ASKARDIL® ?

- Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

- Posologie, mode et voie (s) d'administration, a - Posologie :

Ce médicament est réservé à l'adulte. La dose habituelle est de 1 comprimé dispersible par jour.

Votre médecin vous indiquera combien de comprimés de ce médicament à prendre par jour.

Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin.

En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

- b - Mode et voie d'administration :

Ce médicament est destiné à être pris par voie orale.

Dissolvez le comprimé d'ASKARDIL® dans un verre d'eau.

- c - Fréquence et moment auquel le médicament doit être pris :

Votre médecin vous dira à quel moment de la journée.

- d - Durée du traitement :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez prendre ce médicament.

- e - Utilisation chez les enfants et les adolescents :

Sans objet.

- f - La barre de cassure n'est pas destinée à briser le comprimé.

Si vous avez pris plus d'ASKARDIL® que vous n'en aviez besoin, ou en cas d'ingestion accidentelle.

Prévenez rapidement votre médecin, en particulier s'il s'agit d'un enfant.

Un surdosage peut être mortel, en particulier chez les enfants.

Un surdosage peut entraîner une sensation de baisse dans les cas plus graves de la fièvre, une hypoglycémie, une chute rapide de la tension artérielle, une respiration.

Si ces signes surviennent, vous devrez arrêter immédiatement ce médicament et consulter un hôpital pour que vous y soyez traité.

Un œdème du poumon peut être à une insuffisance cardiaque avec l'aspirine. Cet œdème peut être mortel.

- Si vous oubliez de prendre ASKARDIL® (Conduite à tenir) :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose manquée.

Continuez votre traitement normalement et prévenez votre pharmacien.

- Si vous arrêtez de prendre ASKARDIL® (Risque de rechute) :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou pharmacien.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ASKARDIL® peut provoquer des réactions indésirables.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- douleurs abdominales, difficultés de digestion, brûlures.

- inflammation de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum.

- ulcération de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum.

résumé de ce qu'il devient.

Sur certains continents ou dans certains pays, l'absence de médecins entraîne des difficultés pour trouver un spécialiste dans le domaine de la santé mentale. C'est pourquoi il est important de faire appel à des professionnels qualifiés et expérimentés qui peuvent aider à trouver des solutions adaptées à vos besoins.

Préremplacement dans les séries de temps pour déterminer les tendances et les saisons. Les séries de temps sont des séries de données temporelles qui sont utilisées pour décrire les tendances et les saisons dans les données. Les préremplacements sont utilisés pour déterminer les tendances et les saisons dans les données. Les préremplacements sont utilisés pour déterminer les tendances et les saisons dans les données.

51. Une transformation du programme est prévue : L'aspirine sera remplacée par un autre médicament, lorsque à la fin de l'année prochaine il y aura insuffisance en aspirine pour que l'offre soit équilibrée. Les pharmaciens peuvent faire face à ce problème en achetant de l'aspirine à l'étranger.

Les syndromes de type « hyperdopaminergie » sont les plus courants et peuvent être rencontrés dans les deux types de maladie neurodégénérative : la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer.

Want de gedrags- en gedragstypen die goed passen bij jouw doelgroep? Dan kan je een gedragstypen-inventaris gebruiken om de verschillende gedragstypen te identificeren. De gedragstypen-inventaris kan helpen om de verschillende gedragstypen te begrijpen en te kunnen toepassen op de verschillende doelgroepen.

- d'abord au moyen de l'analyse des rapports entre les variables et les résultats
- puis par l'application de méthodes de modélisation et de prévision
- enfin par l'interprétation des résultats

- si vous avez un peu de temps, démarrez une autre séance dans les relations affaires.
- si vous avez un peu de temps, démarrez une autre séance dans les relations affaires.
- si vous avez un peu de temps, démarrez une autre séance dans les relations affaires.
- si vous avez un peu de temps, démarrez une autre séance dans les relations affaires.
- si vous avez un peu de temps, démarrez une autre séance dans les relations affaires.

- 15) **ANS:** Les dérégulations (privatisations) sont destinées à la fois à démanteler les monopoles et à faire évoluer l'économie en favorisant la concurrence.
- 16) **ANS:** Les dérégulations (privatisations) ont pour objectif de faire évoluer l'économie en favorisant la concurrence.
- 17) **ANS:** Les dérégulations (privatisations) ont pour objectif de faire évoluer l'économie en favorisant la concurrence.
- 18) **ANS:** Les dérégulations (privatisations) ont pour objectif de faire évoluer l'économie en favorisant la concurrence.
- 19) **ANS:** Les dérégulations (privatisations) ont pour objectif de faire évoluer l'économie en favorisant la concurrence.
- 20) **ANS:** Les dérégulations (privatisations) ont pour objectif de faire évoluer l'économie en favorisant la concurrence.

Yous des cellules sont des parties d'organes ou d'organismes. Ces modifications peuvent déclencher un état de maladie ou de blessure. Les cellules peuvent également se multiplier et donner des résultats tels que la croissance excessive ou la prolifération.

ASSEMBLÉE, **un grand succès pour les élections régionales** dans le territoire des Pyrénées-Orientales, mais aussi dans les deux autres départements de l'Occitanie. Les résultats sont en effet meilleurs que ceux de la dernière élection régionale, en 2010.

Cette plateforme entrepreneuriale est à votre disposition pour développer vos projets d'entrepreneuriat et de création d'entreprise. Elle vous offre un accès à des formations, des ateliers et des séminaires, ainsi qu'à des réseaux d'entrepreneurs et d'experts dans divers domaines.

1 - QUEL EST LE BUT DE L'ASSEMBLEE ? ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

d'amélioration), ce médiamenteur est susceptible d'expliquer certains effets sur les traits des destinataires (éventuels ?). 7. Comment prendre en compte l'individu ?

8. Quels sont les traits des destinataires susceptibles d'influencer la perception de ces messages ?

9. Comment concevoir une stratégie ?

10. L'ensemble des stratégies et leur efficacité.

ASKARDIL® 75 mg 30 dispersibles

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Indice de medicament car este certificat des | Grossesse | 04 MAI 2025 |
| Si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez d'être enceinte dans les 6 mois à venir, veuillez lire ce document avant de prendre | | EXP 05/2025 |

- ASKG 6 31004 LOT

DENO

- un utile medicamento a base de plantas (medicinal) que se aplica en la piel para tratar la artritis y la artrosis.
- un utile medicamento a base de plantas (medicinal) que se aplica en la piel para tratar la artritis y la artrosis.
- un utile medicamento a base de plantas (medicinal) que se aplica en la piel para tratar la artritis y la artrosis.

- un autre médicament à base de liothyroxine (goutte),
- un autre médicament à base de sécrétion de la glande thyroïde.

ASARBI®

ASKARDIL®

liquide (que) 110615F56086E210920

FORMES PHARMACIE

- Comprimés dispersibles
- Comprimés dispersibles

COMPOSITION QUANTITATIVE

Comprimés dispersibles

Acide acétylsalicylique

Excipient : qsp 1 g

Comprimés dispersibles

Acide acétylsalicylique

Excipient : qsp 1 g

CLASSE PHARMACEUTIQUE

Antithrombotique

DANS QUELS CAS

ASKARDIL® convient

seul ou associé à d'autres médicaments.

La prise d'ASKARDIL® ne peut être faite qu'après consultation de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif.
- Maladie hémorragique.
- Traitement concomitant par le méthotréxate ou les anticoagulants oraux si aspirine administrée à forte doses (supérieures à 3 g/j).
- Grossesse à partir du 6^{ème} mois, en dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une surveillance spécialisée.
- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétourie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).
- Il ne sera généralement pas utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de :
- Saignements gynécologiques anormaux ou règles.
- Goutte.
- Traitement concomitant par les anticoagulants oraux, ou par l'héparine, les uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires.
- L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Antécédents d'hémorragies digestives.
- Hypertension artérielle.
- Diabète.
- Port de stérilet.
- Médicament réservé à l'adulte.
- Prévenez votre médecin en cas de : asthme, hémorragie gastro intestinale, insuffisance rénale, de geste chirurgical même mineur car risque d'hémorragie secondaire à l'effet antiagrégant plaquettaire de l'aspirine.
- ASKARDIL® ne contenant pas de sodium, il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.
- Maladie des reins.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS ET NOTAMMENT :

- Les anticoagulants oraux : majoration du risque hémorragique.
- Uricosuriques : diminution de l'effet uricosurique.
- Méthotréxate utilisé à des doses > 15 mg/semaine, augmentation de la toxicité surtout hématologique.
- Autres anti-inflammatoires : majoration du risque ulcérogène et hémorragique si l'aspirine est administrée à des doses > 3 g/j.
- Héparine.

SIGNEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A BASE D'ASPIRINE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AFIN DE NE PAS DEPASSER LES DOSES MAXIMALES CONSEILLEES.



ASKARDIL® 75 mg
30 comprimés dispersibles
30 75 30

ASKARDIL® 75 mg
30 comprimés dispersibles
30 75 30

75 mg

160 mg

arine exclue

aines maladies du cœur ou des vaisseaux

dition de votre médecin.

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

RDIL®

(acide salicylique)

PPV 22DH40
EXP 10/2023
LOT 18005 4

IS

imés
comprimés

75 mg

FORMES POSSESSÉES

- Comprimé

- Comprimé

COMPOSITION

Comprimés

Acide acétique

Excipient : lactose

Comprimés

Acide acétique

Excipient : lactose

CLASSE PHARMACOLOGIQUE

Antithrombotique

Aspirine, héparine exclue

DANS QUELS CAS NE FAUT-IL PAS L'EMPLOYER?

ASKARDIL® contient de l'aspirine. Il est prescrit dans certaines maladies du cœur ou des vaisseaux seul ou associé à d'autres médicaments.

La prise d'ASKARDIL® ne peut être faite que sur prescription de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif.
- Maladie hémorragique.
- Traitement concomitant par le méthotréxate ou les anticoagulants oraux si aspirine administrée à fortes doses (supérieures à 3 g/j).
- Grossesse à partir du 6^{ème} mois, en dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une surveillance spécialisée.
- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).
- Il ne sera généralement pas utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de :
- Saignements gynécologiques anormaux ou règles.
- Goutte.
- Traitement concomitant par les anticoagulants oraux, ou par l'héparine, les uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires.
- L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Antécédents d'hémorragies digestives.
- Hypertension artérielle.
- Diabète.
- Port de stérilet.
- Médicament réservé à l'adulte.
- Prévenez votre médecin en cas de : asthme, hémorragie gastro intestinale, insuffisance rénale, de geste chirurgical même mineur car risque d'hémorragie secondaire à l'effet antiagrégant plaquettaire de l'aspirine.
- ASKARDIL® ne contenant pas de sodium, il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.
- Maladie des reins.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS ET NOTAMMENT :

- Les anticoagulants oraux : majoration du risque hémorragique.
- Uricosuriques : diminution de l'effet uricosurique.
- Méthotréxate utilisé à des doses > 15 mg/semaine : augmentation de la toxicité surtout hématologique.
- Autres anti-inflammatoires : majoration du risque ulcérogène et hémorragique si l'aspirine est administrée à des doses > 3 g/j.
- Héparine.

SIGNEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A BASE D'ASPIRINE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AFIN DE NE PAS DEPASSER LES DOSES MAXIMALES CONSEILLEES.

ASKARDIL®

(Acide acétylsalicylique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- **ASKARDIL® comprimés dispersibles** à 75 mg : boîte de 30 comprimés.

- **ASKARDIL® comprimés dispersibles** à 160 mg : boîte de 30 comprimés.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'une des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que ASKARDIL® et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASKARDIL® ?

3. Comment prendre ASKARDIL® ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ASKARDIL® ?

6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE ASKARDIL® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANTITHROMBOTIQUE/INHIBITEUR DE L'AGGRÉGATION PLAQUETTAIRE HÉPARINE EXCLUE

Ce médicament contient de l'aspirine.

ASKARDIL® appartient à la famille des inhibiteurs de l'aggrégation plaquetttaire.

ASKARDIL® agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

- Indications thérapeutiques

ASKARDIL® est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire.

Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par ASKARDIL® sans l'accord de votre médecin.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASKARDIL® ?

- Ne prenez jamais ASKARDIL® (Contre-indications)

- si vous êtes allergique à la substance active (acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans ASKARDIL®.

- si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens =AINS),

- si vous avez déjà eu de l'asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),

- si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,

- si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,

- durant la grossesse, à partir du début du 6^e mois (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), pour des doses supérieures à 100 mg par jour,

- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,

- si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).

Faites attention avec ASKARDIL® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASKARDIL®.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

- si vous avez une maladie hérititaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges.

- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),

- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),

- si vous avez une maladie des reins ou du foie,

- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),

- si vous avez des règles abondantes,

Des syndromes de Reye, pathologie très rare mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. ASKARDIL® ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Si une intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la dernière prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

- Enfants et adolescents »

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Vous ne devez pas prendre en même temps que ASKARDIL® d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. L'association de ces médicaments à ASKARDIL® pourrait entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements. Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez, afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre ASKARDIL® en même temps que :

- un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,

- un autre médicament à base de ticlopidine ou diasauf dans certaines situations où votre médecin p clopidogrel,
- un autre médicament à base de benzboromarone goutte,
- un autre médicament à base de lévothyroxine sécrétion de la glande thyroïde),
- un autre médicament à base de pemtrexed (médi dans le sang),
- le vaccin contre la varicelle : il est recommandé d'at ce médicament.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous premedicament.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments)

La consommation d'alcool doit être évitée pendant au niveau gastro-intestinal.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous p conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétyl

contenant de l'aspirine) y compris les médicaments

- jusqu'à 100 mg par jour : Pendant toute la grossesse, amenez à votre prescrire de l'aspirine à faibles doses circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin.

- entre 100 et 500 mg par jour : Par mesure de prudence, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

- à partir de 500 mg par jour :

- jusqu'à la fin du 5^e mois de grossesse (jusqu'à ce que vous prescrire ce médicament sauf si c'est abs fausses couches ou malformations).

Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible.

- à partir du début du 6^e mois jusqu'à la fin de l'aménorrhée, ce médicament est contre-indiqué, car ses effets sur votre système peuvent avoir des complications cardio-pulmonaire et rénal et cela même avec une dose faible.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance ait lieu.

Allaitement

Ce médicament passant dans le lait maternel, ce me Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Fertilité

L'aspirine, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peut entraîner des difficultés pour devenir enceinte, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à manœuvrer

- Excipient à effet notable

- Aspartam : est contre indiqué en cas de phénylcétoneurie.

3 - COMMENT PRENDRE ASKARDIL® ?

- Instruction pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

- Posologie, mode et voie(s) d'administration

a - Posologie :

Ce médicament est réservé à l'adulte.

La dose habituelle est de 1 comprimé dispersible par jour.

Votre médecin vous indiquera combien de comprimés. Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin.

En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou pharmacien. ASKARDIL® 75 mg ce dosage faible d'aspirine n'est pas destiné à l'adulte.

b - Mode et voie d'administration :

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Dissoudre le comprimé d'ASKARDIL® dans un verre d'eau.

c - Fréquence et moment auquel le médicament doit être pris :

Votre médecin vous dira à quel moment de la journée prendre ce médicament.

d - Durée du traitement :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez prendre ce médicament.

e - Utilisation chez les enfants et les adolescents

Sans objet.

f - La barre de cassure n'est pas destinée à briser.

- Si vous avez pris plus d'ASKARDIL® que vous n'en aviez pas besoin, ou si vous avez pris un surdosage ou en cas d'ingestion accidentelle.

Prévenez rapidement votre médecin, en particulier si vous avez pris une grande quantité.

Un surdosage peut être mortel, en particulier chez les personnes d'âge moyen, une sensation de brûlure dans les cas plus graves de la fièvre, une hypoglycémie, une chute rapide de la tension artérielle, une réaction allergique.

Si ces signes surviennent, vous devez arrêter immédiatement de prendre ce médicament et consulter un hôpital pour que vous y soyez traité.

Un œdème du poumon non lié à une insuffisance cardiaque avec l'aspirine. Cet œdème peut être mortel.

- Si vous oubliez de prendre ASKARDIL® (Conseil)

Ne prenez pas de dosse double pour compenser la dose manquée.

Continuez votre traitement normalement et prévenez votre pharmacien.

- Si vous arrêtez de prendre ASKARDIL® (Risque de rechute)

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou pharmacien.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENEMENTS

Comme tous les médicaments, ASKARDIL® peut provoquer des effets indésirables.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- douleurs abdominales, difficultés de digestion, brûlures.

- inflammation de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum.

- ulcération de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum.

NEBILET®

5 mg

NEBILET®
nebivolol 5 mg

ns et

0°C.
e desédecin
en cas de
ation du

V14/09/77/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés O
PPV 87DH50**NEBILET 5 mg, comprimé quadruple****La substance active est :**

Nébivolol 5,00 mg
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg
 pour un comprimé quadruple

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple**ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadruple en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadruple dans les cas suivants :

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.
- Insuffisance hépatique (*du foie*) ou altération de la fonction hépatique.
- Grossesse ou allaitement (cf. rubriques Grossesse et Allaitement).
- Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou dé compensation de l'insuffisance cardiaque.
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-ventriculaires des 2ème et 3ème degrés sans pace-maker, bloc sino-auriculaire).
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères (actuels ou passés).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (maladie du si nus).
- Troubles de tension (pression artérielle systolique > 90 mmHg).

dicament protecteur utilisé contre les effets secondaires du cancer);
 ent pour traiter un excès d'acide dans l'estomac ou les ulcères (médicament antiacide), il faut prendre la cimétidine ; NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antiacide entre les repas.

On de ces médicaments est généralement tolérée sous traitement par nébivolol sauf sur ordonnance de votre médecin.

MENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple ?*Instruction*

La dose recommandée est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour.

La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadruple est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.

L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadruple doit être cassé comme indiqué ci-après :

Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé - face présentant les barres de sécabilité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécabilité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.



NEBILET®

5 mg

NEBILET®
nebivolol 5 mg

ns et

0°C.
e desédecin
en cas de
ation du

V14/09/77/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés O
PPV 87DH50**NEBILET 5 mg, comprimé quadruple****La substance active est :**

Nébivolol 5,00 mg
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg
 pour un comprimé quadruple

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple**ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadruple en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadruple dans les cas suivants :

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.
- Insuffisance hépatique (*du foie*) ou altération de la fonction hépatique.
- Grossesse ou allaitement (cf. rubriques Grossesse et Allaitement).
- Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou dé compensation de l'insuffisance cardiaque.
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-ventriculaires des 2ème et 3ème degrés sans pace-maker, bloc sino-auriculaire).
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères (actuels ou passés).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (maladie du si nus).
- Troubles de tension (pression artérielle systolique > 90 mmHg).

dicament protecteur utilisé contre les effets secondaires du cancer);
 ent pour traiter un excès d'acide dans l'estomac ou les ulcères (médicament antiacide), il faut prendre la cimétidine ; NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antiacide entre les repas.

On de ces médicaments est généralement tolérée sous traitement par nébivolol sauf sur ordonnance de votre médecin.

MENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple ?*Instruction*

La dose recommandée est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour.

La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadruple est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.

L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadruple doit être cassé comme indiqué ci-après :

Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé - face présentant les barres de sécabilité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécabilité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.



NEBILET®

5 mg

NEBILET®
nebivolol 5 mg

ns et

0°C.
e desédecin
en cas de
ation du

V14/09/77/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés O
PPV 87DH50**NEBILET 5 mg, comprimé quadruple****La substance active est :**

Nébivolol 5,00 mg
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg
 pour un comprimé quadruple

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple**ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadruple en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadruple dans les cas suivants :

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.
- Insuffisance hépatique (*du foie*) ou altération de la fonction hépatique.
- Grossesse ou allaitement (cf. rubriques Grossesse et Allaitement).
- Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou dé compensation de l'insuffisance cardiaque.
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-ventriculaires des 2ème et 3ème degrés sans pace-maker, bloc sino-auriculaire).
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères (actuels ou passés).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (maladie du si nus).
- Troubles de tension (pression artérielle systolique > 90 mmHg).

dicament protecteur utilisé contre les effets secondaires du cancer);
 ent pour traiter un excès d'acide dans l'estomac ou les ulcères (médicament antiacide), il faut prendre la cimétidine ; NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antiacide entre les repas.

On de ces médicaments est généralement tolérée sous traitement par nébivolol sauf sur ordonnance de votre médecin.

MENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadruple ?*Instruction*

La dose recommandée est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour.

La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadruple est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.

L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadruple doit être cassé comme indiqué ci-après :

Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé - face présentant les barres de sécabilité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécabilité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.



اتاکاند ۱۶

يرجى قراءة هذه النشرة بتمعّن


- احتفظ بهذه النشرة، فـ
 - إذا كانت لديك أسلطة أو
 - على معلومات إضافية
 - وصف هذا الدواء لك
 - نفس الأعراض، يمكن
 - إذا أصبح أي من الآ
 - مذكور في هذه الن

في هذه النشرة

١. ما هو أتاكاند (٤).
 ٢. ما هي المعلومات التي
 ٣. كيف تتناول أتاكاند
 ٤. ما هي الآثار الجاذبة
 ٥. كيف يحفظ أتاكاند
 ٦. معلومات أخرى.

1. ما هو أتابكاند

اسم هذا الدواء هو
ينتمي هذا الدواء
يُعمل عن طريق
الدم الشرياني
يستخدم د



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ATACAND®, comprimé sécable et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
 3. Comment prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver ATACAND®, comprimé sécable ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATACAND®, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ATACAND®.

Faites attention avec ATACAND®, comprimé sécable :
Avant de prendre, ou lorsque vous prenez ATACAND®,
veuillez indiquer à votre médecin

- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
 - si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
 - si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
 - si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou hyperaldostéronisme primaire).
 - si votre pression artérielle est basse.
 - si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

ATACAND® est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez ATACAND®. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, ATACAND® peut provoquer une baisse de votre pression artérielle.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies

أتابكاند® 4 مل

أتابكاند®

أتابكاند® 6

يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن

- احتفظ بهذه النشرة، فـقد
- إذا كانت لديك أسئلة، أو
- على معلومات إضافية
- وصف هذا الدواء لك
- نفس الأعراض، يمكن
- إذا أصبح أي من الآ
- ذكور في هذه الن

في هذه النشرة


- ما هو أتابكاند®.
- ما هي المعلومات الـ
- كيف تتناول أتابكاند
- ما هي الآثار الجانبـ
- كيف يحفظ أتابكاندـ
- معلومات أخرى.

1. ما هو أتابكاند®

اسم هذا الدواء هو
يتنبئ هذا الدواء
يعمل عن طريق
الم الشرابيـ

يستخدم جـ

لـ



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que ATACAND®, comprimé sécable et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
- Comment prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ATACAND®, comprimé sécable ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATACAND®, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ATACAND®.

Faites attention avec ATACAND®, comprimé sécable : Avant de prendre, ou lorsque vous prenez ATACAND®, veuillez indiquer à votre médecin

- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou hyperaldostéronisme primaire).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

ATACAND® est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez ATACAND®. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, ATACAND® peut provoquer une baisse de votre pression artérielle.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies

اتاکاند ۴ مل

اتاکاند ۳

۶۰ آتاکاند

يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن

- احتفظ بهذه النشرة، فـ
 - إذا كانت لديك أسلطة أو
 - على معلومات إضافية
 - وصف هذا الدواء لك
 - نفس الأعراض، يمكن
 - إذا أصبح أي من الآ
 - مذكور في هذه الن

في هذه النشرة

١. ما هو أتاكاند (٤).
 ٢. ما هي المعلومات التي
 ٣. كيف تتناول أتاكاند
 ٤. ما هي الآثار الجاذبة
 ٥. كيف يحفظ أتاكاند معلومات أخرى.
 - ٦.

1. ما هو أتابكاند

اسم هذا الدواء هو
يُنتمي هذا الدواء
يُعمل عن طريق
الدم الشرياني
يستخدم



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ATACAND®, comprimé sécable et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
 3. Comment prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver ATACAND®, comprimé sécable ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATACAND®, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ATACAND®.

Faites attention avec ATACAND®, comprimé sécable :
Avant de prendre, ou lorsque vous prenez ATACAND®,
veuillez indiquer à votre médecin

- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
 - si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
 - si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
 - si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou hyperaldostéronisme primaire).
 - si votre pression artérielle est basse.
 - si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

ATACAND® est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique Grossesse).

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez ATACAND®. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, ATACAND® peut provoquer une baisse de votre pression artérielle.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies

Né: 01.01.1955
Age: 68 A
Sexe: M
Taille: cm
Poids: 98,0 kg
PA: 130/80 mmHg
Med:
Rem:

FC 65 /min
Axes
P 24 °
QRS 62 °
T 43 °

Intervalles
RR 920 ms
P 164 ms
PQ 186 ms
QRS 84 ms
QT 378 ms
QTc 394 ms


Interprétation

R
y
S

Dr. Abdelghani ZEKHNINI
Cardiologue
N°: 141-189
Bd.Mohamed V - Tanger
INP: 162

CABINET DE CARDIOLOGIE DR ZEKHNINI A. CARDIOZEK
Nom: Chentouf Abdelhak
No ID: K41712
Cas n°: cardio

20.09.2023 14:41:54



25 mm/s 10,0 mm/mV

0.05-35 Hz 50 Hz SBS

SDS-104 2.63.3

(AT-104 PC 1.84 5.71 2.63.3)

Page 1/1