

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/08/2023			1500 F	 Dr. Jan CHEFF Généraliste Bay El Ouds en face de la mosquée Siri Bernoussi 022 73.78.51

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXÉCUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien du Fournisseur	105 : 000500526000032, Date	Montant de la Facture
Docteur MENDOUD Hou Avenue C. N° 33 El Hamid Sidi Bernoussi El Qods	10/08/2023	360, 60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

ctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hassan CHEFFI

Médecine Générale

Diplôme en Echographie
de l'Université de Montpellier
Diabète

Thérapie par l'énergie positive (reiki)

الدكتور حسن الشفيفي

الطب العام

دبلوم في التشخيص
العلمي بالصدى جامعة مونبليي
داء السكري
العلاج بالطاقة الإيجابية (الريكي)

Casablanca : 10/08/2023

AML AL

ZouBida

68,50x2 Amarel

X2mey 1cm

79,90x2 Nati xan 1,5

X2mey

1cm

NS

091040824

Stre Sam 20

2mey

1m

NS

Pharmacie MENDOU

23, N°69 Hay Quds

Av. Hassan II, Sidi Bernoussi

23, N°69 Hay Quds

Dr HASSAN CHEFFI
Médecin Général
23, N° 69, Hay Quds en face
Mosquée Fatima Zahra - Sidi Bernoussi
Casablanca - Tel : 022.73.78.51

زنقة 23 رقم 69 حي القدس (أمام مسجد لالة فاطمة الزهراء) سيدى البرنوصي - الدار البيضاء
Rue 23 N°69 Hay Quds (en face Mosquée Fatima Zahra) - Sidi Bernoussi - Casablanca

الهاتف : 05 22 73 78 51

et contenu de l'emballage extérieur
200 gélules sous plaquettes thermoformées

ne pas être commercialisées.

Section de mise sur le marché

Précautions à prendre

Autres recommandations de STRASAW, 2011

La notice a été révisée est :

STREAW. Philip Smith

édicament sont disponibles sur le site Internet

3. COMMERCIAL FRIENDSHIP

does a subministering

Réduire la démission

BIOCODEX

Stresam

CHLORHYDRATE D'ETIFOXINE

Veuillez lire attentivement cette notice sur le médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la consulter.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit pour vous. Il pourrait leur être indiqué de prendre ce médicament si leurs maladies sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique au cas où un effet indésirable n'aurait pas été mentionné dans cette notice. Votre pharmacien pourra vous donner des renseignements supplémentaires.

Lot : 3694
Mfg: 11 202
EXP.: 11 202
BB100DEX

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que STRESAM, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STRESAM ?
 3. Comment prendre STRESAM, gélule ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver STRESAM, gélule ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE STRESAM, gélule ET DANS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANXIOLYTIQUE - code ATC : N

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé pour diminuer les diverses réactions et corporelles qui accompagnent l'anxiété.

معلومات مماثلة حول تقصي سكر الدم (النخاع مسحون) عندما تأخذ أماريل، قد تتعرض لنقص سكر الدم (نفخة) المعلومات الإضافية أدناه حول تقصي سكر الدم وعلامات يمكن أن تؤدي العوامل التالية من خطير التعرض لنقص

- ٦) نفس تغذية، عدم انتظام وفats الوجبات، تغذية
- ٧) تغيرات في النظم الغذائي
- ٨) أخذ كمية من ماءز أكثر من حاجته
- ٩) ضعف في الوظيفة الكلوية
- ١٠) مرض خطير في الكبد
- ١١) إذا كانت تعانى من اضطرابات هرمونية معينة (ما
- ١٢) إضافة إلى ذلك
- ١٣) انسداد المخلوق (بخاصة عند ثورت وجيبة)
- ١٤) أخذ بعض الموارف الأخرى (ارتفاع ضغط ماءز آخر)
- ١٥) إذا زدت تنشاطك البدنى أو إذا تكل لا تأكل ما يأكل
- ١٦) على كمية ثبات الماءز

تتضمن عوائق نقص مطر الدم ما يلي:

- ٥ شعور مماهٍ بالجوع، صداع، غثيان، تقيّق، خمول،
- ٥ صعوبة في التركيز، منعك في الانتباه وفي القدرة على الالتصاق، صعوبة في التعلم، رضاخان، شلل جزئي
- ٥ يمكن حصول العوارض التالية أيضاً: عرق كثيف، ضغط الدم، خفقان، امتحان، امتحان، وفوق في الصدر وأضطرابات في نظم القلب.

إذا استمرت ميسيونات السكر في نمك بالانخفاض وباختلاجات وفقدان المسيطرة على الذات وقد يصبح تفويت الوعي قد يشهي نفس سكر النم الحاد السكتة الدماغية

גָּדוֹלָה/סְגָּדָה

في أكثرة الحالات، تختفي عوارض نفس سكر الدم
السكر أو شراب حلو أو شاي محلى. لذلك يجب أن
والجدير تذكر أن المحتلات الاستيطانية غير فتاولة.
الصلب بالطبيب أو أذهب إلى المستشفى في حال لم
العارض.

الكتاب المقدمة

يجب التحقق بالتنظيم من مستوى السكر في دمك أو بوجهاة تعداد خلايا الأنسجة الكبدية لبيان

卷之三

الأطفال والمراهقون

أدوية أخرى وأمراض

علم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو أخذت مواد قد يُضطرط طبيبك إلى تغيير الجرعة التي تأخذها من أم أو تقوّي مفعول أدوية على مستوى السكر في دمك. يمكن للأدوية التالية أن تزيد مفعول أدوية (انخفاض ملحوظ في مستوى السكر في الدم):

- ٥. لغوية أخرى لعلاج داء السكري (مثل الأنسولين أو لورين)
- ٥. لغوية علاج الألم أو الالتهاب (فينيلوبوتارون، الأزويز)
- ٥. لغوية علاج الالتهابات البولية (مثل بعض المسالغونامات)
- ٥. لغوية علاج حالات العدوى الكبيرة والقطارة (التراتس، الكوليكتولات، الباكتيريا، ومصرين):

- ٥- الأدوية التي تمنع تغزير الدم مضادات الفيتامين كـ
- ٦- الأدوية التي تعزز بناء العضلات (الاستانات)؛
- ٧- الأدوية المستعملة للعلاج البديل غير الهرمونات الم
- ٨- أدوية علاج الأكتينات (اللوكوبكين)، مميتات أكسيداز
- ٩- الأدوية المضادة لمستويات الكوليسترون العالمية
- ١٠- الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم (المثبطات

Amare!®

أمارل ¹ ملغ، قرص
أمارل ² ملغ، قرص
أمارل ³ ملغ، قرص
أمارل ⁴ ملغ، قرص

۲۰۰۰

اقرء هذه النشرة بعناية قبلأخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة الدوائية حتى تراجع إلى فرماتها مجدداً.
- 13. كانت لديك أسلطة إضافية، اطلبها من الطبيب أو الصيدلي.
- ندق وصف هذه الدوائة لك شخصياً. لا تعلمها إلأى أشخاص آخرين حتى إذا كانت مساعدة لغيرك لأنها قد يرتكبوا بها خطأ.
- 14. تعرّفت على تأثيرات جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي. ينطبق هذا أيضاً على حارقة.
- 15. يمكن في هذه النشرة، راجع القسم 4.

في هذه النشرة:

١. ما هو أمارل وما هي دواعي استعماله
 ٢. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبلأخذ أمارل
 ٣. كيف ينعدم أمارل
 ٤. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة
 ٥. كيف يحظى أمارل
 ٦. محتوى العلبة ومعلومات أخرى

١. ما هو أمارل وما هي دواعي استعماله

أماريل هو دواء ضد آلام السكري يُؤخذ عن طريق الفم ويُنتمي إلى مجموعة السلفونيل بوريا التي تخفض مستويات السكر في الدم. يُعمل أماريل على زيادة كمية الأنسولين التي يطلقها البنكرياس. ومن ثم تخفض الأنسولين مستوى السكر في دمك.

يُنصح أماريل بعلاج آلام السكري من النوع الثاني عندما لا تكفي الجمدة الغذائية والتمارين الرياضية. وقد يُنصح أماريل بعلاج آلام السكري من النوع الثاني عندما لا تكفي الجمدة الغذائية والتمارين الرياضية.

وقد يُنصح أماريل بعلاج آلام السكري من النوع الثاني عندما لا تكفي الجمدة الغذائية والتمارين الرياضية.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبلأخذ أمثل

موانع الاستعمال:

- اذا كانت تعانى من حساسية ضد الغلوبيرين او مركبات سولفونيل بوريا اخرى (الوية لستعمل لتخفيض سكر الدم مثل الميلينيكالايميد) او الوية المسلوبوناميد المضادة للكتوكريدا (الوية لعلاج حالات السكري الكتوكريدة مثل سلامفاميكوكارازول) او أي مركب آخر من مركبات هذا الاداء المتكرونة

في القسم 10
 . إذا كانت تعانى من داء السكري المعتمد على الأنسولين (داء السكري من النوع 1)
 . إذا كانت تعانى من المعاراض الكيتونى السكري (تضاعفة من معاراضات السكري يترافق
 فيها مستوى الحمض في الدم وقد تسبب العوارض التالية: نعس وشعور بالتواء (غثيان)
 وتوقيع متكرر وقيص عصلي) ١

- إذا كنت في غيبة السكري
- إذا كنت مصاباً بمرض كلوي خطير
- إذا كنت مصاباً بمرض كبدى خطير
- لا تأخذ هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات أعلاه تتعلق عليك.

Digitized by srujanika@gmail.com

احتياطات الاستفمان

نحدث إلى الطيب أو الصييلي قبلأخذ أمرايل إذا:
٥. كنت تتعافي من حرج أو من هراحة أو من حالة عنق مصبوحة بالحصى أو من أي شكل آخر

٥. كفت تعانى من مشكلة خطيرة في الكبد أو الكلى.
إذا لم تكن متأكدة مما إذا كانت إحدى هذه الحالات تتطلب عليك، حثثت إلى الطبيب أو إلى
الصيدلي قبل أخذ أدواني.



1401285

1401124
6 118001130184
NATRIXAM 1,5 mg/5 mg
30 comprimés à libération modifiée
PPV : 79,90 DH

Indapamide / Amlodipine

NATRIXAM® 1,5 mg/5 mg

NATRIXAM® 1,5 mg/10 mg

comprimé à libération modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NATRIXAM, comprimé à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
3. Comment prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NATRIXAM, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques et diurétiques -
Code ATC : C08GA02.
NATRIXAM est indiqué dans le traitement de la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) en traitement de substitution chez les patients

- si vous avez une insuffisance cardiaque, tout trouble du rythme cardiaque, si vous avez une maladie coronarienne (maladie du cœur causée par un flux sanguin insuffisant dans les vaisseaux du cœur),
- si vous avez des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la vision ou des douleurs oculaires. Il peut s'agir de symptômes d'accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroidien), ou d'une augmentation de la pression dans l'œil, et peuvent survenir dans les heures ou les semaines suivant la prise de NATRIXAM. Cela peut entraîner une perte de la vision, si elle n'est pas traitée. Si vous avez déjà une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque de développer cela,
- si vous avez des troubles musculaires, notamment des douleurs, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes,
- si vous présentez une augmentation sévère de la pression artérielle (crise hypertensive),



1401285

1401124
6 118001130184
NATRIXAM 1,5 mg/5 mg
30 comprimés à libération modifiée
PPV : 79,90 DH

Indapamide / Amlodipine

NATRIXAM® 1,5 mg/5 mg

NATRIXAM® 1,5 mg/10 mg

comprimé à libération modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NATRIXAM, comprimé à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
3. Comment prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NATRIXAM, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques et diurétiques -
Code ATC : C08GA02.
NATRIXAM est indiqué dans le traitement de la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) en traitement de substitution chez les patients

- si vous avez une insuffisance cardiaque, tout trouble du rythme cardiaque, si vous avez une maladie coronarienne (maladie du cœur causée par un flux sanguin insuffisant dans les vaisseaux du cœur),
- si vous avez des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la vision ou des douleurs oculaires. Il peut s'agir de symptômes d'accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroidien), ou d'une augmentation de la pression dans l'œil, et peuvent survenir dans les heures ou les semaines suivant la prise de NATRIXAM. Cela peut entraîner une perte de la vision, si elle n'est pas traitée. Si vous avez déjà une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque de développer cela,
- si vous avez des troubles musculaires, notamment des douleurs, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes,
- si vous présentez une augmentation sévère de la pression artérielle (crise hypertensive),