

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-U021566

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :	2987	Société :	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	Retraite
Nom & Prénom :		K. KHOURAISI MOUSTAFI	
Date de naissance :		7/07/1956	
Adresse :		5 lotissement Almaglou Aljaddid LISASTA - CASA	
Tél. :	0661081125	Total des frais engagés :	651,60 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :	Dr. BEHATE Mohamed Médecin Généraliste Lot. Al Farah Doha Imm. 19 Appt. 2 RDC Bd. Haj Fateh Hay Oulifa Casablanca - Tel: 0522 66 00 10
---------------------	--

Date de consultation : 10-10-2023

Nom et prénom du malade : KHOURAISI DIAW Age: 1956

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : HTA - Lombalgie


Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : HTA


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 10/10/2023

Signature de l'adhérent(e) : 



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet de signature du Medecin attestant le paiement des Actes
10-10-2023			200,00	INPE-091017998 Dr. BAHIATE Mohamed Medecin Généraliste Lot. Al Farah Doha Inn. 19 Apt. 2 RDC Bd. Hal Fatch Hay Oulfa Casablanca - Tel: 0522 05 00 18

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/07/2023	451,60

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX 
				MONTANTS DES SOINS 
				DEBUT D'EXECUTION 
				FIN D'EXECUTION 
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX 
	 H 25533412   21433552 D 00000000   00000000 B 00000000   00000000 H 35533411   11433553			
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS 
				DATE DU DEVIS 
				DATE DE L'EXECUTION 
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS		VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION		

# DOCTEUR MOHAMED BEHATE

Diplômé du Centre Hôpitalo-Universitaire

Ibn Rochd à Casablanca

Ex-Médecin Interne des Hôpitaux d'El Jadida

Ex-Médecin aux Forces Armées Royales

Médecine Générale

# الدكتور محمد بحات

خريج المركز الاستشفائي الجامعي

ابن رشد بالبيضاء

طبيب داخلي بمستشفيات الجديدة سابقا

طبيب بالقوات المسلحة الملكية سابقا

الطب العام

Casablanca, le : 2023

الدار البيضاء، في:

Dr KHOURASSI Doha  
82,00 x 4  
1- Dose 50mg  
100ml  
60,00 x 2  
2- Dose 100mg  
x 47ml  
Dr. BEHATE Mohamed  
Médecin Généraliste  
Lot. Al Farah Doha Imm. 19 Appt. 2  
RDC Bd. Haj Fateh Hay Oulfa  
Casablanca - Tel: 0522 66 00 18

فرينة الفرح الشخصي - العمارة 19 الشقة 02 الطابق السفلي، شارع الليمون الحاج فاعم امتداد الالفة - بمستشفيات 2019 الدار البيضاء  
Lot. AL FARAH - Addoha, Imm.19, Appt N°2 RDC, Bd.Laimoun Hadj Fateh Extension Oulfa, Lissasa 20190 Casablanca

Tél.: 05 22 65 00 18



### Composition en substance active :

Losartan potassique ..... 50 mg.

**Excipients** q.s.p 1 comprimé pelliculé sécable.  
Excipient à effet notable : lactose.

AMM N° 510/15 DMP/21/NNP

### Indications

PREZAR® 50 mg  
• Pour traiter la  
• Pour pr'  
0,5g/100  
• Pos:  
l'angie  
pas été  
• Che  
réduit

**Poso:**  
Veuillez  
pharm.  
Les co-  
impéri  
Veuillez  
meille  
en fonc

si vous prenez  
séable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, off

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour. La diminution de la pression artérielle atteint son maximum plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® 50 mg, comp

à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques type 2.

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments ou débloquants et les antihypertenseurs d'action couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants; Patients adultes insuffisants cardiaques)

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la quatrième semaine, 50 mg par jour la cinquième semaine, maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par

ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques très élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

# PREZAR® Losartan

Comprimés  
pelliculés  
sécables

30

Voie orale

bott U.3a.  
82 Allée des Cauquins - Ain Sefra - Cratébana  
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

b

P P V 8 2 0 H 7 3  
P F R 0 4 / 2 6  
L O T M 1 5 5 9

82,70



dose  
sécable

### Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
  - Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants d'ce médicament.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter la grossesse - voir rubrique "Grossesse".
  - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
  - Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez l'aspirine.

### Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement des yeux ou de la tête, difficultés à respirer).

Ce n'est qu'un effet secondaire grave pouvant survenir chez presque tous les patients. Il est donc important de faire une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

### Fréquents :

- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion par des doses élevées de diurétiques),
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle, faiblesse,
- Fatigue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élevation de l'uree dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le

### Peu fréquents :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Éruption [urticaire],
- Démangeaisons (prurit),
- Éruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux,

### Rares :

- Hypersensibilité,
- Angio-oedème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant purpura et engourdissement ou picotements (paresthesies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite

### Fréquence indéterminée :

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleur de l'écoulement),
- Impotence,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hypertonatremie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grommement ou cloquement dans les oreilles,
- Troubles du goût (dyguesie),

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés

### Mises en garde spéciales et Précautions pos

Avertissez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous prenez éte (ou êtes susceptibles) d'enlever dans le début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceintes d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR® 50

- Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge),
- Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées, en particulier si elles sont accompagnées de douleurs abdominales,
- Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent le volume d'urine et de sel peuvent conduire à une perte importante de liquide et de sel)



### Composition en substance active :

Losartan potassique ..... 50 mg.

**Excipients** q.s.p 1 comprimé pelliculé sécable.  
Excipient à effet notable : lactose.

AMM N° 510/15 DMP/21/NNP

### Indications

PREZAR® 50 mg  
• Pour traiter la  
• Pour pr'  
0,5g/100  
• Pos:  
l'angie  
pas été  
• Che  
réduit

**Poso:**  
Veuillez  
pharm.  
Les co-  
impéri  
Veuillez  
meille  
en fonc

si vous prenez  
séable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, off

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour. La diminution de la pression artérielle atteint son maximum plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® 50 mg, comp

à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques type 2.

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments ou débloquants et les antihypertenseurs d'action couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants; Patients adultes insuffisants cardiaques)

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la quatrième semaine, 50 mg par jour la cinquième semaine, maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par

ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques très élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

# PREZAR® Losartan

Comprimés  
pelliculés  
sécables

30

Voie orale

bott U.3a.  
82 Allée des Cauquins - Ain Sefra - Cratébana  
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

b

P P V 8 2 0 H 7 3  
P F R 0 4 / 2 6  
L O T M 1 5 5 9

82,70



dose  
sécable

### Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
  - Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants d'ce médicament.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter la grossesse - voir rubrique "Grossesse".
  - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
  - Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez l'aspirine.

### Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement des yeux ou de la tête, difficultés à respirer).

Ce n'est qu'un effet secondaire grave pouvant survenir chez presque tous les patients. Il est donc important de faire une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

### Fréquents :

- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion par des doses élevées de diurétiques),
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle, faiblesse,
- Fatigue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élevation de l'uree dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le

### Peu fréquents :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Éruption [urticaire],
- Démangeaisons (prurit),
- Éruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux,

### Rares :

- Hypersensibilité,
- Angio-oedème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant purpura et engourdissement ou picotements (paresthesies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite

### Fréquence indéterminée :

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleur de l'écoulement),
- Impotence,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hypertonatremie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grommement ou cloquement dans les oreilles,
- Troubles du goût (dyguesie),

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés

### Mises en garde spéciales et Précautions pos

Avertissez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous prenez éte (ou êtes susceptibles) d'enlever dans le début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceintes d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR® 50

- Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge),
- Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées, en particulier si elles sont accompagnées de douleurs abdominales,
- Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent le volume d'urine et de sel peuvent conduire à une perte importante de liquide et de sel)



### Composition en substance active :

Losartan potassique ..... 50 mg.

**Excipients** q.s.p 1 comprimé pelliculé sécable.  
Excipient à effet notable : lactose.

AMM N° 510/15 DMP/21/NNP

### Indications

PREZAR® 50 mg  
• Pour traiter la  
• Pour pr'  
0,5g/100  
• Pos:  
l'angie  
pas été  
• Che  
réduit

**Poso:**  
Veuillez  
pharm:  
Les co:  
impéri:  
Veuillez:  
medeci:  
en fonc:

... et si vous prenez ...  
séable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, off

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour. La diminution de la pression artérielle atteint son maximum plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® 50 mg, comp. à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques type 2.

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments ou débloquants et les antihypertenseurs d'action couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants; Patients adultes insuffisants cardiaques)

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine, maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par ex., ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques très élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

# PREZAR® Losartan



Comprimés  
pelliculés  
sécables

30

Voie orale

bott U.3a.  
82 Allée des Cauquins - Ain Sefra - Cratébana  
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

P P V 8 2 0 H 7 3  
P F R 0 4 / 2 6  
L O T M 1 5 5 9

82,70



dose  
sécable



### Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
  - Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants d'ce médicament.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter la grossesse - voir rubrique "Grossesse".
  - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
  - Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez l'aloès.

### Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre médecin urgent ou l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement des yeux ou de la tête, difficultés à respirer).
- Ce n'est qu'un effet secondaire grave pouvant survenir chez presque tous les patients sous PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

### Fréquents :

- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion par des doses élevées de diurétiques).

- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle, faiblesse, fatigue, trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie), trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie), modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale, réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie), élévation de l'uree dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

### Peu fréquents :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Éruption [urticaire],
- Démangeaisons (prurit),
- Éruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

### Rares :

- Hypersensibilité,
- Angio-oedème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant purpura et engourdissement ou picotements [paresthesies], évanouissement [syncope]),
- Brûlures de cœur très rapides et irrégulières (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite.

### Fréquence indéterminée :

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleur de l'écoulement urinaire),
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hypertonatremie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grommement ou cloquement dans les oreilles,
- Troubles du goût (dyguesie).

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

### Mises en garde spéciales et Précautions pos

Avertissez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous prenez éte (ou êtes susceptibles) déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceintes d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR® 50 mg.

- Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la tête),
- Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées, en particulier si elles sont accompagnées de douleurs abdominales,
- Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent le volume d'urine et de sel peuvent conduire à une perte importante de liquide et de sel).



### Composition en substance active :

Losartan potassique ..... 50 mg.

**Excipients** q.s.p 1 comprimé pelliculé sécable.  
Excipient à effet notable : lactose.

AMM N° 510/15 DMP/21/NNP

### Indications

PREZAR® 50 mg  
• Pour traiter la  
• Pour pr'  
0,5g/100  
• Pos:  
l'angie  
pas été  
• Che  
réduit

**Poso:**  
Veuillez  
pharm:  
Les co:  
impéri:  
Veuillez:  
medeci:  
en fonc:

... et si vous prenez ...  
séable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, off

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour. La diminution de la pression artérielle atteint son maximum plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® 50 mg, comp. à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques type 2.

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments ou débloquants et les antihypertenseurs d'action couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants; Patients adultes insuffisants cardiaques)

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine, maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par ex., ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques très élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

# PREZAR® Losartan



Comprimés  
pelliculés  
sécables

30

Voie orale

bott U.3a.  
82 Allée des Cauquins - Ain Sefra - Cratébana  
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

P P V 8 2 0 H 7 3  
P F R 0 4 / 2 6  
L O T M 1 5 5 9

82,70



dose  
sécable



### Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
  - Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants d'ce médicament.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter la grossesse - voir rubrique "Grossesse".
  - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
  - Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez l'aloès.

### Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre médecin urgent ou l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement des yeux ou de la tête, difficultés à respirer).
- Ce n'est qu'un effet secondaire grave pouvant survenir chez presque tous les patients sous PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

### Fréquents :

- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion par des doses élevées de diurétiques).

- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle, faiblesse, fatigue, trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie), trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie), modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale, réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie), élévation de l'uree dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

### Peu fréquents :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Éruption [urticaire],
- Démangeaisons (prurit),
- Éruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

### Rares :

- Hypersensibilité,
- Angio-oedème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant purpura et engourdissement ou picotements [paresthesies], évanouissement [syncope]),
- Brûlures de cœur très rapides et irrégulières (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite.

### Fréquence indéterminée :

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleur de l'écoulement urinaire),
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hypertonatremie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grommement ou cloquement dans les oreilles,
- Troubles du goût (dyguesie).

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

### Mises en garde spéciales et Précautions pos

Avertissez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous prenez éte (ou êtes susceptibles) déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceintes d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR® 50 mg.

- Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la tête),
- Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées, en particulier si elles sont accompagnées de douleurs abdominales,
- Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent le volume d'urine et de sel peuvent conduire à une perte importante de liquide et de sel).



