

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8372

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ATBIB FOUNTIA

Date de naissance : 01/01/1966

Adresse : 7 Rue NASSIR ADDING Res AL Jourma RA

IN APP 17 Racine Maârif casablanca

Tél. : 0668466040 Total des frais engagés : 2184,00 DH

CMR EL IBRAHIMI Mohamed

5 bis Rue Ibnou Babik

Quartier Racine Maârif Casablanca

Tél. : 05 22 94 92 46 - Fax : 05 22 94 91 23

INPE : 91053193

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09/10/2023

Nom et prénom du malade : ATBIB FOUNTIA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : CMR EL IBRAHIMI Mohamed

Affection longue durée ou chronique : 5 bis Rue Ibnou Babik

Quartier Racine Maârif Casablanca

Tél. : 05 22 94 92 46 - Fax : 05 22 94 91 23

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Signature de l'adhérent(e)

INPE : 91053193

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/10/2023	nat Consultation	c> 300		<p><b>CMR EL IBRAHIMI Mohamed</b> 5 bis, Rue Ibraou Babik Quartier Racine Maârif - Casablanca Tel: 05 22 94 92 46 - Fax: 05 22 94 91 23</p> <p>INPE : 81053200</p>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharm. BENI BENI</i> ARMERIA PHARMACEUTIQUE 63 - 65 Bd. Yacoub El Mansour Casablanca Tél: 05 22 94 92 46 - Fax: 05 22 94 91 23	09/10/2023	384.80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>RADIOLOGIE SOCIETE DE</i> <i>Brahim Roudani</i> Brahim Roudani Tunis Tunisie	09/10/23	T.D.A. Radiologie	1500,00

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	35533411	11433553
B		

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



**CMR**  
EXPLORATION ET TRAITEMENT DES MALADIES  
RESPIRATOIRES DU SOMMEIL ET DU RONFLEMENT

**Consultations :**  
Pneumophysiologie  
Allergologie - Asthme  
Sommeil et ronflement  
Sevrage tabagique  
Réhabilitation respiratoire  
Oncologie

**Laboratoire de physiologie clinique**  
Pléthysmographie  
Spiromtrie - Oscilling  
Polysomnographie  
Gaz du sang artériel  
Epreuve d'effort cardio-respiratoire

**Endoscopie diagnostique et interventionnelle**  
Fibroscopie bronchique  
Bronchoscopie rigide  
Thoracoscopie

الدكتور محمد الibrاهيمي

Dr. Mohammed EL IBRAHIMI  
Pneumophysiologue

Casablanca le 09/10/2023

Madame ATBIB Fouzia

scanner en coupes fines : ADP mûédstinales et infiltrat thoracique  
gauche

Prendre rendez-vous sur : casasouffle@gmail.com

**AUDIOLOGIE Socrate**  
Angle Bt<sup>r</sup> El Ibrahimi Bouddi Rue  
Assia Lutjens Rue Afia 1<sup>e</sup> Casablanca  
tel : 0522 25 77 13 - 0522 25 73 1

CMR EL IBRAHIMI Mohamed  
5 bis, Rue Ibnou Babik  
Quartier Racine Casablanca  
Tél: 05 22 94 92 46 - Fax: 05 22 94 91 23

# RADIOLOGIE SOCRATE

FACTURE N°02594/23

CASA LE 09.10.23

Nom & prénom :  
ATBIB FOUZIA

Examens	Prix
T.D.M. thoracique	1500.00
TOTAL :	1500.00

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
Mille cinq cent dirhams.

Angle Bd Brahim Roudani et Rue Nassih Eddine-Résidence ANFA1  
Casa.0522.25.73.13-0522.25.75.05 Patente:35803986 TVA: 817743  
R.C. 79363 I.F. 01003328 CNSS:2626036 ICE : 001321320000087

*RADIOLOGIE SOCRATE*  
Angle Bd Brahim Roudani et Rue Nassih Eddine-Résidence ANFA1  
Casa.0522.25.73.13-0522.25.75.05 Patente:35803986 TVA: 817743  
R.C. 79363 I.F. 01003328 CNSS:2626036 ICE : 001321320000087



الدكتور محمد بلقاذه العباسي  
Dr. Mohammed BELCADI ABASSI

الدكتور جمال بناني  
Dr. Jamal BENNANI

CASABLANCA LE 09/10/2023

NOM : ATBIB  
PRENOM : FOUZIA  
MEDECIN TRAITANT : DR. EL IBRAHIMI M.

### T.D.M. Thoracique

#### \* Renseignements cliniques :

Adénopathies médiastinales avec infiltrats thoraciques gauches .

#### \* Technique :

Examen réalisé en coupes axiales fines de 1,25 mm jointives sans injection de produit de contraste .

#### \* Résultats :

- Les coupes axiales et les reconstructions en coupes fines permettent de mettre en évidence de façon bilatérale de multiples lésions nodulaires de tailles variables dont certaines calcifiées de situation essentiellement sous-pelurales .
- Ces nodules s'associent à deux placards tissulaires pré-scissuraux droit et gauche .
- Absence de foyer parenchymateux d'aspect évolutif visible .
- Absence d'infiltrats parenchymateux réticulaires .
- Absence d'image cavitaire ou de D.D.B.
- Présence d'un épanchement pleural droit de faible abondance.
- Présence d'adénopathies calcifiées hilaires bilatérales et des différentes chaînes médiastinales.
- Absence de collection ou d'épanchement médiastinal pathologique .

#### \* Au total :

T.D.M. thoracique mettant en évidence des nodules sous-pleuraux , des placards tissulaires pré-scissuraux et des adénopathies médiastinales de type séquellaires et d'aspects stables avec apparition d'un épanchement pleural droit de faible abondance.

### CONFRATERNELLEMENT

DR. M. BELCADI



**CMR**  
EXPLORATION ET TRAITEMENT DES MALADIES  
RESPIRATOIRES DU SOMMEIL ET DU RONFLEMENT

**Consultation**  
Pneumophysiologie  
Allergologie - Asthme  
Sommeil et ronflement  
Sevrage tabagique  
Réhabilitation respiratoire  
Oncologie

**Laboratoire de physiologie clinique**  
Pléthysmographie  
Spiromtrie - Oscilling  
Polysomnographie  
Gaz du sang artériel  
Epreuve d'effort cardio-respiratoire

**Endoscopie diagnostique et interventionnelle**  
Fibroscopie bronchique  
Bronchoscopie rigide  
Thoracoscopie

الدكتور محمد البراهيمي  
Dr. Mohammed EL IBRAHIMI  
Pneumophysiologue

Casablanca le 09/10/2023

Madame ATBIB Fouzia


139.50 + 2  
zylax 1/j x 10j (2boites ed 05)

45.80  
Cortancyl 20: 3cp le matinx 03j puis 2cp le matinx 05j

zolus 20: 1 l soir

30.00 + 2

Prendre rendez-vous sur : [casa.souffle@gmail.com](mailto:casa.souffle@gmail.com)



**CMR EL IBRAHIMI Mohamed**  
5 bis. Ave Idriss II Babik  
Quartier Racine Maârif - Casablanca  
Tel: 05 22 94 92 46 - Fax: 05 22 94 91 23

**Mr. BENNIS Zineb**  
**PHARMACIE YACOUB EL MAARIF**  
63 - 65 Bd. Hassan II - Casablanca  
Tel.: 0522 25 52 04 - Casablanca

LOT 224711  
EXP 10/25  
PPV 139DH50



Boîtes de 5, 7, 25 et 50 comprimés pelliculés

lgralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

-Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

-Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

-Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que ZYLAX® et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLAX® ?

#### 3- Comment prendre ZYLAX® ?

- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

#### 5- Comment conserver ZYLAX® ?

#### 6- Informations supplémentaires

#### 1- QU'EST-CE QUE ZYLAX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, code ATC: J01-MA-14.

ZYLAX® contient une substance active, la moxifloxacine, qui appartient au groupe des antibiotiques appelés les fluoroquinolones.

ZYLAX® agit en tuant les bactéries responsables des infections.

##### Indications thérapeutiques :

ZYLAX® est indiqué chez les patients âgés de 18 ans et plus pour traiter les infections bactériennes suivantes lorsqu'elles sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

ZYLAX® doit être utilisé pour traiter ces infections uniquement lorsque les antibiotiques habituels ne sont pas appropriés ou lorsqu'ils n'ont pas été efficaces :

- infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës),
- aggravations soudaines de l'inflammation chronique des voies respiratoires (exacerbations aiguës de bronchite chronique),
- infections des poumons (pneumonies) contractées en dehors de l'hôpital, à l'exception des cas sévères,
- infections gynécologiques légères à modérées de la femme (infections pélviennes), y compris les infections des trompes et les infections de la muqueuse utérine.

Traiter uniquement ces infections de l'appareil génital haut de la femme par ZYLAX® comprimé n'est pas suffisant; par conséquent, pour ce type d'infections, votre médecin vous prescrira un autre antibiotique, en association à ce médicament.

Ce médicament peut également vous être prescrit par votre médecin en relais de la forme intraveineuse lorsque les infections bactériennes suivantes ont montré une évolution favorable :

- infections des poumons (pneumonie) contractées en dehors de l'hôpital,
- infections de la peau et des tissus mous.

ZYLAX® 400 mg ne doit pas être utilisé pour initier un traitement dans les infections de la peau et des tissus mous ou dans les infections sévères des poumons.

#### 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYLAX® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Consultez votre médecin si vous n'êtes pas certain de faire partie des groupes de patients décrits ci-dessous.

##### Contre-indications :

Ne prenez jamais ZYLAX® 400 mg comprimés pelliculés, dans les cas suivants :

• si vous êtes allergique à la substance active, la moxifloxacine, à d'autres antibiotiques de la famille des

Lorsque ZYLAX® 400 mg, comprimé pelliculé est utilisé en relais d'un traitement débuté avec la forme intraveineuse de ce médicament, les durées de traitement recommandées sont :

infection des poumons (pneumonie) contractée en dehors de l'hôpital :

7-14 jours

La majorité des patients atteints de pneumonie ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX®, comprimé pelliculé dans les 4 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse.

Infections compliquées de la peau et des tissus mous :

7-21 jours

La majorité des patients atteints d'infections compliquées de la peau et des tissus mous ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX®, comprimé pelliculé dans les 6 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse. Il est important de respecter la durée de traitement même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre le médicament trop tôt, l'infection peut ne pas être complètement guérie, vous pouvez rechuter ou votre état peut s'aggraver. Un arrêt trop précoce peut favoriser une résistance bactérienne à cet antibiotique.

##### Fréquence d'administration

Ne pas dépasser la dose et la durée de traitement recommandées.

##### Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus d'un comprimé par jour comme cela vous a été prescrit, consultez immédiatement un médecin ou un pharmacien et, si possible, apportez tous les comprimés restants, l'emballage ou cette notice pour montrer au médecin ou au pharmacien ce que vous avez pris.

##### Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous avez oublié de prendre votre comprimé, vous devez le prendre dans la journée dès que vous vous en rendez compte. Si vous n'avez pas pris votre comprimé pendant une journée, prenez la dose normale (un comprimé) le lendemain. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

##### Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection peut ne pas être complètement guérie. Consultez votre médecin si vous souhaitez arrêter de prendre vos comprimés avant la fin du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus graves qui ont été observés durant un traitement par ZYLAX® sont énumérés ci-dessous :

Si vous remarquez

- un rythme cardiaque anormalement rapide (effet indésirable rare)
- une sensation subite de malaise ou un jaunissement du blanc des yeux, une coloration foncée des urines, des démangeaisons sur la peau, une tendance à saigner ou des troubles de la pensée ou de la vigilance (il peut s'agir des signes et symptômes d'une inflammation fulminante du foie susceptible d'entraîner une insuffisance hépatique potentiellement fatale (effet indésirable très rare, des décès ont été observés))
- des altérations de la peau ou des muqueuses, par exemple des cloques douloureuses dans la bouche/le nez ou au niveau du pénis/vagin (syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell) (effets indésirables très rares, potentiellement mortels)
- une inflammation des vaisseaux sanguins (se traduisant par des signes tels que des taches rouges sur votre peau, généralement sur les jambes, ou des douleurs articulaires) (effet indésirable très rare)

LOT 224711  
EXP 10/25  
PPV 139DH50



Boîtes de 5, 7, 25 et 50 comprimés pelliculés

lgralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

-Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

-Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

-Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que ZYLAX® et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLAX® ?

#### 3- Comment prendre ZYLAX® ?

- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

#### 5- Comment conserver ZYLAX® ?

#### 6- Informations supplémentaires

#### 1- QU'EST-CE QUE ZYLAX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, code ATC: J01-MA-14.

ZYLAX® contient une substance active, la moxifloxacine, qui appartient au groupe des antibiotiques appelés les fluoroquinolones.

ZYLAX® agit en tuant les bactéries responsables des infections.

##### Indications thérapeutiques :

ZYLAX® est indiqué chez les patients âgés de 18 ans et plus pour traiter les infections bactériennes suivantes lorsqu'elles sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

ZYLAX® doit être utilisé pour traiter ces infections uniquement lorsque les antibiotiques habituels ne sont pas appropriés ou lorsqu'ils n'ont pas été efficaces :

- infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës),
- aggravations soudaines de l'inflammation chronique des voies respiratoires (exacerbations aiguës de bronchite chronique),
- infections des poumons (pneumonies) contractées en dehors de l'hôpital, à l'exception des cas sévères,
- infections gynécologiques légères à modérées de la femme (infections pélviennes), y compris les infections des trompes et les infections de la muqueuse utérine.

Traiter uniquement ces infections de l'appareil génital haut de la femme par ZYLAX® comprimé n'est pas suffisant; par conséquent, pour ce type d'infections, votre médecin vous prescrira un autre antibiotique, en association à ce médicament.

Ce médicament peut également vous être prescrit par votre médecin en relais de la forme intraveineuse lorsque les infections bactériennes suivantes ont montré une évolution favorable :

- infections des poumons (pneumonie) contractées en dehors de l'hôpital,
- infections de la peau et des tissus mous.

ZYLAX® 400 mg ne doit pas être utilisé pour initier un traitement dans les infections de la peau et des tissus mous ou dans les infections sévères des poumons.

#### 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYLAX® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Consultez votre médecin si vous n'êtes pas certain de faire partie des groupes de patients décrits ci-dessous.

##### Contre-indications :

Ne prenez jamais ZYLAX® 400 mg comprimés pelliculés, dans les cas suivants :

• si vous êtes allergique à la substance active, la moxifloxacine, à d'autres antibiotiques de la famille des

Lorsque ZYLAX® 400 mg, comprimé pelliculé est utilisé en relais d'un traitement débuté avec la forme intraveineuse de ce médicament, les durées de traitement recommandées sont :

infection des poumons (pneumonie) contractée en dehors de l'hôpital :

7-14 jours

La majorité des patients atteints de pneumonie ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX®, comprimé pelliculé dans les 4 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse.

Infections compliquées de la peau et des tissus mous :

7-21 jours

La majorité des patients atteints d'infections compliquées de la peau et des tissus mous ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX®, comprimé pelliculé dans les 6 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse. Il est important de respecter la durée de traitement même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre le médicament trop tôt, l'infection peut ne pas être complètement guérie, vous pouvez rechuter ou votre état peut s'aggraver. Un arrêt trop précoce peut favoriser une résistance bactérienne à cet antibiotique.

##### Fréquence d'administration

Ne pas dépasser la dose et la durée de traitement recommandées.

##### Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus d'un comprimé par jour comme cela vous a été prescrit, consultez immédiatement un médecin ou un pharmacien et, si possible, apportez tous les comprimés restants, l'emballage ou cette notice pour montrer au médecin ou au pharmacien ce que vous avez pris.

##### Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous avez oublié de prendre votre comprimé, vous devez le prendre dans la journée dès que vous vous en rendez compte. Si vous n'avez pas pris votre comprimé pendant une journée, prenez la dose normale (un comprimé) le lendemain. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

##### Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection peut ne pas être complètement guérie. Consultez votre médecin si vous souhaitez arrêter de prendre vos comprimés avant la fin du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus graves qui ont été observés durant un traitement par ZYLAX® sont énumérés ci-dessous :

Si vous remarquez

- un rythme cardiaque anormalement rapide (effet indésirable rare)
- une sensation subite de malaise ou un jaunissement du blanc des yeux, une coloration foncée des urines, des démangeaisons sur la peau, une tendance à saigner ou des troubles de la pensée ou de la vigilance (il peut s'agir des signes et symptômes d'une inflammation fulminante du foie susceptible d'entraîner une insuffisance hépatique potentiellement fatale (effet indésirable très rare, des décès ont été observés))
- des altérations de la peau ou des muqueuses, par exemple des cloques douloureuses dans la bouche/le nez ou au niveau du pénis/vagin (syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell) (effets indésirables très rares, potentiellement mortels)
- une inflammation des vaisseaux sanguins (se traduisant par des signes tels que des taches rouges sur votre peau, généralement sur les jambes, ou des douleurs articulaires) (effet indésirable très rare)

# Cortancyl® 20 mg

Prednisone

45,80

SANOFI

de prendre  
ions

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable E DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utilisée dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires et allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Ne prenez jamais CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.

# ZOLUS® | 20 mg

30,00

prendre ce médicament car vous.

re. *chez l'enfant et l'adolescent*

in ou votre pharmacien.

Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

**Que contient cette notice ?**

- Qu'est-ce que ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Comment prendre ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons - code ATC : A02BC01

ZOLUS contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

**ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :**

### Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures,
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique),
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère,
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). ZOLUS peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS,
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

### Chez les enfants :

#### Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

#### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule :**

Si vous êtes allergique à l'omeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzoprazole, rabéprazole, ésoméprazole).

Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas ZOLUS. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ZOLUS.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ZOLUS.

ZOLUS peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre ZOLUS ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez

informez immédiatement

- Vous perdez du poids
- Vous avez des nausées
- Vous vomissez
- Vous avez des douleurs abdominales
- Vous souffrez d'une constipation
- Votre faible augmentation de tension
- Si vous avez des difficultés à uriner
- Vous devez faire des toilettes plus fréquemment

Si vous prenez ZOLUS, il surveillera probablement vos symptômes et éventuellement votre état de santé.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons peut entraîner une diminution de la densité osseuse dans la hanche, du poignet et des vertèbres (ostéoporose ou ostéoporose).

Si vous avez une ostéoporose, prévenez votre médecin. Il peut traiter avec un médicament contre l'ostéoporose.

### Enfants

Certains enfants peuvent développer des symptômes de long terme bien que les enfants de moins de 12 ans soient rarement atteints.

### Autres médicaments

Gélule

Informez votre médecin si vous prenez tout autre médicament ou si vous achetez sans ordonnance des médicaments et compléments alimentaires. Vous ne devez pas prendre ZOLUS si vous l'utilisez pour traiter une autre affection.

Vous devez informer votre médecin les médicaments suivants :

- Kétoconazole (utilisé pour le traitement de la candidose)
- Digoxine (utilisé pour traiter certaines maladies cardiaques)
- Diazepam (utilisé pour le sommeil)
- Phénytoïne (utilisé pour certains types de crises épileptiques)
- Médicaments anti-vitamines (utilisés pour empêcher l'arrêt de l'adrénaline)
- Rifampicine (utilisée pour traiter certaines maladies)
- Atazanavir (utilisé pour traiter le VIH)
- Tacrolimus (utilisé pour empêcher l'organisme d'attaquer les tissus sensibles)
- Millepertuis (utilisé pour traiter la douleur modérée)
- Cilostazol (utilisé pour traiter la maladie d'Angélique)
- Saquinavir (utilisé pour traiter le VIH)
- Clopidogrel (utilisé pour empêcher les malades de cœur de se déclencher)
- Erlotinib (utilisé pour traiter certains types de cancer)
- Méthotrexate (utilisé pour traiter certains types de cancer)

Si votre médecin vous prescrit ZOLUS, il doit temporairement arrêter de prendre la clarithromycine, car c'est un médicament important que vous prenez.

### ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule et boissons

Voir rubrique 3. Grossesse, allaitement et授乳

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous pouvez l'être, contactez votre médecin. Si vous êtes enceinte, il peut être nécessaire de prendre un autre médicament.

L'oméprazole est une substance qui peut influencer sur l'embryon. Votre médecin vous conseillera.

# ZOLUS® | 20 mg

30,00

prendre ce médicament car vous.

re. in ou votre pharmacien.

Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Comment prendre ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons - code ATC : A02BC01

ZOLUS contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

**ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :**

### Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures,
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique),
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère,
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). ZOLUS peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS,
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

### Chez les enfants :

#### Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

#### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule :**

Si vous êtes allergique à l'omeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzoprazole, rabéprazole, ésoméprazole).

Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas ZOLUS. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ZOLUS.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ZOLUS.

ZOLUS peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre ZOLUS ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez

informez immédiatement

- Vous perdez du poids
- Vous avez des nausées
- Vous vomissez
- Vous avez des douleurs abdominales
- Vous souffrez d'une constipation
- Votre faible augmentation de tension
- Si vous avez des maux de tête
- Si vous devez faire une opération

Si vous prenez ZOLUS, il surveillera probablement vos symptômes et éventuellement votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons peut entraîner une diminution de la densité osseuse dans la hanche, du poignet et des vertèbres (ostéoporose ou ostéoporose).

Si vous avez une ostéoporose, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament avec d'autres médicaments qui peuvent entraîner un effet indésirable tel que l'ostéoporose.

### Enfants

Certains enfants peuvent développer des symptômes de long terme bien que les enfants de moins de 12 ans soient rarement utilisés.

### Autres médicaments

Gélule

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament ou de faire une opération. Achetez sans ordonnance tous les médicaments et compléments alimentaires que vous prenez. Vous ne devez pas utiliser ce médicament pour traiter une affection que vous n'avez pas. Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien des médicaments suivants :

- Kétoconazole (utilisé pour traiter les mycoses)
- Digoxine (utilisé pour traiter les maladies cardiaques)
- Diazepam (utilisé pour le sommeil)
- Phénytoïne (utilisé pour votre maladie épileptique)
- Médicaments anti-vitamines (utilisés pour empêcher l'arrêt de l'adrénaline)
- Rifampicine (utilisée pour traiter certaines maladies)
- Atazanavir (utilisé pour traiter le VIH)
- Tacrolimus (utilisé pour empêcher l'immunité)
- Millepertuis (utilisé pour traiter la douleur modérée)
- Cilostazol (utilisé pour traiter la maladie d'angine de poitrine)
- Saquinavir (utilisé pour traiter le VIH)
- Clopidogrel (utilisé pour empêcher l'aggrégation des plaquettes)
- Erlotinib (utilisé pour traiter certaines maladies cancéreuses)
- Méthotrexate (utilisé pour traiter certaines maladies cancéreuses)

Si votre médecin vous prescrit ZOLUS, il doit être temporairement arrêté si vous prenez clarithromycine ou d'autres médicaments qui peuvent empêcher l'absorption de ZOLUS.

### ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule et boissons

Voir rubrique 3. Grossesse, allaitement et授乳

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous pouvez l'être, contactez votre médecin. Si vous êtes enceinte, il est important que vous continuiez à prendre ZOLUS pendant toute la durée de votre grossesse. Si vous prenez ZOLUS pendant toute la durée de votre grossesse, il est important que vous continuiez à prendre ZOLUS pendant toute la durée de votre grossesse.

L'oméprazole est une substance chimique qui peut influencer sur l'embryon. Votre médecin vous conseillera de prendre ZOLUS pendant toute la durée de votre grossesse.