

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0019758

Optique *PA9294* Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :	<i>8499</i>	Société :	<i>Ram Hamdi</i>
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	<i>Boemhamdi Driss</i>
Nom & Prénom :		<i>Boemhamdi Driss</i>	
Date de naissance :		<i>03/12/1963</i>	
Adresse :		<i>Résidence Al Bustane II, n° b 6, Apt 20, Ben Aoussi Casablanca</i>	
Tél. :		<i>0613856914</i>	Total des frais engagés : <i>1533,60</i> Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :	<i>Docteur Faraj Kaoutar Médecin Généraliste Tel : 05 22 73 25 17</i>
Date de consultation :	<i>09/10/2023</i>
Nom et prénom du malade :	<i>Boum Hamdi Hiba</i>
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	<i>Xy st fc</i>
Affection longue durée ou chronique :	<input type="checkbox"/> ALD <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> Pathologie
En cas d'accident préciser les causes et circonstances	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.	
Fait à :	<i>Carabassa</i>
Le :	<i>16/10/2023</i>
Signature de l'adhérent(e) :	



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/10/93	G3		150014	<p><i>Docteur Farid KAOUFI</i> <i>Médecin Généraliste</i> <i>Tél : 05 22 73 25 47</i></p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE LA MUSIQUE</i> 05 22 73 25 47	09/10/93	313.60

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS	
	H	25533412 21433552 00000000 00000000			
	D	00000000 00000000 35533411 11433553			
	G				
	B				
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
DATE DU DEVIS				DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur FARAJ Kaoutar



الدكتورة فراج كوتار

Ancien médecin interne hôpital Ibn Rochd

Ancien médecin interne hôpital Al Mansour

طبيبة داخلية سابقا بسمة بندر ابن رشد

طبيبة داخلية سابقا بسمة بندر المنصور

Ordonnance

Casablanca, le :

09/10/23

Hiba Boumhamdi.

- 1) Shingrix
Duphost am
Dop J Sud 6 au 25 J
L'encycl 3 mois (S.A.)
- 2) Neofloral Hay 40.
M. 1cp x 3 J (S.A.)
- 3) Dolipromine 1000
1cp x 2 J (S.A.)
- Docteur Faraj Kaoutar
Médecin Généraliste
0522 73 25 47

لا تغير تاريخ الفحص ولا التاريخ الموجود على أوراق التغاضدية

هي مباركة مجموعة 4 رقم 1 الطابق الأول . سيدى البرنوصي أمام محطة الحافلة 800 وقرب مقهى بلجيكا

Hay Mobaraka Gr 4 N°1, 1er Etg - Sidi Bernoussi - ☎ 0522 73 25 47

Dr. Faraj Kaoutar
Tunis, Al Bourguiba 14 MEDICAL
Tel : 05 22 74 19 30

4) ~~then~~
~~Biotone~~

~~Jamp x 3~~

~~S/L~~

~~Docteur Faraj Kaoutar
Médecin Généraliste
Tél: 05 22 73 25 47~~

~~383.6~~

~~Dr Faraj Kaoutar
Médecin Généraliste
Tél: 05 22 73 25 47
30~~



Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111.11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, providone K30, amidon de maïs préogélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Écoutez attentivement la rubrique " toxicologie ". Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants :
allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉC 1000 mg. COMPRIMÉ

Précautions Particulières
Si la douleur persiste plus
insuffisante ou de survenu-
l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave
médecin avant de prendre

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de
immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient des substances qui peuvent entraîner une dépendance. Ne les associer pas à d'autres substances qui peuvent entraîner une dépendance.

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les comprimés utilisés pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



NEOFORTAN® 40 mg

Comprimés effervescents pédiatriques
(Phloroglucinol dihydraté)

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

- Comprimés effervescents dosés à 40 mg : Boîte de 10

COMPOSITION QUALITATIVE

Principe actif :

Phloroglucinol dihydraté 40 mg

Excipients qsp 1 comprimé effervescent.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Le phloroglucinol est préconisé dans le traitement symptomatique des manifestations spasmodiques et douloureuses du tube digestif, des voies biliaires et des voies urinaires de l'enfant, et des coliques du nourrisson.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé par

- Hypersensibilité au Phloroglucinol.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE

VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPÉCIALES

L'association du Phloroglucinol avec la morphine ou ses dérivés doit être évitée.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES

MÉDICAMENTS, ET NOTAMMENT

morphine ou ses dérivés, IL FAUT SIGNER

AUTRE TRAITEMENT EN COURS

PHARMACIEN.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Enfant et nourrisson :

- Avant 6 ans : 6 mg/kg/j.

- A partir de 6 ans :

NEOFORTAN® 40 mg : 1 comprimé effervescent 3 à 4 fois/jour.

NEOFORTAN® 40 mg

PPU 40DH00

EXP 04/2026

LOT 31017 1

NEOFORTAN® 40 mg

10 comprimés effervescents



6 11800 032694

مخابر المستحضرات الصيدلانية لشمال إفريقيا - 21.
D'AFRIQUE DU NORD - 21, RUE DES OUDAYA - CASABLANCA - MAROC

ces médicaments. Si vous prenez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec un œstrogène dans le cadre d'un THS, les informations suivantes sont importantes. Veuillez lire également la notice qui accompagne votre médicament œstrogénique.

Ménopause précoce. Il existe peu de données sur les effets de ce

Duphaston[®] 10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogestérone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
3. Comment prendre ce médicament ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient une substance active appelée hydrogestérone.

La hydrogestérone est une hormone progestagène féminine. Les hormones progestagéniques ont le même effet que la progesterone naturelle. Elle régule avec les hormones œstrogénées le cycle menstruel.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour les problèmes que vous pourriez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progesterone :
 - contrôler le cycle menstruel irrégulier ;
 - croissance de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;
 - menstruations dououreuses ;
 - infertilité due à un faible niveau de progesterone ;
 - soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits lors d'un traitement de fécondation assistée.
 - limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

Thérapie hormonale de substitution (THS)

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des œstrogènes :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus lors du traitement des symptômes de la ménopause ;
- si vous avez cessé d'avoir vos menstruations avant la ménopause ;
- pour des menstruations exceptionnellement abondantes et / ou irrégulières.

Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de progestérone et d'œstrogène (autre hormone féminine). Si votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone, Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé compense et rétablit l'équilibre.

Votre médecin peut également vous demander d'utiliser des œstrogènes en plus de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. Cela dépend de la raison pour laquelle vous utilisez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Pour certaines femmes utilisant un traitement hormonal substitutif (THS), prendre seulement un œstrogène peut provoquer un épaissement anormal de la muqueuse utérine. Cela peut aussi être le cas si vous avez subi une ablation de l'utérus et avez des antécédents d'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus). Prendre Duphaston

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec ou sans nourriture.

Fertilité, grossesse et allaITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse : Il peut y avoir un risque accru d'une anomalie congénitale du pénis impliquant l'ouverture urinaire (hypospadias) chez les enfants dont les mères ont pris certaines progestatines. Cependant, ce risque accru n'a pas été clairement confirmé. Plus de 9 millions de femmes enceintes ont pris Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. A ce jour, aucune preuve n'indique que l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant la grossesse a un effet nocif.

AllaITEMENT : Ne prenez pas Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez. On ne sait pas si Duphaston passe dans le lait maternel et affecte l'enfant. Les études d'autres progestatines montrent que de petites quantités passent dans le lait maternel.

Fertilité : aucune preuve n'indique que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé diminue la fertilité, s'il est pris comme recommandé par votre médecin,

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir un peu somnolente ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. En particulier dans les premières heures après la prise. Si cela arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines. Attendez de voir comment vous affecte Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. Cela inclut les problèmes rares transmis dans les familles qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose, comme un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose.

3. Comment prendre ce médicament ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration :

- Avez le comprimé
- Vous pouvez prendre le comprimé avec ou sans nourriture.
- Si vous devez prendre le comprimé, les répartir sur la journée.
- Par exemple, prendre un comprimé à la fois, et un au soir.
- Essayez de prendre le comprimé à la même heure chaque jour afin d'être sûr d'avoir absorbé le comprimé.
- Cela vous aidera à mieux vous sentir.
- La ligne de séparation entre les deux moitiés du comprimé indique où il faut le diviser en deux demi-dosages égals.

Posologie :

Le nombre de comprimés que vous devrez prendre dépendra de ce qui est traité. Si vous avez des cycles menstruels naturels, le premier jour du cycle commence à la première menstruation. Si vous n'avez pas de cycles menstruels naturels, votre médecin vous recommandera comment prendre votre traitement.

Pour réguler votre cycle menstruel :

- Prenez 1 comprimé par jour à partir de la deuxième moitié de votre cycle jusqu'au premier jour de votre prochain cycle.
- La journée de début et le nombre de jours pendant lesquels vous prenez vos comprimés dépendront de la durée de votre cycle.

Pour traiter l'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus) :

- Prenez 1 à 3 comprimés par jour.
- Il vous sera demandé soit de prendre vos comprimés tous les jours de



Duphaston® 10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogestérone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
3. Comment prendre ce médicament ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient une substance active appelée hydrogestérone.

La hydrogestérone est une hormone progestagène féminine. Les hormones progestagénines ont le même effet que la progesterone naturelle. Elle régule avec les hormones œstrogénées le cycle menstruel.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour les problèmes que vous pourrez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progesterone :
 - contrôler le cycle menstruel irrégulier ;
 - croissance de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;
 - menstruations douloureuses ;
 - infertilité due à un faible niveau de progesterone ;
 - soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits lors d'un traitement de fécondation assistée.
 - limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

Thérapie hormonale de substitution (THS)

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des œstrogènes :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus lors du traitement des symptômes de la ménopause ;
- si vous avez cessé d'avoir vos menstruations avant la ménopause ;
- pour des menstruations exceptionnellement abondantes et / ou irrégulières.

Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de progesterone et d'œstrogène (autre hormone féminine). Si votre corps ne produit pas suffisamment de progesterone, Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé compense et rétablit l'équilibre.

Votre médecin peut également vous demander d'utiliser des œstrogènes en plus de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. Cela dépend de la raison pour laquelle vous utilisez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Pour certaines femmes utilisant un traitement hormonal substitutif (THS), prendre seulement un œstrogène peut provoquer un épaissement anormal de la muqueuse utérine. Cela peut aussi être le cas si vous avez subi une ablation de l'utérus et avez des antécédents d'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus). Prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant une partie de votre cycle mensuel permet d'éviter un épaissement de votre muqueuse utérine.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec ou sans nourriture.

Fertilité, grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse : Il peut y avoir un risque accru d'une anomalie congénitale du pénis impliquant l'ouverture urinaire (hypospadias) chez les enfants dont les mères ont pris certaines progestatifs. Cependant, ce risque accru n'a pas été clairement confirmé. Plus de 9 millions de femmes enceintes ont pris Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. À ce jour, aucune preuve n'indique que l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant la grossesse a eu un effet nocif.

Allaitement : Ne prenez pas Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez. On ne sait pas si Duphaston passe dans le lait maternel et affecte l'enfant. Les études d'autres progestatifs montrent que de petites quantités passent dans le lait maternel.

Fertilité : aucune preuve n'indique que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé diminue la fertilité, s'il est pris comme recommandé par votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir un peu somnolente ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. En particulier dans les premières heures après la prise. Si cela arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines. Attendez de voir comment vous affecte Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. Cela inclut les problèmes rares transmis dans les familles qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose, comme un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose -galactose.

3. Comment prendre ce médicament ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration :

- Avez le comprimé avec ...
- Vous pouvez prendre ...
- Si vous deve...
Par exe...
- Essaye...
d'être su...
Cela vou...
- La ligne d...
comprimé...
desos égal...
- 6 118000-010517
maphar
Km 6, route côtière n°11, Quartier industriel 2
Zarata, Ain Saba Casablanca - Maroc
DUPHASTON 10MG CP PEL B20 PPV. 840490 12
- ts nourriture.
à partir sur la journée.
le soir.
- dans votre corps.
- pour faciliter la prise du vos comprimés.
ne le divise pas en deux demi-

Posologie :

Le nombre de comprimés que vous prenez et les jours où vous les prenez dépendront de ce qui est traité. Si vous avez toujours des cycles menstruels naturels, le premier jour du cycle correspond au premier jour de saignement. Si vous n'avez pas de cycles menstruels naturels, votre médecin vous recommandera comment prendre votre traitement.

Pour réguler votre cycle menstruel :

- Prenez 1 comprimé par jour à partir de la deuxième moitié de votre cycle jusqu'au premier jour de votre prochain cycle.
- La journée de début et le nombre de jours pendant lesquels vous prenez vos comprimés dépendront de la durée de votre cycle.

Pour traiter l'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus) :

- Prenez 1 à 3 comprimés par jour.
- Il vous sera demandé soit de prendre vos comprimés tous les jours de votre cycle ou uniquement du 5^{me} au 25^{me} jour du cycle.

Pour les douleurs menstruelles :

Duphaston® 10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogestérone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
3. Comment prendre ce médicament ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient une substance active appelée hydrogestérone.

La hydrogestérone est une hormone progestagène féminine. Les hormones progestagénines ont le même effet que la progesterone naturelle. Elle régule avec les hormones œstrogénées le cycle menstruel.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour les problèmes que vous pourrez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progesterone :
 - contrôler le cycle menstruel irrégulier ;
 - croissance de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;
 - menstruations douloureuses ;
 - infertilité due à un faible niveau de progesterone ;
 - soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits lors d'un traitement de fécondation assistée.
 - limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

Thérapie hormonale de substitution (THS)

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des œstrogènes :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus lors du traitement des symptômes de la ménopause ;
- si vous avez cessé d'avoir vos menstruations avant la ménopause ;
- pour des menstruations exceptionnellement abondantes et / ou irrégulières.

Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de progesterone et d'œstrogène (autre hormone féminine). Si votre corps ne produit pas suffisamment de progesterone, Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé compense et rétablit l'équilibre.

Votre médecin peut également vous demander d'utiliser des œstrogènes en plus de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. Cela dépend de la raison pour laquelle vous utilisez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Pour certaines femmes utilisant un traitement hormonal substitutif (THS), prendre seulement un œstrogène peut provoquer un épaissement anormal de la muqueuse utérine. Cela peut aussi être le cas si vous avez subi une ablation de l'utérus et avez des antécédents d'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus). Prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant une partie de votre cycle mensuel permet d'éviter un épaissement de votre muqueuse utérine.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec ou sans nourriture.

Fertilité, grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse : Il peut y avoir un risque accru d'une anomalie congénitale du pénis impliquant l'ouverture urinaire (hypospadias) chez les enfants dont les mères ont pris certaines progestatifs. Cependant, ce risque accru n'a pas été clairement confirmé. Plus de 9 millions de femmes enceintes ont pris Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. À ce jour, aucune preuve n'indique que l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant la grossesse a eu un effet nocif.

Allaitement : Ne prenez pas Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez. On ne sait pas si Duphaston passe dans le lait maternel et affecte l'enfant. Les études d'autres progestatifs montrent que de petites quantités passent dans le lait maternel.

Fertilité : aucune preuve n'indique que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé diminue la fertilité, s'il est pris comme recommandé par votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir un peu somnolente ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. En particulier dans les premières heures après la prise. Si cela arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines. Attendez de voir comment vous affecte Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. Cela inclut les problèmes rares transmis dans les familles qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose, comme un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose -galactose.

3. Comment prendre ce médicament ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration :

- Avez le comprimé avec ...
- Vous pouvez prendre ...
- Si vous deve...
Par exe...
- Essaye...
d'être su...
Cela vou...
- La ligne d...
comprimé...
desos égal...
- 6 118000-010517
maphar
Km 6, route côtière n°11, Quartier industriel 2
Zarata, Ain Saba Casablanca - Maroc
DUPHASTON 10MG CP PEL B20 PPV. 840490 12
- ts nourriture.
à partir sur la journée.
le soir.
- dans votre corps.
- pour faciliter la prise du vos comprimés.
ne le divise pas en deux demi-

Posologie :

Le nombre de comprimés que vous prenez et les jours où vous les prenez dépendront de ce qui est traité. Si vous avez toujours des cycles menstruels naturels, le premier jour du cycle correspond au premier jour de saignement. Si vous n'avez pas de cycles menstruels naturels, votre médecin vous recommandera comment prendre votre traitement.

Pour réguler votre cycle menstruel :

- Prenez 1 comprimé par jour à partir de la deuxième moitié de votre cycle jusqu'au premier jour de votre prochain cycle.
- La journée de début et le nombre de jours pendant lesquels vous prenez vos comprimés dépendront de la durée de votre cycle.

Pour traiter l'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus) :

- Prenez 1 à 3 comprimés par jour.
- Il vous sera demandé soit de prendre vos comprimés tous les jours de votre cycle ou uniquement du 5^{me} au 25^{me} jour du cycle.

Pour les douleurs menstruelles :