

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0019755

179296

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

8499

Société :

R.A.M Handlig

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Boumhamdi Driss

Date de naissance :

03-12-1963

Adresse :

Résidence AL Boustane II, Jnd 6, App 90 BERNARD Cours Thalca

Tél. :

0613856914

Total des frais engagés : 2.326,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Faraj Kaoutar
Médecin Gér.éraliste
Tél : 05 22 73 25 17

Date de consultation :

02/10/23

Nom et prénom du malade :

DAIF Faraj

Age : 58 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Diabète, hypertension

Affection longue durée ou chronique :

ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 17/01/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Faraj

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des honoraires
02/10/13	C3		150 DH	Docteur Faraj Kabouti Médecin Gér. ér. 11 Tél. 05 22 75
09/10/13	Contrôle			Docteur Faraj Kabouti Médecin Gér. ér. ér. 11

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	09/10/23	1616,30

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur FARAJ Kaoutar



الدورة في اتجاه الورم

Ancien médecin interne hôpital Ibn Rochd
Ancien médecin interne hôpital Al Mansour

طبيبة داخلية سابقاً بسمة شفي إبن رشد
طبيبة داخلية سابقاً بسمة شفي المنصور

Ordonnance

Casablanca, le :

09/10/23

Dai f

Fouzia

For xigq

3 mois



Docteur Boudreau
Médecin généraliste
Télé: 36 22 73 25

2) Leptorrhynchus

2 months

69.0 1cp 800i (35)

3

3) Verlinnen zusammen ?

لا تغير تاريخ الشخص ولا التاريخ الموجود على أوراق التأمينية

حي مباركة مجموعة 4 رقم 1 الطبية انollow . سيدى البرنوسي أمام محطة الحافلة 800 وقرب مقهى بلجيكا

Hay Mobaraka Gr 4 N°1, 1er Etg - Sidi Bernoussi - ☎ 0522 73 25 47

16/11/30



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليلات الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Yafa

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 04-10-2023

Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 2310020060

Prescripteur : Dr FARAJ KAOUTAR

Page : 1/5

HEMATOCYTOLOGIE

Hemogramme

		11-07-2023
Hématies :	5.10 M/mm3	(4.00-5.30) 5.06
Hémoglobine :	14.3 g/dL	(12.5-15.5) 14.4
Hématocrite :	44.0 %	(37.0-46.0) 43.7
-VGM :	86.3 fL	(80.0-95.0) 86.4
-TCMH :	28.0 pg	(28.0-32.0) 28.5
-CCMH :	32.5 g/dL	(30.0-35.0) 33.0
Leucocytes :	10 010 /mm3	(4 000-10 000) 12 560
Polynucléaires Neutrophiles :	59.5 %	(40.0-75.0) 63.4
Soit:	5 956 /mm3	(2 000-7 500) 7 963
Polynucléaires Eosinophiles :	1.0 %	(1.0-4.0) 1.2
Soit:	100 /mm3	(100-400) 151
Polynucléaires Basophiles :	0.6 %	(0.0-1.0) 0.6
Soit:	60 /mm3	(0-100) 75
Lymphocytes :	33.0 %	(20.0-45.0) 29.1
Soit:	3 303 /mm3	(1 500-4 000) 3 655
Monocytes :	5.9 %	(2.0-8.0) 5.7
Soit:	591 /mm3	(200-800) 716
Plaquettes :	316 000 /mm3	(160 000-350 000) 406 000
(Cytométrie en flux XT2000Sysmex)		
IDP	12.2 fL	(9.0-14.0) 11.4
VPM	10.1 fL	(8.0-12.0) 9.6
P-RGC	25.6 %	(12.0-35.0) 23.2

Vitesse de sédimentation

		11-07-2023
VS 1ère heure	17 mm	(<10) 18
VS 2ième heure	40 mm	(<20) 40

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafofa@hotmail.com

Laboratoire d'Analyses Médicales Yafa
 Dr EL KHAFFI Amal
 Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54
 Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
 Tel.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39

Validé par : Dr Amal EL KHAFFI



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 04-10-2023

Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 2310020060

Prescripteur : Dr FARAJ KAOUTAR

Page : 2/5

BIOCHIMIE URINAIRE

02-02-2023

Diurèse des 24h

Sous réserve d'un bon recueil des urines

1.14 litres / 24h

1.20

Créatinine urinaire

1 067.9 mg/l

(280.0-2 170.0)

755.0

94.0 mmol/l

(24.6-191.0)

Créatinine urinaire de 24h

1 217 mg/ 24h

(740-1 570)

(Dosage cinétique Cobas C311)

107.1 mmol/24H

(65.1-138.2)

906

Clairance de la créatinine mesurée
(DFG)

120.52 ml/min

(>60.00)

93.53

02-02-2023

Interprétation:

- Insuffisance rénale modérée : 30 - 60 mL/min
- Insuffisance rénale sévère : 15 - 30 mL/min
- En attente de dialyse prochaine: 10-15 mL/min
- En cours de dialyse: <10 mL/min

Validé par : Dr. Amal EL KHAFFI

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAFFI Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54
Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca

Horaires : 07h30 - 17h00 / Samedi : 07h30 - 13h

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Yafa

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د.أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 04-10-2023

Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 2310020060

Prescripteur : Dr FARAJ KAOUTAR

Page : 3/5

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE


11-07-2023

Glycémie à jeun
(Hexokinase G6PD-H Cobas C311)

1.21 g/L
6.72 mmol/L

(0.65-1.10)
(3.61-6.11)

1.19



Urée
(Enzymatique Cobas C311)

0.33 g/l
5.50 mmol/l

(0.20-0.50)
(3.33-8.33)

0.27

Créatinine
(Cinétique Cobas C311)


7.0 mg/L
62.0 μ mol/L

(5.0-11.0)
(44.3-97.4)

7.5

28-04-2023

11-07-2023



HbA1c
(HPLC-TOSOH)

6.7 %

(4.0-6.0)

6.8

11-07-2023

Laboratoire d'Analyses Médicales Yafa
Dr EL KHAFFI Amal
Bd Mbarek Ben Bousra Hammadi N° 52-54
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Horaires continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Mousbara Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د.أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023
Edition : 04-10-2023


Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 2310020060

Prescripteur : Dr FARAJ KAOUTAR

Page : 4/5


<6:Niveau non diabétique
<7:Equilibré
>8:Action à entreprendre



Cholestérol total
(colorimétrique Cobas C311)

11-07-2023
1.90 g/L
4.91 mmol/L
(1.54-2.01)
(3.98-5.20)

1.56



HDL-Cholestérol
(Enzymatique Cobas C311)

11-07-2023
0.56 g/L
1.45 mmol/L
(0.46-0.65)
(1.19-1.68)

0.57

LDL-Cholestérol (direct)
(Enzymatique Cobas C311)

11-07-2023
1.08 g/L
2.79 mmol/L
(<1.00)
(<2.59)

0.76

Indications du traitement médical selon les recommandations de l'AFFSAPS:

- En l'absence de facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 2,20 g/l (5,7 mmol/l) ;
- En présence d'un facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,90 g/l (4,9 mmol/l) ;
- En présence de deux facteurs de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,60 g/l (4,1 mmol/l) ;
- En présence de plus de deux facteurs de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,30 g/l (3,4 mmol/l) ;
- En présence d'antécédents de maladie cardiovasculaire avérée ou de risques équivalents, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1 g/l (2,6 mmol/l).

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAIF Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
72 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Validé par : Dr Amal EL KHAIF



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 02-10-2023

Edition : 04-10-2023

Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 2310020060

Prescripteur : Dr FARAJ KAOUTAR

Page : 5/5

11-07-2023


Triglycérides

(Enzymatique Cobas C311)

1.81 g/l
2.06 mmol/l

(<1.50)
(<1.71)

1.49



Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyaifa@hotmail.com

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAEIF Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
Tél. : 05 22 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

Validé par : Dr Amal EL KHAEIF

Docteur FARAJ Kaoutar



Ancien médecin interne hôpital Ibn Rochd

Ancien médecin interne hôpital Al Mansour

الدكتورة فراج كوتار

طبيبة داخلية سابقاً بمستشفى ابن رشد

طبيبة داخلية سابقاً بمستشفى المنصور

Ordonnance

Casablanca le: 21/10/23

Daif Fouzqa.

- 1) Glycémie, HbA1C
- 2) Cholestérol TG, HDL, LDL
- 3) Uri, Acide urique
- 4) DFG, NFS, US

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAFFI Amal
Bd Mbarek Ben Bousra Hammoud N°52-54
Hay Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca
Tél: 05 22 73 25 47 Fax: 05 22 76 84 39

Docteur Faraj Kaoutar
Médecin Généraliste
Tél: 05 22 73 25 47

لا تغير تاريخ الفحص ولا التاريخ الموجود على أوراق التغذية

حي مباركة، مجموعة 4 رقم 1 الطابق الأول سيدى البرنوصي - أمام محطة الحافلة 800 و قرب مقهى بلجيكي

Hay Mobaraka Gr 4 N°1, 1er Etg - Sidi Bernoussi - 05 22 73 25 47



مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFA
BIOCHIMIE-HEMATOLOGIE-MICROBIOLOGIE-IMMUNOLOGIE-HORMONOLOGIE

Laboratoire Autorisé N°: 26050

Dr. Amal KHAFIF

د. أمال الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Patente : 31606078-IF : 53000550-CNSS : 2064872-ICE : 001540529000093

FACTURE N° : 231000048

Casablanca le 02-10-2023

Mme DAIF Fouzia

Demande N°: 2310020060

Date de l'examen : 02-10-2023

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Clé	Clé	Total
PS	Prélèvement	E10	E	10.00 MAD
B106	Cholestérol total	B30	B	34.50 MAD
B118	Glycémie	B30	B	34.50 MAD
B119	Hémoglobine glycosylée	B100	B	115.00 MAD
B216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B	92.00 MAD
B134	Triglycérides	B50	B	57.50 MAD
B135	Urée	B30	B	34.50 MAD
B223	Vitesse de sédimentation	B30	B	34.50 MAD
B110	Cholestérol HDL+LDL	B80	B	92.00 MAD
B205	Clearance: de la créatinine	B50	B	57.50 MAD
BB100	Créatinine	B0	B	0.00 MAD
	Diurèse des 24 heures (litres)	B0	B	0.00 MAD
B170	Créatinine	B30	B	gratuit
Total				562.00 MAD

Total des B : 480

Total dossier: 562.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :
cinq cent soixante-deux dirhams

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAFFIF Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N°52-54
Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
Tél : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39

INPE
093003440

تاریخ اجراء التحاليل

غير قبل للتغير

أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة: 18:30-7:30/السبت: 14:00-7:30 أخذ العينات بالموعد

Horaire continu : du lundi au vendredi : 7h30-18h30/Samedi : 7h30-14h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N°52-54 Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi -Casablanca-
Tél : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 E-mail : laboyafa@hotmail.com

Maphar
Bd Alkamilia N° 6, QI,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Forxiga 10 mg cp pell b28
P.P.V : 419,00 DH

9 116001 185023

P101325

١٠ قلوي
فروكسيجا®
٥ قلوي
فروكسيجا®



Forxiga® 5mg
Forxiga® 10mg



Comprimés
pelliculés
dapagliflozine

P101325

pellicules
Comprimés
Forxiga® 10mg
Forxiga® 5mg

فوريكسiga®

5 ملخ

فوريكسiga®

10 ملخ

P101325

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Ql.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Forxiga 10 mg cp pell b28
P.P.V : 419,00 DH



6118001 185023

6 118001 185023
SIDI Bérmoussi, Casablanca
P.P.V.: 419,00 DH
Forxiga 10 mg CP pel 628
Bd Alrimia N°6, QL.
Maphar



P101325

١٠ ملجم (٥)
٥ ملجم (٥)



Forxiga® 5mg
Forxiga® 10mg
Comprimés
pelliculés
dapagliflozine

P101325



Gélule
Voie orale

Kalmaner

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Valeriana officinalis L (extrait sec).....100 mg
Crataegus oxyacantha L (extrait sec).....100 mg
Passiflora incarnata L (extrait sec).....100 mg
Lavanda angustifolia (extrait sec).....50 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Gélule

Boite de 15 / Boite de 30

PROPRIETES

Kalmaner contient des actifs d'origine végétale ayant prouvé leur efficacité dans les états d'agitation, stress, nervosité et insomnies.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Prendre 2 gélules trois fois par jour à avaler avec un grand verre d'eau en complément d'une alimentation variée et équilibrée

Ne pas dépasser la dose recommandée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas utiliser chez l'enfant moins de 12 ans.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

A CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS.

GARDER AU SECHEUR DES ENFANTS



Numéro de lot : DA20181805318DMP/20UCAV1

Deva
Pharmaceutique

146-147 Zone industrielle Tit Mellil, Casablanca

IMPRIMEPEL 07/22 Code : AC2 - 00063

ZENmag® sirop

forme et présentation :

- sirop, flacon de 150 ml

Analyse moyenne	Actif en mg / 15 ml	AJR * 15 ml
I Fluide de Mélisse	381,2 mg	
Magnésium	150 mg	50 %
Vit B6	2 mg	100 %

*Apport Journalier recommandé

Propriétés Nutritionnelles :

ZENmag® Sirop est composé d'un magnésium organique le GIVOMAG™, la vitamine B6 et la mélisse. Le GIVOMAG™ est le magnésium le mieux toléré par l'organisme et dont l'absorption est supérieure aux autres magnésiums. Son association à la vitamine B6 et à la mélisse potentialise l'action relaxante et participe au fonctionnement normal du système nerveux.

Conseils d'utilisation :

- Stress, nervosité et anxiété
- Etats de fatigues psychiques
- Troubles du sommeil

Agiter avant utilisation.

1 à 3 cuillerées à café par jour.

Précautions d'utilisation :

- Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.
- Contient une source de phénylalanine
- Ne dispense pas d'une alimentation équilibrée
- Tenir hors de portée des enfants

Fabriqué par Laboratoire Pileje

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament

زينماك® شراب

المميزات : زينماك® شراب يتألف من المغذريوم العضوي (Givomag™) فيتامين ب 6 وميليسا. يعتبر جيفوماك المغذريوم الأكتر والأشعر اشتغالاً والذي له حماية كافية، مزجه مع فيتامين ب 6 وميليسا يعمل على الاسترخاء ويشارك في الأداء الطبيعي للجهاز العصبي.

تحذيرات الاستعمال :

- بمجرد فتح الفارورة، يجب استخدامها في الشهر نفسه.
- - يحتوي على مصدر الفنيلالاتين.
- لا تستغني عن اتباع نظام غذائي متوازن.
- يبعد عن متناول الأطفال.

مكمل غذائي وليس بدواء

تم صنعه من قبل « بيلاج »

بوزع من قبل « راموفارم »

الشكل والتقديم : شراب قلرورة من 150 مل. التركيب : ماء، الجليسرين، المتفنسوم غليسروفوسفات، الفلوريد مليسا، حامض السوبيك مونوهيدرات، صمغ أكاسيازتران، سوربات البوتاسيوم، بنزوات الصوديوم، بريدوكسين كلوريدرات، نكهة الكراميل.

نصائح الاستعمال :

- التوتر، العصبية والقلق.
- التعب النفسي.
- اضطرابات النوم.

يخص قبل الاستخدام

من ملعقة واحدة إلى 3 ملاعق صغيرة في اليوم

ZENmag® syrup

Pack size and presentation:

Syrup. Bottle of 150 ml.

Composition:

Water, glycerin, Magnesium Glycerophosphate (Givomag™), citric acid

ZENMAG® 32 GELULES




6

111255 810468

Advice for usage:

- Stress and anxiety
- Psychological and physical illnesses
- Sleeping troubles

1 in 3 teaspoons, a day



syrup should be taken in the morning.

Take a balanced diet.

Produced by Pileje Industrie
Distributed by Ramo-Pharm
This product is not a medicine.

Liptorva®

10 mg - 20 mg - 40 mg
Atorvastatine anhydre
Comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Liptorva®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Liptorva®, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre Liptorva®, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Liptorva®, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Liptorva®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Classe pharmacothérapeutique

Liptorva® appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

Indications thérapeutiques

Liptorva® est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, Liptorva® peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Liptorva®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucs, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Liptorva®, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des composants de ce médicament.

Liptorva® 20 mg
Boite de 28 comprimés pelliculés

6 118000 095033

ir dans le

kétoconazole, l'itraconazole, le voriconazole, le fluconazole, le posaconazole, la rifampicine, l'acide fusidique ;
• d'autres médicaments utilisés pour réguler les taux de lipides, tels que le gemfibrozil, d'autres fibrates ou le colestipol ; certains inhibiteurs calciques utilisés en cas d'angine de poitrine ou d'hypertension artérielle, tels que l'amiodipine, le diltiazem ; ou des médicaments utilisés pour contrôler le rythme cardiaque, tels que la digoxine, le vérapamil ou l'amiodarone ;

- le létrémovir, un médicament utilisé pour prévenir les infections dues au cytomégalovirus ;
- des médicaments utilisés pour le traitement de l'infection au VIH, tels que le ritonavir, le lopinavir, l'atazanavir, l'indinavir, le darunavir, l'association tripanavir/ritonavir, etc. ;
- certains médicaments utilisés pour le traitement de l'hépatite C, tels que le télaprévir, le bocaprévir et l'association elbasvir/grazoprevir ;
- d'autres médicaments connus pour interagir avec l'atorvastatine tels que l'ézetimibe (qui diminue le cholestérol), la warfarine (qui diminue la coagulation sanguine), les contraceptifs oraux, le stirenoïd (un anticonvulsant utilisé pour le traitement de l'épilepsie), la cimétidine (utilisée pour les brûlures d'estomac et les ulcères d'estomac), la phénazone (un antidouleur), la colchicine (utilisée pour le traitement de la goutte) et les antiacides (contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisés pour soulager les problèmes d'estomac) ;

- des médicaments obtenus sans prescription médicale : le millepertuis ;
- si vous devez prendre de l'acide fusidique par voie orale pour traiter une infection bactérienne, vous devrez arrêter temporairement d'utiliser ce médicament. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre Liptorva® en toute sécurité. L'association d'atorvastatine avec l'acide fusidique peut, dans de rares cas, conduire à une faiblesse musculaire, une sensibilité ou une douleur musculaire (rhabdomyolyse). Voir plus d'informations concernant la rhabdomyolyse dans la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

Liptorva®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Voir également la rubrique 3 « Comment prendre Liptorva, comprimé pelliculé ? » relative aux instructions sur la façon de prendre Liptorva®. Vous devez prendre en compte les informations suivantes :

Jus de pamplemousse

Ne consommez pas plus d'un ou deux petits verres de jus de pamplemousse par jour, car de grandes quantités de jus de pamplemousse peuvent modifier les effets de Liptorva®.

Alcool

Évitez de boire trop d'alcool lors de votre traitement par ce médicament. Pour plus d'informations voir également la rubrique 2 « Avertissements et précautions ».

Grossesse et allaitement

• êtes enceinte ou tentez de l'être.
• êtes en âge d'avoir des enfants.
• Je de contraception fiable.
• allaitez.

rvastatine pendant la grossesse
re été établie. Demandez conseil
harmacien avant de prendre tout

Conduire de machines et utilisation de machines

Ce médicament n'affecte normalement pas votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Cependant, ne conduisez

de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer, pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques, faiblesse musculaire, sensibilité douloureuse, douleur ou rupture musculaires ou coloration rouge-brun de l'urine associée à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématoques peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible, syndrome lupique (incluant éruption cutanée, troubles articulaires et effets sur les cellules sanguines).

Autres effets indésirables éventuels de l'atorvastatine

Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

Inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez, réactions allergiques, augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang, maux de tête, nausées, constipation, flatulence, indigestion, diarrhée, douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos, résultats d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie.

Peu fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100

Anorexie (perte d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie), cauchemars, insomnie, sensations vertigineuses, engourdissement ou picotements dans les doigts et les orteils, diminution de la sensibilité à la douleur ou au toucher, modification du goût, perte de mémoire, vision floue, bourdonnements d'oreilles et/ou de tête, vomissements, éruption, douleur abdominale haute et basse, pancréatite (inflammation du pancréas provoquant des maux d'estomac), hépatite (inflammation du foie), éruptions et démangeaisons cutanées, urticaire, perte de cheveux, douleur dans le cou, fatigue musculaire, fatigue, sensation de malaise, faiblesse, douleur dans la poitrine, gonflement en particulier des chevilles (œdèmes), augmentation de la température, présence de globules blancs dans les urines.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

Troubles visuels, saignement ou ecchymose inattendu, jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux), lésion des tendons.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

Une réaction allergique : les symptômes peuvent inclure une respiration bruyante, une douleur ou oppression dans la poitrine, un gonflement de la paupière, du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, une difficulté à respirer, une perte de conscience, perte d'audition, gynécomastie (augmentation de la taille de la poitrine chez l'homme).

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

• Faiblesse musculaire constante.

• Effets indésirables éventuels rapportés avec certaines statines (médicaments du même type) : Troubles sexuels, dépression,

Liptorva®

10 mg - 20 mg - 40 mg
Atorvastatine anhydre
Comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Liptorva®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Liptorva®, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre Liptorva®, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Liptorva®, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Liptorva®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Classe pharmacothérapeutique

Liptorva® appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

Indications thérapeutiques

Liptorva® est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, Liptorva® peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Liptorva®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucs, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Liptorva®, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des composants de ce médicament.

Liptorva® 20 mg
Boite de 28 comprimés pelliculés

6 118000 095033

ir dans le

kétoconazole, l'itraconazole, le voriconazole, le fluconazole, le posaconazole, la rifampicine, l'acide fusidique ;
• d'autres médicaments utilisés pour réguler les taux de lipides, tels que le gemfibrozil, d'autres fibrates ou le colestipol ; certains inhibiteurs calciques utilisés en cas d'angine de poitrine ou d'hypertension artérielle, tels que l'amiodipine, le diltiazem ; ou des médicaments utilisés pour contrôler le rythme cardiaque, tels que la digoxine, le vérapamil ou l'amiodarone ;

- le létrémovir, un médicament utilisé pour prévenir les infections dues au cytomégalovirus ;
- des médicaments utilisés pour le traitement de l'infection au VIH, tels que le ritonavir, le lopinavir, l'atazanavir, l'indinavir, le darunavir, l'association tripanavir/ritonavir, etc. ;
- certains médicaments utilisés pour le traitement de l'hépatite C, tels que le télaprévir, le bocaprévir et l'association elbasvir/grazoprevir ;
- d'autres médicaments connus pour interagir avec l'atorvastatine tels que l'ézetimibe (qui diminue le cholestérol), la warfarine (qui diminue la coagulation sanguine), les contraceptifs oraux, le stirentadol (un anticonvulsivant utilisé pour le traitement de l'épilepsie), la cimétidine (utilisée pour les brûlures d'estomac et les ulcères d'estomac), la phénazone (un antidouleur), la colchicine (utilisée pour le traitement de la goutte) et les antiacides (contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisés pour soulager les problèmes d'estomac) ;

- des médicaments obtenus sans prescription médicale : le millepertuis ;
- si vous devez prendre de l'acide fusidique par voie orale pour traiter une infection bactérienne, vous devrez arrêter temporairement d'utiliser ce médicament. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre Liptorva® en toute sécurité. L'association d'atorvastatine avec l'acide fusidique peut, dans de rares cas, conduire à une faiblesse musculaire, une sensibilité ou une douleur musculaire (rhabdomyolyse). Voir plus d'informations concernant la rhabdomyolyse dans la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

Liptorva®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Voir également la rubrique 3 « Comment prendre Liptorva, comprimé pelliculé ? » relative aux instructions sur la façon de prendre Liptorva®. Vous devez prendre en compte les informations suivantes :

Jus de pamplemousse

Ne consommez pas plus d'un ou deux petits verres de jus de pamplemousse par jour, car de grandes quantités de jus de pamplemousse peuvent modifier les effets de Liptorva®.

Alcool

Évitez de boire trop d'alcool lors de votre traitement par ce médicament. Pour plus d'informations voir également la rubrique 2 « Avertissements et précautions ».

Grossesse et allaitement

• êtes enceinte ou tentez de l'être.
• êtes en âge d'avoir des enfants.
• Je de contraception fiable.

• allaitez.
• rvestatine pendant la grossesse
re été établie. Demandez conseil
larmacien avant de prendre tout

Conduire de machines / utilisation de machines

Ce médicament n'affecte normalement pas votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Cependant, ne conduisez

de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer, pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques, faiblesse musculaire, sensibilité douloureuse, douleur ou rupture musculaires ou coloration rouge-brun de l'urine associée à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématoques peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible, syndrome lupique (incluant éruption cutanée, troubles articulaires et effets sur les cellules sanguines).

Autres effets indésirables éventuels de l'atorvastatine

Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

Inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez, réactions allergiques, augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang, maux de tête, nausées, constipation, flatulence, indigestion, diarrhée, douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos, résultats d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie.

Peu fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100

Anorexie (perte d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie), cauchemars, insomnie, sensations vertigineuses, engourdissement ou picotements dans les doigts et les orteils, diminution de la sensibilité à la douleur ou au toucher, modification du goût, perte de mémoire, vision floue, bourdonnements d'oreilles et/ou de tête, vomissements, éruption, douleur abdominale haute et basse, pancréatite (inflammation du pancréas provoquant des maux d'estomac), hépatite (inflammation du foie), éruptions et démangeaisons cutanées, urticaire, perte de cheveux, douleur dans le cou, fatigue musculaire, fatigue, sensation de malaise, faiblesse, douleur dans la poitrine, gonflement en particulier des chevilles (œdèmes), augmentation de la température, présence de globules blancs dans les urines.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

Troubles visuels, saignement ou ecchymose inattendu, jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux), lésion des tendons.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

Une réaction allergique : les symptômes peuvent inclure une respiration bruyante, une douleur ou oppression dans la poitrine, un gonflement de la paupière, du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, une difficulté à respirer, une perte de conscience, perte d'audition, gynécomastie (augmentation de la taille de la poitrine chez l'homme).

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

• Faiblesse musculaire constante.

• Effets indésirables éventuels rapportés avec certaines statines (médicaments du même type) : Troubles sexuels, dépression,