RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'H., Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Déclaration de Maladie
M23-010835

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2102 Société : 179573
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : LAHLOU KASSI FOUD
 Date de naissance : 15/07/1952
 Adresse : 19 Rue Lohem El Arjoune Casablanca
 Tél. : 06 55042456 Total des frais engagés : 1537,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. Siham IDRISSE ABOU LAHJOUL
 Spécialiste : Endocrinologie
 Diabétologie - Nutrition - Obésité
 49, Bd 2 Mars - Casablanca
 Tél : 05 22 22 22 41 : 05 22 22 44 48
 GSM : 06 15 53 74 27
 Date de consultation : 18 / 10 / 2023
 Nom et prénom du malade : LAHLOU KASSI FOUD Age : 71
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : Diabète
 Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 18 / 10 / 2023
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/10/23	Ce		300,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	17/10/23	257,90

ANALYS

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Designation des Coefficients	Montant des Honoraires
	18/10/23	5710	980,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient									
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>								
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>								
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>								
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>								
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">H</th> <th style="width: 50%;">G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25533412 00000000</td> <td style="text-align: center;">21433552 00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000 35533411</td> <td style="text-align: center;">00000000 11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">B</th> </tr> </tbody> </table>			H	G	25533412 00000000	21433552 00000000	00000000 35533411	00000000 11433553	B		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	H	G										
	25533412 00000000	21433552 00000000										
	00000000 35533411	00000000 11433553										
	B											
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				DATE DU DEVIS <input type="text"/>								
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>								

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur SIHAM IDRISSE ABOULAHJOUL

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie
et Maladies Métaboliques

Diplômée de Paris:

Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Endocrinologie et Métabolisme

Diplôme de Thyroïdologie

Diplôme de Nutrition et Diététique

Capacité de traitement par pompe à insuline, Insulinothérapie fonctionnelle

Diabète - Cholestérol - Hypertension artérielle - Hyper et hypocalcémie

Hormones - troubles et retard de croissance et de puberté

Thyroïde - Goitre - Hypophyse - Surrénales

Trouble du cycle menstruel - Stérilité du couple

Obésité - Régimes personnalisés - Maigreux

Prise en charge nutritionnelle après chirurgie bariatrique

Conseils diététiques : femme enceinte, sujet âgé, sportif

الدكتورة سهام الإدريسي أبو لحجول

إختصاصية في علم الغدد، وداء السكري
وأعراض الأيض

حاصلة من كلية الطب بباريس على:

دبلوم التخصص الطبي في علم الغدد وأمراض الأيض

دبلوم في علم الغدة الدرقية

دبلوم في علم التغذية

قدرة المعالجة بواسطة مضخة الأنسولين

داء السكري - الكوليسترول - إرتفاع ضغط الدم - فرط ونقص

الكالسيوم في الدم - الهرمونات - اضطرابات وتأخر النمو والبلوغ

الغدة الدرقية - النخامية - الكظرية

اضطرابات الحيض - العقم عند الزوجين

السمنة - الحمية - النحافة

المشورة الغذائية: للنساء الحوامل لكبار السن والرياضيين

18 octobre 2023

Casablanca, Le

Mr. LAHLOU KASSI FOUAD

38.10x3

GLYCAN 850 RETARD

1 cp après déjeuner et 1 cp après diner, 3 mois

DERMOFIX CREME

1 application entre les orteils 3 fois / jour, 1 mois

D-CURE 25 000

1 ampoule / 15 jours (à mettre dans un yaourt) pendant 3 mois

257.90

49, Avenue 2 Mars (angle Victor Hugo)- Immeuble les Roseaux - 2ème étage, N°8 (près du Lycée Mohammed V) - Casablanca

E-mail : dr.sihamidrisi@gmail.com البيضاء - البيضاء (قرب ثانوية محمد الخامس) - رقم 8 الطابق 2 - شارع 2 مارس زاوية فيكتور هوغو -

Tél.: (+212) 5 222 222 41 - GSM : (+212) 6 15 53 74 27 - Fax : (+212) 5 22 22 44 48 - ICE: 001697508000075

c) Interactions médicamenteuses et autres interactions

- Des infections bactériennes ou virales hyperthermisantes (grippe, infection urinaire ou bronchopulmonaire) et la prise de certains médicaments (corticoïdes, contraceptifs oraux, le danazol et certains diurétiques,....etc) peuvent déséquilibrer un diabète et modifier les besoins médicamenteux.

- On évitera une consommation de boissons alcoolisées, et tout traitement intercurrent non signalé aux prescripteurs.

d) Grossesse et allaitement

Tout traitement est obligatoirement prescrit par votre médecin, c'est lui seul qui décidera. En principe, on remplace le GLYCAN par de l'insuline injectable pendant la grossesse et l'allaitement.

e) Conducteurs, utilisateurs de machines et sportifs

Pas de réserve particulière.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

a) posologie, mode et voie d'administration :

Suivre les prescriptions médicales

A titre indicatif, la dose initiale est basse et sera augmentée progressivement après contrôles biologiques (glycémie, créatininémie, glycosurie).

On avale les comprimés sans les croquer au cours des repas en 2 à 3 prises, en se conformant à l'ordonnance médicale.

Veillez à boire de l'eau abondamment.

b) Durée du traitement:

En principe, chaque jour, sans interruption.

c) Conduite à tenir :

- En cas de surdosage, prévenir votre médecin sans délai.

- En cas d'omission de prises, il n'y a pas de rattrapage mais simplement une reprise des doses prescrites.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Les nausées, vomissements, selles liquides initiales éventuelles passent le plus souvent spontanément après 10 jours, et en veillant à la prise au cours des repas, avec beaucoup d'eau.

Si ces troubles persistent, vous informerez le médecin après avoir arrêté les prises.

Si ces troubles apparaissent plus tard, et se compliquent de fatigabilité, chute de l'état général, crampes musculaires, il y a apparition d'un risque grave d'acidose qui imposera des mesures urgentes, et impliquerait des actes précis et essentiels, avec arrêt immédiat des prises.

Si d'autres effets étaient perçus il faudrait en avvertir votre médecin ou votre pharmacien.

Laboratoires SYNTHEMEDIC
20-22, Rue Zoubeir Bnou El Aouam
Roches Noires - Casablanca

GLYCAN®

Formine chlorhydrate
PPV 38.10
LOT L0793 | DH PER 06/26
Comprimés enrobés dosés à 85

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg par comprimé.
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg par comprimé pelliculé.

c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 100.
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 60 et boîte hospitalière de 100.

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a une surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

درموفيكس[®] دهن

سرتاكونازول

تركيب :
سرتاكونازول نترات
سواغ كافي من أجل
يحتوي على 218 و أسيد سوربيك)

خاصيات :

- مضاد جديد للفطور لاستعمال خارجي، متوفر على مفعول واسع في الحالات الآتية :
- خفيفة مرضية (كانديدا البكانس، طروبيكاليس، بتروسبوروم أريكولاري)
- طفيليات الجلد (طريكوپيتون، إبيدروفتون ومكروسبوروم)
- فطور خيطية مثل أسبرجيلوس
- جراثيم مقاومة لمضادات الفطور أخرى
- جراثيم غرام (+) مثل سطاڤيلوكوك و سطرپتوكوك

دواعي الاستعمال :

معالجة موضعية للفطار الجلدي السطحي مثل طفيليات الجلد، أرجل الرياضيين، إكزيما و قوباء، كانديدا.

تأثيرات جانبية :

يعتبر سرتاكونازول كمادة غير خطيرة و مقبولة من طرف الجسد، لم تلاحظ أي حالة حساسية أو تسمم. يمكن حدوث طفح بسيط في بداية المعالجة لا يجب أن يؤدي إلى توقيف العلاج.

حالات خاصة للاستعمال :

لا يجوز استعمال درموفيكس فوق العينين. رغم استعمال كميات كبيرة فوق الجلد. لم يلاحظ وجود الدواء في الدم. رغما عن هذا لم يبت عدم خطره التام عند الرضيع و المرأة الحامل أو المرضعة.

مقادير و طريقة الاستعمال :

عن طريق الجلد.

استعملوا الدهن مرة في اليوم، من الأفضل في المساء، أو مرتين (صباحا ومساء) و بصفة خفيفة و متوازنة، مع تطبيق الدهن على المنطقة التي يجب معالجتها و تجاوزه بستمتر واحد حولها.

مدة المعالجة تتغير حسب نوعية سبب المرض وموقعه. عامة، يرشد بأربعة أسابيع للوصول إلى شفاء كامل و تجنب أي انتكاس، مع العلم أن الشفاء يمكن أن يتبين بعد 2 إلى 4 أسابيع.

أشكال و تقديمات أخرى :

درموفيكس[®] دهن 2% أنبوب يحتوي على 30 غ

درموفيكس[®] مسحوق قارورة محتوية على 30 غ

درموفيكس[®] محلول 2% قارورة محتوية على 30 مل

درموفيكس[®] جمد 2% قارورة محتوية على 50 غ

درموفيكس[®] جمد 2% قارورة محتوية على 100 غ

جينو درموفيكس[®] 300 مغ : بويضة مهبلية.

لائحة ا

بروموفارم ش.م.
المنطقة الصناعية للساحل، حد السوالم - المغرب
بترخيص من فريز العالمية

DERMOFIX® Crème

Sertaconazole

87130

Composition :

Sertaconazole nitrate
Excipients (dont E218 & Acide sorbique)

Propriétés :

Le Sertaconazole est un anti-mycosique à usage topique. Son spectre d'action comprend :

- levures pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. spp.*, *Pityrosporum* spp.)
- dermatophytons (*Trichophyton*, *Epidermophyton* et *Microsporum*)
- champignons opportunistes filamenteux (*Aspergillus*)
- germes résistants à d'autres anti-mycosiques
- bactéries gram⁺ (*Staphylocoques* et *Streptocoques*)

Indications thérapeutiques :

Traitement topique des mycoses superficielles de la peau telles que dermatophytoses : *Tinea pedis* (pied d'athlète), *Tinea cruris* (Eczéma marginé de Hebra), *Tinea corporis* (Herpès circiné), *Tinea barbae* (Sycosis), et *Tinea manus*, Candidoses (Miniliose) et Pityriasis versicolore (*Pityrosporum orbiculare*).

Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais la suspension du traitement.

Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophtalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récurrence, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A)

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L FERRER INTERNATIONAL

Imp. A.D.I.R. 20S0417.V01

c) Interactions médicamenteuses et autres interactions

- Des infections bactériennes ou virales hyperthermisantes (grippe, infection urinaire ou bronchopulmonaire) et la prise de certains médicaments (corticoïdes, contraceptifs oraux, le danazol et certains diurétiques,...etc) peuvent déséquilibrer un diabète et modifier les besoins médicamenteux.

- On évitera une consommation de boissons alcoolisées, et tout traitement intercurrent non signalé aux prescripteurs.

d) Grossesse et allaitement

Tout traitement est obligatoirement prescrit par votre médecin, c'est lui seul qui décidera. En principe, on remplace le GLYCAN par de l'insuline injectable pendant la grossesse et l'allaitement.

e) Conducteurs, utilisateurs de machines et sportifs

Pas de réserve particulière.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

a) posologie, mode et voie d'administration :

Suivre les prescriptions médicales

A titre indicatif, la dose initiale est basse et sera augmentée progressivement après contrôles biologiques (glycémie, créatininémie, glycosurie).

On avale les comprimés sans les croquer au cours des repas en 2 à 3 prises, en se conformant à l'ordonnance médicale.

Veillez à boire de l'eau abondamment.

b) Durée du traitement:

En principe, chaque jour, sans interruption.

c) Conduite à tenir :

- En cas de surdosage, prévenir votre médecin sans délai.

- En cas d'omission de prises, il n'y a pas de rattrapage mais simplement une reprise des doses prescrites.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Les nausées, vomissements, selles liquides initiales éventuelles passent le plus souvent spontanément après 10 jours, et en veillant à la prise au cours des repas, avec beaucoup d'eau. Si ces troubles persistent, vous informerez le médecin après avoir arrêté les prises.

Si ces troubles apparaissent plus tard, et se compliquent de fatigabilité, chute de l'état général, crampes musculaires, il y a apparition d'un risque grave d'acidose qui imposerait des mesures urgentes, et impliquerait des actes précis et essentiels, avec arrêt immédiat des prises.

Si d'autres effets étaient perçus il faudrait en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Laboratoires SYNTHEMEDIC
20-22, Rue Zoubeir Bnou El Aouam
Roches Noires - Casablanca

GLYCAN®

Metformine chlorhydrate
PPV 38 10
LOT L0736
60 comprimés enrobés dosés à
PH
PER 06/26

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg par comprimé.
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg par comprimé pelliculé.

c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 100.
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 60 et boîte hospitalière de 100.

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a une surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie,
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

c) Interactions médicamenteuses et autres interactions

- Des infections bactériennes ou virales hyperthermisantes (grippe, infection urinaire ou bronchopulmonaire) et la prise de certains médicaments (corticoïdes, contraceptifs oraux, le danazol et certains diurétiques,....etc) peuvent déséquilibrer un diabète et modifier les besoins médicamenteux.

- On évitera une consommation de boissons alcoolisées, et tout traitement intercurrent non signalé aux prescripteurs.

d) Grossesse et allaitement

Tout traitement est *obligatoirement prescrit par votre médecin*, c'est lui seul qui décidera. En principe, on remplace le GLYCAN par de l'insuline injectable pendant la grossesse et l'allaitement.

e) Conducteurs, utilisateurs de machines et sportifs

Pas de réserve particulière.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?

a) posologie, mode et voie d'administration :

Suivre les prescriptions médicales

A titre indicatif, la dose initiale est basse et sera augmentée progressivement après contrôles biologiques (glycémie, créatininémie, glycosurie).

On avale les comprimés sans les croquer au cours des repas en 2 à 3 prises, en se conformant à l'ordonnance médicale.

Veillez à boire de l'eau abondamment.

b) Durée du traitement:

En principe, chaque jour, sans interruption.

c) Conduite à tenir :

- En cas de surdosage, prévenir votre médecin sans délai.

- En cas d'omission de prises, il n'y a pas de rattrapage mais simplement une reprise des doses prescrites.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Les nausées, vomissements, selles liquides initiales éventuelles passent le plus souvent spontanément après 10 jours, et en veillant à la prise au cours des repas, avec beaucoup d'eau.

Si ces troubles persistent, vous informerez le médecin après avoir arrêté les prises.

Si ces troubles apparaissent plus tard, et se compliquent de fatigabilité, chute de l'état général, crampes musculaires, il y a apparition d'un risque grave d'acidose qui imposerait des mesures urgentes, et impliquerait des actes précis et essentiels, avec arrêt immédiat des prises.

Si d'autres effets étaient perçus il faudrait en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Laboratoires SYNTHEMEDIC
20-22, Rue Zoubeir Bnou El Auouam
Roches Noires - Casablanca

GLYCAN®

metformine chlorhydrate

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé, 0 comprimés enrobés dosés à

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg par comprimé.
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg par comprimé pelliculé.

c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 100.
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 60 et boîte hospitalière de 100.

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a une surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

PPV 38.10 DH
LOT L0736 PER 06/26

PPV : 56,30 DH
LOT : 23B10D
EXP : 02/2025

Notice: Information de l'utilisateur

D-CURE 25 000 UI ; solution buvable ; boite

D-CURE 2.400 UI ; solution buvable en gouttes, flacon de 10 ml.

Cholécalciférol (Vitamine D 3)

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice
Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien .

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?
3. Comment prendre D-Cure ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure ?
6. Information supplémentaires.

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique :

Vitamines.

Indications thérapeutiques :

Le D-CURE est indiqué dans les cas suivants :

- Prophylaxie de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- prophylaxie de rachitisme chez les nouveaux nés prématurés,
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes portant un risque identifié,
- prophylaxie de l'ostéoporose,
- apport déficient en vitamine D : stéatorrhée, obstruction biliaire, cirrhose, gastrectomie, personnes âgées (aîlées ou sortant peu) ;
- traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, prise d'anti-convulsivants ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes présentant une mal absorption ;
- traitement de rachitismes et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- hypoparathyroïdie idiopathique ou post-opératoire, pseudo-hypoparathyroïdie ;
- traitement d'appoint, en association avec le calcium, des médicaments inhibant la résorption ostéoclastique ou stimulant la formation osseuse, utilisés dans le traitement de l'ostéoporose.

N.B. : Une alimentation variée joue également un rôle prépondérant dans la prévention des carences en vitamine D.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?

Ne prenez jamais D-CURE :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6
 - Si vous avez une sensibilité particulière à la vitamine D (lésions tissulaires de différents organes).
- Précaution d'emploi : une teneur trop élevée en calcium en particulier chez le nourrisson.

Docteur SIHAM IDRISSE ABLOUHAJOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie
et Maladies Métaboliques

Diplômée de Paris:

Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Endocrinologie et Métabolisme

Diplôme de Thyroïdologie

Diplôme de Nutrition et Diététique

Capacité de traitement par pompe à insuline, Insulinothérapie fonctionnelle

Diabète - Cholestérol - Hypertension artérielle - Hyper et hypocalcémie

Hormones - troubles et retard de croissance et de puberté

Thyroïde - Goitre - Hypophyse - Surrénales

Trouble du cycle menstruel - Stérilité du couple

Obésité - Régimes personnalisés - Maigreux

Prise en charge nutritionnelle après chirurgie bariatrique

Conseils diététiques : femme enceinte, sujet âgé, sportif

الدكتورة سهام الإدريسي أبو لحجول

إختصاصية في علم الغدد، وداء السكري
وأأمراض الأيض

حاصلة من كلية الطب بباريس على:

دبلوم التخصص الطبي في علم الغدد وأمراض الأيض

دبلوم في علم الغدة الدرقية

دبلوم في علم التغذية

قدرة المعالجة بواسطة مضخة الأنولين

داء السكري - الكوليسترول - إرتفاع ضغط الدم - فرط ونقص

الكالسيوم في الدم - الهرمونات - إضطرابات وتأخر النمو والبلوغ

الغدة الدرقية - النخامية - الكظرية

إضطرابات الحيض - العقم عند الزوجين

السمنة - الحمية - النحافة

المشورة الغذائية: للنساء الحوامل لكبار السن والرياضيين

18 octobre 2023

Casablanca, Le

MR. LAHLOU KASSI FOUAD

Analyses :

Glycémie à jeun
HbA1c

Urée
Créatinine

Rapport microalbuminurie / créatinine sur échantillon matinal

GGT
Transaminases SGOT
Transaminases SGPT

PSA

Dr. Siham IDRISSE ABLOUHAJOU
Spécialiste : Endocrinologie
Diabétologie - Nutrition - Obésité
49, Bd 2 Mars - Casablanca
Tél : 05 22 22 22 41 - 05 22 22 44 48
GSM : 06 15 53 74 27

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
DENTISOLINE LES HOPITAUX
27 Rue Iahssen El Arjane
Quartier des Hopitaux - Casablanca
Tél : 05 22 81 59 36 - Fax : 05 22 81 59 40

49, Avenue 2 Mars (angle Victor Hugo)- Immeuble les Roseaux - 2ème étage, N°8 (près du Lycée Mohammed V) - Casablanca

E-mail : dr.sihamidrissi@gmail.com البيضاء - (قرب ثانوية محمد الخامس) رقم 8 الطابق 2 هوكو - مارس زاوية فيكتور هوكو

Tél.: (+212) 5 222 222 41 - GSM : (+212) 6 15 53 74 27 - Fax : (+212) 5 22 22 44 48 - ICE: 001697508000075

Laboratoire Derb Soltane Quartier des Hôpitaux
27 rue Lahcen Al arjouna quartier des hôpitaux
05.22.81.59.36 – 05.22.81.59.40

FACTURE N : 231000588

CASABLANCA le 18-10-2023

Mr Fouad LAHLOU KASSI

Demande N° 23101820264

Date de l'examen : 18-10-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses		
CN	Analyse	Clé
PSA	Prélèvement sang adulte	E25
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	B0
0119	Hémoglobine glycosylée	B100
0361	PSA	B300
	Créatinine	B30
	Glycémie à jeun	B30
	gammaglutamyl-transférases	B50
	ASAT (transaminase TGO)	B50
	ALAT (transaminase TGP)	B50
	RAPPORT ALB/CRE	B70
	Urée	B30

Total des B : 710

TOTAL DOSSIER : 980DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : neuf cent quatre-vingts dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALE
DERB SOLTANE LES HOPITAUX
27 Rue Lahssen El Arjouna
Quartier des Hôpitaux - Casablanca
Tél: 05 22 81 59 36 - Fax: 05 22 81 59 40

ICE : 001539203000005 / INP : 093002772 / I.F : 44601910

C

Enregistré le : 18-10-2023 12:01

Prélevé le : 18-10-2023

Édité le : 19-10-2023

Mr LAHLOU KASSI Fouad

Né(e) le : 15-07-1952

Sexe : M

Réf : 23101820264

Prescripteur: Dr SIHAM ABOULAHJOUL IDRISSE Tél :
05220222241

Correspondant : Fax :

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Urée (Cinétique)	0.39 g/l 6.50 mmol	(0.15-0.50) (2.50-8.33)	15-03-2023 0.55
Créatinine (Colorimétrique cinétique)	10.00 mg/l 88.88 µmol/l	(7.00-12.00) (62.22-106.66)	15-03-2023 10.20
Glycémie à jeun (UV enzymatique à l'hexokinase)	1.26 g/l 6.99 mmol/l	(0.74-1.09) (4.11-6.05)	18-07-2023 1.19
Hémoglobine Glycosylée (HPLC (GX))	6.00 %	(4.00-6.00)	18-07-2023 5.70
Interprétation HbA1c chez un diabétique : 6.1 à 7 % : Très bon équilibre glycémique 7.1 à 8 % : Bon équilibre glycémique > 8.1 % : Mauvais équilibre glycémique			
Transaminases GOT (ASAT) (IFCC sans activation par pyridoxal phosphate)	20.80 UI/l	(0.00-37.00)	15-03-2023 17.44
Transaminases GPT (ALAT) (IFCC sans activation par pyridoxal phosphate)	12.40 UI/l	(0.00-41.00)	15-03-2023 18.74
Gamma Glutamyl Transférase (Colorimétrique Enzymatique)	24.00 UI/l	(8.00-61.00)	15-03-2023 25.20

23101820264 – Mr LAHLOU KASSI Fouad

BIOCHIMIE URINAIRE

Rapport Albumine/créatinine 9.04 mg/mmol

Classification de la maladie rénale chronique en fonction de l'ACR (KDIGO 2012)

Valeur physiologique optimale	Stade A1: <10mg/g (<1.13 mg/mmol)
Valeur physiologique haute	Stade A1: 10–29 mg/g (1.13–3.4 mg/mmol)
Albuminurie de faible débit	Stade A2: 30–299 mg/g (3.4–34 mg/mmol)
Albuminurie de haut débit	Stade A3: 300–1999 mg/g (34–226 mg/mmol)
Syndrome néphrotique	Stade A3: > ou = 2000 mg/g (226 mg/mmol)

MARQUEURS TUMORAUX

PSA Total 1.890 ng/mL
(Chimiluminescence)

Valeurs usuelles en ng/ml

Age

<40	: <1.4
40 – 50	: <2.0
50 – 60	: <3.1
60 – 70	: <4.1
>70	: <4.4

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
DERB SOLTANE LES HOPITAUX
27 Rue Lahssen El Arjoun
Quartier des Hopitaux - Casablanca
Tél: 05 22 81 59 36 - Fax: 05 22 81 59 40