

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3108 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : Mme Montal zohra Ep. RIAH

Date de naissance : 1-7-1949

Adresse : cite E.D. Tmara I, Rue 11 N° 25. Tassaliente

Tél. : 06.42.76.95.82 Total des frais engagés : 774,00 + 664,20 Dhs

Total 1.432,20

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 25-10-2013

Nom et prénom du malade : J. MAJAL Age : 70 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Ophtalmie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : maladie

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/5/03	Ophtalmologiste Prostéctomie		600,-	 <b>Dr. J. ZAKA</b> Ophthalmologiste Clinique de Casablanca 43, Rue des Nations Oasis - Casablanca Tél : 0522 25 71 11 (SLG) - Fax : 0522 25 11 15 <b>Ref : 091140186</b>

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				MONTANTS DES SOINS <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				DEBUT D'EXECUTION <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				FIN D'EXECUTION <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	B 35533411 11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				DATE DU DEVIS <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>
				DATE DE L'EXECUTION <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </span>



Casablanca le : ٢٦.٥.٢٣

**BON DE REGLEMENT**

Reçu de .....

M. .... MOJAL Zouhair .....

La somme de : Quatre cent Dhs  
400.00Dhs

Pour : Consultation+k10 fond d'œil

**Cachet et signature**

**Dr J. ZAINI**  
Ophtalmologiste  
Ophtalmo Clinique de Casablanca  
13, Rue des Papillons Oasis - Casablanca  
Tél : 0522.25.71.71 (LG) - Fax : 0522.25.11.15  
INPE : 091140186

**Urgence 24/24**



**Maladies et Chirurgie des yeux - Laser - Angiographie - Lentilles de Contact**



33810

Casablanca le : .....  
**25 septembre 2023**

**MOUTAL EP RIAD Zohra**

**VISNEUROX**

1 goutte 3 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 6 Mois

129.00 x 6



774,00

**PHARMACIE LUMIERES  
LAHRICHI SARL AU**  
550, Bd. Al Qods, Inara, Ain Chak  
Casablanca - INPE : 092040421  
Tel.: 06 29 52 49 29

**Dr J. ZARMI**  
Ophtalmologiste  
Ophtalmo Clinique de Casablanca  
13, Rue des Papillons, Oasis - Casablanca  
Tél. : 0522.25.71.71 (LG) - Fax : 0522.25.71.73  
INPE : 09114016

**Urgence 24/24**

Sarl au Capital de 1 200 000,00 MAD - 13, Rue des Papillons - Oasis - Casablanca

Tél. (LG) : 05.22.25.71.71 - Fax : 05.22.25.11.15 - Web : [www.occ.ma](http://www.occ.ma)

RC : 416933 - I.F : 1051442 - T.P : 34788018 - C.N.S.S. : 6448395 - I.C.E. : 002077199000057



**Maladies et Chirurgie des yeux - Laser - Angiographie - Lentilles de Contact**



33810

Casablanca le : .....  
**25 septembre 2023**

**MOUTAL EP RIAD Zohra**

PHARMACIE LUMIERE  
LAHRICHI SARL AU  
550, Bd. Al Qods, Inara, Ain Chok  
Casablanca - INPE : 092040427  
Tél.: 05 22 52 49 29

**XOLAMOL**

1 goutte le matin et le soir, dans les deux yeux, pendant 6 Mois

110,70 x 6

664,20

SV

Dr J. ZAÏRT  
Ophtalmologiste  
Ophtalmo Clinique de Casablanca  
43, Rue des Papillons - Casablanca  
Tel. : 0522 25 71 71 / 0522 25 11 15  
Fax : 0522 25 11 15  
INPE : 092040186

**Urgence 24/24**

# Xolamol® 20 mg/ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## Dorzolamide + Timolol

### Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol®. Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé?

Xolamol® collyre est une combinaison de médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés «inhibiteur de l'acide carbonique».
- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés «bêta-bloquants».

Xolamol® collyre est prescrit pour une tension élevée dans l'œil dans le traitement, quand le collyre bêta-bloquant seul n'est pas suffisant.

### 2. Avant d'utiliser Xolamol® collyre

**N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous:**  
allergique au dorzolamide ou au timolol, ou à d'autres bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).  
• vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).

- vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.
- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.
- vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

### Faites attention avec Xolamol® collyre Avant

d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament, consultez d'abord votre médecin.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut causer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le

monde. Il est recommandé de continuer à prendre Xolamol® collyre si les effets sont graves. Si vous êtes dans une situation d'urgence, contactez immédiatement votre médecin ou un pharmacien.

**Des effets indésirables graves peuvent survenir si vous continuez à utiliser ce médicament et ne consultez pas immédiatement votre médecin ou un pharmacien au service des urgences de l'hôpital le plus proche.**

Les réactions allergiques généralisées y compris un érythème sous la peau qui peut se produire dans des zones tels que le visage et les membres, et peut entraîner les voies respiratoires ce qui peut entraîner une difficulté à avaler ou à respirer, urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique soudaine et sévère.

- Maladie grave avec desquamation sévère et gonflement de la peau, des cloques sur la peau, la bouche, les yeux et les organes génitaux et de la fièvre. Une éruption cutanée avec des taches rose-rouge en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent piquer.

Comme d'autres médicaments appliqués dans les yeux, Xolamol® collyre est absorbé dans le sang. Cela peut entraîner des effets indésirables semblables comme on le voit avec des agents bêta-bloquants par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

• Maladie de l'œil, telle que la conjonctivite, l'œdème, l'irritation, la douleur et l'inflammation de l'œil.

# Xolamol® 20 mg/ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## Dorzolamide + Timolol

### Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est un mélange de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés "agonistes de l'acide carbonique".

- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés "bêta-bloquants". Xolamol® collyre est éllevée dans l'œil dans quand le collyre bêta-suffisant.

### 2. Avant d'utiliser

N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous êtes allergique au dorzolamide, au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).
- vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.
- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.
- vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

**Faites attention avec Xolamol® collyre** Avant d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé:

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament, consultez d'abord votre médecin.

- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

vous pouvez habituellement continuer à prendre les autres, sauf si les effets sont graves. Si vous êtesquiet, parlez à un médecin ou un pharmacien. arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à tre médecin.

vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et évenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Réactions allergiques généralisées y compris un érythème sous la peau qui peut se produire dans des endroits tels que le visage et les membres, et peut entraîner les voies respiratoires ce qui peut entraîner une difficulté à avaler ou à respirer, urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique soudaine et sévère.

• Maladie grave avec desquamation sévère et gonflement de la peau, des cloques sur la peau, la bouche, les yeux et les organes génitaux et de la fièvre. Une éruption cutanée avec des taches rose-rouge en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent piquer.

Comme d'autres médicaments appliqués dans les yeux, Xolamol® collyre est absorbé dans le sang. Cela peut entraîner des effets indésirables semblables comme on le voit avec des agents bêta-bloquants par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique topique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

**Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur 10):**

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel.  
Érythème (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100).

# Xolamol® 20 mg/ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## Dorzolamide + Timolol

### Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est un mélange de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés "agonistes de l'acide carbonique".
- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés "bêta-bloquants". Xolamol® collyre est éllevée dans l'œil dans quand le collyre bêta-suffisant.

### 2. Avant d'utiliser

N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous êtes allergique au dorzolamide, au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).
- vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.
- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.
- vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

**Faites attention avec Xolamol® collyre** Avant d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé:

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament, consultez d'abord votre médecin.

- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

vous pouvez habituellement continuer à prendre les autres, sauf si les effets sont graves. Si vous êtesquiet, parlez à un médecin ou un pharmacien. arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à tre médecin.

vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et évenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Réactions allergiques généralisées y compris un érythème sous la peau qui peut se produire dans des endroits tels que le visage et les membres, et peut entraîner les voies respiratoires ce qui peut entraîner une difficulté à avaler ou à respirer, urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique soudaine et sévère.

• Maladie grave avec desquamation sévère et gonflement de la peau, des cloques sur la peau, la bouche, les yeux et les organes génitaux et de la fièvre. Une éruption cutanée avec des taches rose-rouge en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent piquer.

Comme d'autres médicaments appliqués dans les yeux, Xolamol® collyre est absorbé dans le sang. Cela peut entraîner des effets indésirables semblables comme on le voit avec des agents bêta-bloquants par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophthalmique topique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

**Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur 10):**

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel.  
Érythème (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100).

# Xolamol® 20 mg/ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## Dorzolamide + Timolol

### Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est un mélange de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés "agonistes de l'acide carbonique".
- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés "bêta-bloquants". Xolamol® collyre est éllevée dans l'œil dans quand le collyre bêta-suffisant.

### 2. Avant d'utiliser

N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous êtes allergique au dorzolamide, au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).
- vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.
- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.
- vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

**Faites attention avec Xolamol® collyre** Avant d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé:

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament, consultez d'abord votre médecin.

- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

vous pouvez habituellement continuer à prendre les autres, sauf si les effets sont graves. Si vous êtesquiet, parlez à un médecin ou un pharmacien. arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à tre médecin.

vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et évenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Réactions allergiques généralisées y compris un érythème sous la peau qui peut se produire dans des endroits tels que le visage et les membres, et peut entraîner les voies respiratoires ce qui peut entraîner une difficulté à avaler ou à respirer, urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique soudaine et sévère.

• Maladie grave avec desquamation sévère et gonflement de la peau, des cloques sur la peau, la bouche, les yeux et les organes génitaux et de la fièvre. Une éruption cutanée avec des taches rose-rouge en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent piquer.

Comme d'autres médicaments appliqués dans les yeux, Xolamol® collyre est absorbé dans le sang. Cela peut entraîner des effets indésirables semblables comme on le voit avec des agents bêta-bloquants par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophthalmique topique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

**Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur 10):**

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel.  
Érythème (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100).

# Xolamol® 20 mg/ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## Dorzolamide + Timolol

### Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est un mélange de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés "agonistes de l'acide carbonique".
- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés "bêta-bloquants". Xolamol® collyre est éllevée dans l'œil dans quand le collyre bêta-suffisant.

### 2. Avant d'utiliser

N'utilisez pas Xolamol® si vous êtes allergique au dorzolamide, au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).
- vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.
- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.
- vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

**Faites attention avec Xolamol® collyre** Avant d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé:

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament, consultez d'abord votre médecin.

- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

vous pouvez habituellement continuer à prendre les autres, sauf si les effets sont graves. Si vous êtesquiet, parlez à un médecin ou un pharmacien. arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à tre médecin.

vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et évenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Réactions allergiques généralisées y compris un érythème sous la peau qui peut se produire dans des endroits tels que le visage et les membres, et peut entraîner les voies respiratoires ce qui peut entraîner une difficulté à avaler ou à respirer, urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique soudaine et sévère.

• Maladie grave avec desquamation sévère et gonflement de la peau, des cloques sur la peau, la bouche, les yeux et les organes génitaux et de la fièvre. Une éruption cutanée avec des taches rose-rouge en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent piquer.

Comme d'autres médicaments appliqués dans les yeux, Xolamol® collyre est absorbé dans le sang. Cela peut entraîner des effets indésirables semblables comme on le voit avec des agents bêta-bloquants par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique topique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

**Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur 10):**

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel.  
Érythème (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100).

# Xolamol® 20 mg/ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## Dorzolamide + Timolol

### Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est un mélange de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés "agonistes de l'acide carbonique".
- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés "bêta-bloquants". Xolamol® collyre est éllevée dans l'œil dans quand le collyre bêta-suffisant.

### 2. Avant d'utiliser

N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous êtes allergique au dorzolamide, au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).
- vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.
- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.
- vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

**Faites attention avec Xolamol® collyre** Avant d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé:

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament, consultez d'abord votre médecin.

- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Xolamol® collyre peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

vous pouvez habituellement continuer à prendre les autres, sauf si les effets sont graves. Si vous êtesquiet, parlez à un médecin ou un pharmacien. arrêtez pas d'utiliser Xolamol® sans en parler à tre médecin.

vous ressentez un des effets indésirables graves suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et évenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Réactions allergiques généralisées y compris un érythème sous la peau qui peut se produire dans des endroits tels que le visage et les membres, et peut entraîner les voies respiratoires ce qui peut entraîner une difficulté à avaler ou à respirer, urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique soudaine et sévère.

• Maladie grave avec desquamation sévère et gonflement de la peau, des cloques sur la peau, la bouche, les yeux et les organes génitaux et de la fièvre. Une éruption cutanée avec des taches rose-rouge en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds qui peuvent piquer.

Comme d'autres médicaments appliqués dans les yeux, Xolamol® collyre est absorbé dans le sang. Cela peut entraîner des effets indésirables semblables comme on le voit avec des agents bêta-bloquants par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophthalmique topique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection..

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

**Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur 10):**

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel.  
Érythème (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100).



## Citicoline et Acide hyaluronique

### **Composition:**

Citicoline sodique, Acide hyaluronique monohydraté, Phosphate de sodium, P.P.C: 129.00 Chlorhydrate de benzalkonium, Eau ppi.

**SYNTHEMEDIC**

22-24 Rue Zoubir Ibnou  
El Aouam 20500 Casablanca

### **Présentation:**

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

### **Quand l'utiliser**

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citicoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétinianes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

### **Mode d'emploi**

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

### Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.



## Citicoline et Acide hyaluronique

### **Composition:**

Citicoline sodique, Acide hyaluronique monohydraté, Phosphate de sodium, P.P.C: 129.00 Chlorhydrate de benzalkonium, Eau ppi.

**SYNTHEMEDIC**

22-24 Rue Zoubir Ibnou  
El Aouam 20500 Casablanca

### **Présentation:**

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

### **Quand l'utiliser**

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citicoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétinianes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

### **Mode d'emploi**

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

### Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.



## Citicoline et Acide hyaluronique

### **Composition:**

Citicoline sodique, Acide hyaluronique monohydraté, Phosphate de sodium, P.P.C: 129.00 Chlorhydrate de benzalkonium, Eau ppi.

**SYNTHEMEDIC**

22-24 Rue Zoubir Ibnou  
El Aouam 20500 Casablanca

### **Présentation:**

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

### **Quand l'utiliser**

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citicoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétinianes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

### **Mode d'emploi**

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

### Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.



## Citicoline et Acide hyaluronique

### **Composition:**

Citicoline sodique, Acide hyaluronique monohydraté, Phosphate de sodium, P.P.C: 129.00 Chlorhydrate de benzalkonium, Eau ppi.

**SYNTHEMEDIC**

22-24 Rue Zoubir Ibnou  
El Aouam 20500 Casablanca

### **Présentation:**

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

### **Quand l'utiliser**

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citicoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétinianes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

### **Mode d'emploi**

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

### Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.



## Citicoline et Acide hyaluronique

**SYNTHEMEDIC**

22-24 Rue Zoubir Ibnou  
El Aouam 20500 Casablanca

**P.P.C: 129.00**

### Composition:

Citicoline sodique, Acide hyaluronique monohydraté, Phosphate de sodium, Chlorure de benzalkonium, Eau ppi.

### Présentation:

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

### Quand l'utiliser

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citicoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétinianes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

### Mode d'emploi

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

### Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.



## Citicoline et Acide hyaluronique

**SYNTHEMEDIC**

22-24 Rue Zoubir Ibnou  
El Aouam 20500 Casablanca

**P.P.C: 129.00**

### Composition:

Citicoline sodique, Acide hyaluronique monohydraté, Phosphate de sodium, Chlorure de benzalkonium, Eau ppi.

### Présentation:

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurelle qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.

En fait l'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques, utiles pour améliorer la stabilité du film lacrymal et ainsi maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.

### Quand l'utiliser

VISNEUROX OMK1®, du fait de la présence de citicoline et de son action structurelle sur les cellules ganglionnaires rétinianes, est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

D'autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit assurent un soulagement oculaire en cas d'irritation, de sensation de brûlure et de sensation de corps étranger causées par des facteurs environnementaux, une chirurgie oculaire ou une conjonctivite.

### Mode d'emploi

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

### Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l'embout du flacon avec les yeux.