

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° W21-651296

Ayoub

Autres

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent (e)		
Matricule : 8144	Société : RAM	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :
Nom & Prénom : ME2HARi KHALID		
Date de naissance : 22-11-76		
Adresse :		
Tél. : Total des frais engagés : Dhs		

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/08/2023		1	17000	INP : 061193897 Docteur MATAOUA Médecin Sidi Radouane Plage, Lot. Nassim APL 1, 1er Etage, 10000 Tunisie 10000 Tel: 06 61 51 96 05
30/08/2023	Ch	1	81	Docteur MATAOUA Médecin Sidi Radouane Plage, Lot. Nassim APL 1, 1er Etage, 10000 Tunisie 10000 Tel: 06 61 51 96 05

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Laboratoire	Date	Montant de la Facture
EL KHARTI PHARMACY Docteur El Nassim El Khatib Lot Nassim El Khatib Tel: 06 61 51 96 05	30/08/2023	63000
El Khatib Pharmacy Docteur El Nassim El Khatib Lot Nassim El Khatib Tel: 06 61 51 96 05	30/08/2023	9184,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.												
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.												
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient									
			INP : <input type="text"/>									
			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>									
			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>									
			DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>									
			FIN D'EXECUTION <input type="text"/>									
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	35533411	11433553
H	25533412	21433552										
D	00000000	00000000										
B	35533411	11433553										
	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>											
	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>											
	DATE DU DEVIS <input type="text"/>											
	DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>											
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS												
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION												



Sidi Rahal, le :

16/10/2005

سيدي رحال في



سيدي رحال الشاطئ، تجزئة نسيم البحر، درج 2 الشقة 1 الطابق الأول، سيدي رحال

Sidi Rahal Plage, Lotissement Nassim El Bahr, Escalier 2, Appt 1, 1er Etage - Sidi Rahal


Tél / Fax : 05 22 96 90 15 - GSM : 06 61 51 96 05 - Email : mataouinadia@hotmail.fr

65.00 x 6

35.70

6

Agelaius phoeniceus (S.)
1cp x 2) j d Bmwr
Alauda arvensis (S.)
1cp 6v



98470



ESCIPLIX 10 mg et 20 mg,
comprimé pelliculé sécable
Escitalopram

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESCIPLIX?

séci

3. C

com

4. QL

ABLE

5. CC

comp

6. INF

1. QU'ES-
pelliculé sé-
EST-IL UTILISÉ ?

ESCIPLIX contient la substance active escitalopram. L'escitalopram appartient à un groupe d'antidépresseurs à libération prolongée. Il est un inhibiteur Sélectif de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système sérotoninergique dans le cerveau en augmentant la sérotonine. Les dysfonctionnements du système sérotoninergique sont

considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

ESCIPLIX contient de l'escitalopram et est utilisé pour traiter la dépression (épisodes dépressifs majeurs) et les troubles anxieux (tels que le trouble panique avec ou sans agoraphobie, le trouble anxiété sociale, le trouble anxiété généralisée et les troubles obsessionnels compulsifs) chez les adultes de plus de 18 ans.

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commencez à vous sentir mieux. Continuez à prendre ESCIPLIX même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?

• Ne prenez pas

SCIPLIX,
dans les

LOT 231502 1
EXP 04 2025
PPV 126.00



Esciplex® 10 mg
Boîte de 28 comprimés pelliculés
Sécables
AMM N° 130/21/NRQd/DMP/VHA/18

6 118000 022787

Autres médicaments et
ESCIPLIX »).

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragee.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration maximale est atteinte en moyenne en 1 à 2 heures.

COMPOSITION : (DCI) 2,5 mg/ceinture.
kg de corps.

indolagine ainsi que le desmertychion actif, traversent rapidement les barrières également en petites quantités dans

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 10 à 12 heures. La demi-vie plasmatique totale est de l'ordre de 15 à 20 heures.

Avant toute utilisation, lire la notice intérieure.

Librax® 5 / 2,5 mg 

30 comprimés dragées

grete, puis réapparait, rythmée par l'alternance de périodes d'activité et de repos. Ce dérivé est élaboré au cours de la vie et il devient progressivement plus complexe. Il est alors possible de distinguer deux types de rythme : le rythme quaternaire et le rythme de type circadien.

6 118000 280019

- PER 6412026

Posologie habituelle
3-4 dragées par jour. Prendre le matin avec du liquide.

Directives posologiques particulières
Anés et faibles : comment délivrer la dose optimale

• 2 dragées par jour, selon
la posologie jusqu'à la dose
maximale de 4 dragées, avec du liquide.

COMPOSITION :	
Clidinium bromure (DCI)	2,5 mg/once
Chlordiazépoxide	5 mg/ment
Excipients q.s.p	1 comprimé dragéifiésent
Excipients à effet notoire :	
Lactose et saccharose.	base
Avant toute utilisation, lire attentivement	ance
la notice intérieure.	est n et nts,

Librax® 5/2,5 mg 

30 comprimés dragéifiés



6 118000-280015

LOT 23067 PER 04/2026
PPV 21.00 DH

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragee contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétatoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration maximale est atteinte en moyenne en 1 h.

A l'état d'équilibre le volume de distribution est de 1000 l. Le chlordiazépoxide, en tant qu'acide, traversent rapidement les barrières cellulaires et sont également en petites quantités dans le liquide céphalorachidien. La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 10 à 12 heures. La demi-vie plasmatique totale est de l'ordre de 15 à 20 heures. Le chlordiazépoxide a été retrouvé dans l'urine sous forme d'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide et de ses dérivés pharmacologiquement actifs : desmétchlorodiazépoxide et desmétchlorodiazépoxide. Le démoxépam et le desméthylchlordiazépoxide sont également retrouvés dans l'urine sous forme d'acide glucuronique. Lors d'administration de chlordiazépoxide à des sujets sains, le chlordiazépoxide et ses dérivés sont retrouvés dans l'urine sous forme inchangée à une concentration très faible. Le chlordiazépoxide et ses dérivés sont éliminés au cours de 24 à 48 heures, au côté du bromure de clidinium qui est éliminé dans l'urine sous forme inchangée à une concentration élevée. Le chlordiazépoxide et ses dérivés sont éliminés dans l'urine sous forme inchangée à une concentration élevée. Le chlordiazépoxide et ses dérivés sont éliminés dans l'urine sous forme inchangée à une concentration élevée.

Le bromure de clidinium est absorbé dans l'estomac et dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans l'intestin grêle et dans l'intestin transverse. Ce dérivé est éliminé dans l'urine sous forme inchangée à une concentration élevée. Le chlordiazépoxide et ses dérivés sont éliminés dans l'urine sous forme inchangée à une concentration élevée.

Indications :
Manifestations de l'anxiété s'accompagnant d'un état spastique.

Posologie habituelle :
3-4 dragées par jour. Prendre le matin avec ou sans repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :
Patients âgés et faibles : commencer par une dose faible et augmenter progressivement la posologie jusqu'à la dose optimale.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et la taille. Les dragées doivent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

COMPOSITION :
Clidinium bromure (DCI) 2,5 mg
Chlordiazépoxide 5 mg
Excipients q.s.p 1 comprimé dragéifié et saupoudré de sucre
Excipients à effet notable :
Lactose et saccharose.
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

Librax® 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

LOT 23067 PER 04/2026
PPV 21.00 DH

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dradée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La ~~concentration~~ maximale est atteinte en moyenne en 1 à 2 heures.

COMPOSITION : (DCl) 2,5 mg/ce

indolagine ainsi que le desmertychion actif, traversent rapidement les barrières également en petites quantités dans

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est d'environ 10 à 12 heures. La demi-vie plasmatique totale est de l'ordre de 15 à 20 heures.

Avant toute utilisation, lire la notice intérieure.

Librax® 5 / 2,5 mg 

30 comprimés dragées

greie, puis réaction d'hydrolyse dans le quaternaire. Ce dérivé est éliminé via le bromure de Li^+ , sous forme inchangée à une circulation en deux phases, avec des demi-vies de 6 et 118 minutes.

Indications :

Manifestations de l'EEG spastique. DATE RER 04/2026

... la habituelle

Posologie habituelle : 3-4 dragées par jour. Prendre sans avec du liquide.

casiques particuliè

Directives posologiques
Patients âgés et faibles : commencer
par une dose réduite jusqu'à la dose optimale

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon
évalées entières ou écrasées, avec du liquide.

LOT 23067 PER 04/2026
PPV 21.00 DH

PPV 21.00 DH



Sidi Rahal,le : 30/08/2003 : سيدى رحال فى :

No Tr Hasselane Iham

3x 21.00

N-

Librairie

14 Cours d'Oran



Pharmacie MOUJAMAA ANDALOUS
Salma 2 Groupe 3 - Nassim El Andalous
Rue 4 N° 11-13 Casablanca
Tél: 05 22 28 30 06

/ 63.00

DOCTEUR MATAOUI Nadia
Médecine Générale
Sidi Rahal Plage, Lot. No 4, 1er Etage
Appt. 1, 1^{er} Etage, Sidi Rahal Plage

Pharmacie MOUJAMAA ANDALOUS
Salma 2 Groupe 3 - Nassim El Andalous
Rue 4 N° 11-13 Casablanca
Tél: 05 22 28 30 06
Tél/Fax: 0522 96 90 15 - GSM: 06 61 51 96 05

بدي رحال الشاطئ، تجزئة نسيم البحر، درج 2 الشقة 1 الطابق الأول، سيدى رحال

Sidi Rahal Plage, Lotissement Nassim El Bahr, Escalier 2, Appart 1, 1^{er} Etage - Sidi Rahal

Tél / Fax : 05 22 96 90 15 - GSM : 06 61 51 96 05 - Email : mataouinadia@hr

AGENOS®

Calcium

Vitamin D3

Vitamin C

Magnesium

FORME / PRESENTATIONS :

Boxes of 7 and 16 effervescent tablets.

COMPOSITION :

Calcium carbonate	1250 mg
(Equivalent to 500 mg of calcium)	
Cholecalciferol concentrate	2 mg
(Equivalent to 5 µg of vitamin D3)	
Ascorbic acid (vitamin C)	120 mg
Magnesium oxide light	100 mg
(Equivalent to 60 mg of magnesium)	

EXCIPIENTS :

Citric acid, sorbitol, sodium saccharin, sodium bicarbonate, ester sucrose, macrogol, flavor, riboflavin sodium phosphate.

INDICATIONS :

C

tin and calcium l

D Lot N°:

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Maroc
Pharmacien Responsable : O. MOTIL

A

II A ut. av. :

link after compl
as a part of hei

C

PPC (DH) :

ue 8,2

H

I

P

730 120.01. 19

6 111250 430265

65/65

ue	8,2
s	
acids	

Food supplement, it is not a
Close the tube immediately after
Keep out of reach of child
Store in a cool and dry pla

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Qualified person : O. MOTIL

AGENOS®

Calcium

Vitamin D3

Vitamin C

Magnesium

FORME / PRESENTATIONS :

Boxes of 7 and 16 effervescent tablets.

COMPOSITION :

Calcium carbonate	1250 mg
(Equivalent to 500 mg of calcium)	
Cholecalciferol concentrate	2 mg
(Equivalent to 5 µg of vitamin D3)	
Ascorbic acid (vitamin C)	120 mg
Magnesium oxide light	100 mg
(Equivalent to 60 mg of magnesium)	

EXCIPIENTS :

Citric acid, sorbitol, sodium saccharin, sodium bicarbonate, ester sucrose, macrogol, flavor, riboflavin sodium phosphate.

INDICATIONS :

C

tin and calcium l

D Lot N°:

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Maroc
Pharmacien Responsable : O. MOTIL

A

II A ut. av.:

link after compl
as a part of hei

C

PPC (DH):

ue 8,2

H

P

730 120.01. 19

6 111250 430265

65/65

ue	8,2
s	
acids	

Food supplement, it is not a
Close the tube immediately after
Keep out of reach of child
Store in a cool and dry place

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Qualified person : O. MOTIL

AGENOS®

Calcium

Vitamin D3

Vitamin C

Magnesium

FORME / PRESENTATIONS :

Boxes of 7 and 16 effervescent tablets.

COMPOSITION :

Calcium carbonate	1250 mg
(Equivalent to 500 mg of calcium)	
Cholecalciferol concentrate	2 mg
(Equivalent to 5 µg of vitamin D3)	
Ascorbic acid (vitamin C)	120 mg
Magnesium oxide light	100 mg
(Equivalent to 60 mg of magnesium)	

EXCIPIENTS :

Citric acid, sorbitol, sodium saccharin, sodium bicarbonate, ester sucrose, macrogol, flavor, riboflavin sodium phosphate.

INDICATIONS :

C

min and calcium l

D Lot N°:

A

II A ut. av.:

C

PPC (DH):

H

C

N

730 120.01. 19

Food supplement, it is not a
Close the tube immediately after
Keep out of reach of child
Store in a cool and dry place

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Maroc
Pharmacien Responsable : O. MOTIL



6 111250 430265

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Qualified person : O. MOTIL

AGENOS®

Calcium

Vitamin D3

Vitamin C

Magnesium

FORME / PRESENTATIONS :

Boxes of 7 and 16 effervescent tablets.

COMPOSITION :

Calcium carbonate	1250 mg
(Equivalent to 500 mg of calcium)	
Cholecalciferol concentrate	2 mg
(Equivalent to 5 µg of vitamin D3)	
Ascorbic acid (vitamin C)	120 mg
Magnesium oxide light	100 mg
(Equivalent to 60 mg of magnesium)	

EXCIPIENTS :

Citric acid, sorbitol, sodium saccharin, sodium bicarbonate, ester sucrose, macrogol, flavor, riboflavin sodium phosphate.

INDICATIONS :

C

min and calcium l

D Lot N°:

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Maroc
Pharmacien Responsable : O. MOTIL

A

II A ut. av. :

link after compl
as a part of hei

C

PPC (DH) :

ue 8,2

H

D

730 120.01. 19

6 111250 430265

65/65

ue	8,2
s	
acids	

Food supplement, it is not a
Close the tube immediately after
Keep out of reach of child
Store in a cool and dry place

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Qualified person : O. MOTIL

AGENOS®

Calcium

Vitamin D3

Vitamin C

Magnesium

FORME / PRESENTATIONS :

Boxes of 7 and 16 effervescent tablets.

COMPOSITION :

Calcium carbonate	1250 mg
(Equivalent to 500 mg of calcium)	
Cholecalciferol concentrate	2 mg
(Equivalent to 5 µg of vitamin D3)	
Ascorbic acid (vitamin C)	120 mg
Magnesium oxide light	100 mg
(Equivalent to 60 mg of magnesium)	

EXCIPIENTS :

Citric acid, sorbitol, sodium saccharin, sodium bicarbonate, ester sucrose, macrogol, flavor, riboflavin sodium phosphate.

INDICATIONS :

C

min and calcium l

D Lot N°:

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Maroc
Pharmacien Responsable : O. MOTIL

A

II A ut. av. :

link after compl
as a part of hei

C

PPC (DH) :

ue 8,2

H

P

730 120.01. 19

6 111250 430265

65/65

acids
gar

Food supplement, it is not a
Close the tube immediately after
Keep out of reach of child
Store in a cool and dry pla

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Qualified person : O. MOTIL

AGENOS®

Calcium

Vitamin D3

Vitamin C

Magnesium

FORME / PRESENTATIONS :

Boxes of 7 and 16 effervescent tablets.

COMPOSITION :

Calcium carbonate	1250 mg
(Equivalent to 500 mg of calcium)	
Cholecalciferol concentrate	2 mg
(Equivalent to 5 µg of vitamin D3)	
Ascorbic acid (vitamin C)	120 mg
Magnesium oxide light	100 mg
(Equivalent to 60 mg of magnesium)	

EXCIPIENTS :

Citric acid, sorbitol, sodium saccharin, sodium bicarbonate, ester sucrose, macrogol, flavor, riboflavin sodium phosphate.

INDICATIONS :

C

min and calcium l

D Lot N°:

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Maroc
Pharmacien Responsable : O. MOTIL

A

II A ut. av. :

link after compl
as a part of hei

C

PPC (DH) :

ue 8,2

H

D

730 120.01. 19

6 111250 430265

65/65

ue	8,2
s	
acids	

Food supplement, it is not a
Close the tube immediately after
Keep out of reach of child
Store in a cool and dry place

MC Laboratoire pharmaceutique
PHARMA

Lot Bachikou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Qualified person : O. MOTIL

ESCIPLEX 10 mg et 20 mg,
comprimé pelliculé sécable
Escitalopram



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

4.
AB
5. CON
comprimé pelliculé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1.

LOT 230549 1
EXP 01 2025
PPV 126.00



Esciplex® 10 mg
Boîte de 28 comprimés pelliculés
Sécables
AMM N° 130/21/NRQd/DMP/VHA/18



6 118000 022787

de sérotonine. Les dysfonctionnements du système sérotoninergique sont

considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

ESCIPLEX contient de l'escitalopram est utilisé pour traiter la dépression (épisodes dépressifs majeurs) et troubles anxieux (tels que le trouble panique avec ou sans agoraphobie, trouble anxiété sociale, le trouble anxie généralisée et les troubles obsessionnel-compulsifs) chez les adultes de plus de 18 ans.

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commeniez à vous sentir mieux. Continuez prendre ESCIPLEX même si vous commencez à ressentir une amélioration. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS DE PRENDRE ESCIPLEX ?

Le comprimé pelliculé sécable dans

l'escitalopram est composé

également (liste

d'autres médicaments)

appartenant à la famille des inhibiteurs de la MAO, dont la sélégiline (utilisé le traitement de la maladie de Parkinson), le moclobémide (utilisé également le traitement de la dépression) et l'isoxétamidate (un antibiotique).

Si vous êtes né avec ou si vous avez eu un épisode de trouble cardiaque (observé à l'ECG, en réalisant pour évaluer comment le cœur fonctionne),

vous prenez des traitements pour les rythmes cardiaques qui peuvent affecter votre rythme cardiaque (voir rubrique « Autres médicaments ESCIPLEX »).

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétante. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières tissu-plasma et placentaires; ils passent également dans le lait maternel.

La dose quotidienne recommandée est de 5 mg par jour, soit 1 comprimé dragéifié. La dose peut être augmentée progressivement jusqu'à 10 mg par jour. Les doses supérieures doivent être prescrites avec prudence.

Indication : Les symptômes d'anxiété et de tension psychique.

Posologie : 3-4 dragées par jour, au moins 1 heure avant les repas.

Directions : Patient : prendre la posologie prescrite. Enfants : prendre la posologie prescrite.

Enfants : prendre la posologie prescrite.

COMPOSITION :

Clidinium bromure (DCI) 2,5 mg

Chlordiazépoxide 5 mg

Excipients q.s.p 1 comprimé dragéifié

Excipients à effet notable :

Lactose et saccharose.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

ites environ pendant la phase

de 1% d'une dose orale est

changé. La désalkylation et

nce aux métabolites suivants,

oxépam, desméthylchlordiazepam.

forme de conjugués inactifs

équilibre du chlordiazépoxide

les métabolites s'accumulent

ne inchangée dans l'intestin

que comportant une amine

retrové dans les fèces

la dose orale est soumise

à un métabolisme dans l'urine s'effectue

en moyenne de 20 heures.

ils digestifs à composante

e demi-heure avant les

s augmenter peu à peu

s dragées peuvent être

Librax® 5/2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

LOT 23053 PER 03/2026
PPV 21.00 DH

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétante. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières tissu-plasma et placentaires; ils passent également dans le lait maternel.

La dose quotidienne recommandée est de 5 mg par jour, soit 1 comprimé dragéifié. La dose peut être augmentée progressivement jusqu'à 10 mg par jour. Les doses supérieures doivent être prescrites avec prudence.

Indication : Les symptômes d'anxiété et de tension psychique.

Posologie : 3-4 dragées par jour, au moins 1 heure avant les repas.

Directions : Patient : prendre la posologie prescrite. Enfants : prendre la posologie prescrite.

Enfants : prendre la posologie prescrite.

COMPOSITION :

Clidinium bromure (DCI) 2,5 mg

Chlordiazépoxide 5 mg

Excipients q.s.p 1 comprimé dragéifié

Excipients à effet notable :

Lactose et saccharose.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

ites environ pendant la phase

de 1% d'une dose orale est

changé. La désalkylation et

nce aux métabolites suivants,

oxépam, desméthylchlordiazepam.

forme de conjugués inactifs

équilibre du chlordiazépoxide

les métabolites s'accumulent

ne inchangée dans l'intestin

que comportant une amine

retrouvé dans les fèces

la dose orale est soumise

à un métabolisme important dans l'urine s'effectue

en moyenne de 20 heures.

ne inchangée dans l'intestin

que comportant une amine

retrouvé dans les fèces

la dose orale est soumise

à un métabolisme important dans l'urine s'effectue

en moyenne de 20 heures.

les digestifs à composante

e demi-heure avant les

s augmenter peu à peu

s dragées peuvent être

Librax® 5/2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

LOT 23053 PER 03/2026
PPV 21.00 DH

ESCIPLIX 10 mg et 20 mg,
comprimé pelliculé sécable
Escitalopram

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?
3. COMBIEN DE COMPRIMÉS POURRAUT-ON PRENDRE PAR JOUR?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES?
5. COMMENT SE PRENDRE ESCIPLIX?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?

Esciplex® 10 mg
Boîte de 28 comprimés pelliculés
Sécables
AMM N° 234/14 DMP/21/NNP



6 118000 022787

... serotonergique sont

considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

ESCIPLIX contient de l'escitalopram et est utilisé pour traiter la dépression (épisodes dépressifs majeurs) et les troubles anxieux (tels que le trouble panique avec ou sans agoraphobie, le trouble anxiété sociale, le trouble anxiété généralisée et les troubles obsessionnels compulsifs) chez les adultes de plus de 18 ans.

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commencez à vous sentir mieux. Continuez à prendre ESCIPLIX même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?

LOT 230891 1
EXP 02 2025
PPV 126.00



126.00

... utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le traitement de la dépression) et le inézolide (un antibiotique), si vous êtes né avec ou si vous avez présenté un épisode de trouble du rythme cardiaque (observé à l'ECG, un examen réalisé pour évaluer comment votre cœur fonctionne), si vous prenez des traitements pour des troubles du rythme cardiaque qui pourraient affecter votre rythme cardiaque, voir rubrique « Autres médicaments et ESCIPLIX »).



ALPRAZ 0,5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT INDESIRABLES EVENT
5. COMMENT CONSE
- comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUP

1. QU'EST-CE QUE ALP
sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

2. QUELLES SONT LES INF
A CONNAITRE AVANT D
ALPRAZ, comprimé sécable

Contre-indications

Si votre médecin vous a info
intolérance au sucre, conta
de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ sécable dans les cas suiv

- allergie connue à cette clas
- ou à l'un des composants du
- insuffisance respiratoire gr
- syndrome d'apnée du som
- respiratoires pendant le son
- insuffisance hépatique gra
- myasthénie (maladie car
- une tendance excessive
- musculaire).

En cas de doute, il est indis
demander l'avis de votre m
votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mi spéciales

Ce traitement médicamenteux
lui seul résoudre les difficult
anxiété. Il convient de dema
à votre médecin. Il vous i
conduites pouvant aider à
l'anxiété.

Mises en garde

Si une partie d'efficacité su

Alpraz® 0,5 mg

28 comprimés sécables



6 118000 020530

- dose,
- antécédents d'autres d
- médicamenteuses ou no

LOT	223843	1
EXP	11/2005	
PPV	35.70	



importante, insomnie, douleur

alco