

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0013697

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 50082 Société : 181538

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse : HAYINARA 1 RS DEL BOUSTANE IMM. IT 3 APPT 8
AIN CHOK COUSA

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 19/10/2021

Nom et prénom du malade : Mohamed Mkhenter Fehme

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète - HTA

Affection longue durée ou chronique :

☒ ALD ☐ ALC

Pathologie : Diabète HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : AA

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/10/23			25301	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
10/10/23		2636,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	11-10-23	B240	340,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION			
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
	25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 G 00000000 35533411 11433553 B		
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		
COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Bouchra ALAOUI EL HASSANI

Endocrinologue - Diabétologue
Nutritionniste

الدكتورة بشرى العلوي الحسني

أخصائية في أمراض الغدد والسكري والتغذية

Casablanca, le :

10/10/23

☐ Glycémie à jeun

☐ Glycémie Post-Prandiale
(2 heures après le repas)

☐ Hémoglobine glyquée (Hb A 1C)

☐ Fructosamine

☐ Triglycerides

☐ Cholesterol total

HDL

LDL

☐ Urée

☐ Créatinine

☐ Microalbumunurie sur les urines de 24h

☐ ECBU

☐ TGO/TGP/GGT

☐ Sérologie Hépatite B et C

☐ NFS + Plaquettes

☐ Uricémie

☐ Calcémie

☐ PSA

☐ CRP

☐ VS

☐ FERRITINEMIE

☐ VIT D3

☐ TSH
U-S

☐ T₄L

☐ T₃L

☐ Anticorps anti TPO

☐ Anticorps anti recepteurs TSH

☐ Cortisol libre Urinaire

☐ Cortisolémie - 8h

☐ - 16h

☐ Prolactinémie à - 10h

☐ FSH

☐ LH

☐ IGF₁

☐ Anticorps anti gliadine

antiendomysium

Anti Glutaminases

☐ Testosteronémie

☐ 17 OH Progesterone

☐ Dérivés méthoxylés

RV. le :

Casablanca Ahl Loughlem, Bd. Mohamed Zefzaf
Résidence Arrayane 2, Imm. 2, 3^{ème} Etage, N°49
(en face de Maroc Telecom, Annasi)
Fixe : 05 22 74 76 28 - 05 22 74 73 00
GSM: 07 67 56 03 95

الدار البيضاء، أهل لغلام، شارع محمد الزفزاف، إقامة الريان 2
الطابق 3، رقم 49 (أمام وكالة اتصالات المغرب، أناسي)
الهاتف : 05 22 74 73 00 - 05 22 74 76 28
المحمول : 07 67 56 03 95

Dr Bouchra ALAQUI EL HASSANI

Endocrinologue - Diabétologue
Nutritionniste

الدكتورة بشرى العلوي الحسني

أخصائية في أمراض الغدد والسكري والتغذية

Casablanca, le 10/10/2023

Mme MKHANTER Fatna

AMAREL 2MG

2cp le matin et 1cp à midi avant repas, pendant 6 mois

COTAREG 160/25

1cp le matin, pendant 6 mois

VIGAMFER

1cp à sucer par jour, pendant 2 mois

LIXIFOR GELULES

1gelule le soir, pendant 1 mois

Docteur A. TAKI IMRANI - Pharmacien Biologiste -
Bactériologie - Biologie Moléculaire - Biochimie - Hématologie



- Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles -
Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie

Date du prélèvement : 11-10-2023 à 11:29
Code patient : 1904080031
Né(e) le : 01-01-1944 (79 ans)
Edité le : 11-10-2023



Mme MKHANTAR Fatna
Dossier N° : 2310110033
Prescripteur : Dr ALAOUI EL HASSANI Bouchra

HEMATOCYTOLOGIE

(Yumizen H550 /Sysmex XS-1000i)

NUMERATION FORMULE SANGUINE

				08-04-2019
GLOBULES ROUGES (Erythrocytes)	4.44	M/mm ³	(4.20-5.55)	4.77
Hémoglobine	12.3	g/dL	(12.0-16.0)	13.2
Hématocrite	36.6	%	(35.0-50.0)	38.4
VGM (Volume globulaire moyen)	82.4	fL	(80.0-100.0)	80.5
TCMH	27.7	pg	(27.0-32.0)	27.7
CCMH	33.6	g/100ml	(30.0-35.0)	34.4
GLOBULES BLANCS (Leucocytes)	7 610	/mm ³	(4 000-10 000)	7870
Polynucléaires Neutrophiles	53.0%	Soit 4 033 /mm ³	(2 000-7 500)	4061
Polynucléaires Eosinophiles	3.0%	Soit 228/mm ³	(100-600)	252
Polynucléaires Basophiles	0.3%	Soit 23/mm ³	(0-100)	8
Lymphocytes	35.7%	Soit 2 717/mm ³	(1 500-4 500)	2928
Monocytes	8.0%	Soit 609/mm ³	(40-800)	622
PLAQUETTES	239 000	/mm ³	(150 000-400 000)	217 000

Validé par : Dr Abdeladim TAKI IMRANI



Docteur A. TAKI IMRANI - Pharmacien Biologiste -
Bactériologie - Biologie Moléculaire - Biochimie - Hématologie



- Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles -
Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie

2310110033 - Mme Fatna MKHANTAR

BIOCHIMIE SANGUINE

COBAS C311(ROCHE)/KONELAB 20(THERMO)/HLC-723 GX (Tosoh)


Hémoglobine glyquée (HBA1c)
(HPLC -723 GX)

8.1 %

08-04-2019
8.9

Interpretation:

4-6 Non diabétique
6-8 Métabolisme équilibré
>8 Métabolisme non équilibré



Urée
(Technique enzymatique à l'uréase UV)

0.42 g/L (0.10-0.50)
6.99 mmol/L (1.67-8.33)


08-04-2019
0.35

Créatinine
(Technique colorimétrique Jaffé)

8.00 mg/L (6.00-13.00)
70.8 µmol/L (53.1-115.1)

08-04-2019
6.60

Validé par : Dr Abdeladim TAKI IMRANI



Laboratoire BORJ EL BERNOUSSI d'Analyses Médicales

DOCTEUR Abdeladim TAKI IMRANI : Pharmacien Biologiste, Diplômé de l'Université libre de Bruxelles

BACTERIOLOGIE - BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE -

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE - VIROLOGIE

612, Bd Souhaib Aroumi - Sidi EL Bernoussi - Casablanca - Tél : 0522 73 32 49 - Fax : 0522 75 79 84

ICE : 001626088000055 - R.C. CASA : 360178 - PATENTE : 316384432 - C.N.S.S : 2928309

I.Fiscal : 36000150 - INPE : 093000545

FACTURE N° : 230007022

INPE :



093000545

CASABLANCA le 11-10-2023

Mme MKHANTAR Fatna

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E20	E
0111	Créatinine	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0216	Numération formule	B80	B
	Urée	B30	B

Total des B : 240

TOTAL DOSSIER : 340.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent quarante dirham .

LABORATOIRE BORJ EL BERNOUSSI
ACCUEIL - ANALYSES
612, Bd Souhaib Aroumi
Sidi EL Bernoussi - Casablanca
Tél: 0522 73 32 49 - Fax: 0522 75 79 84

LIXIFOR

COMPOSITION : Dose par gélule

- Séné	140 mg
- Radis Noir	5 mg
- Anis Etoilé	mg
- Cascara	mg

Lot/À cc
de préfé

X1029

1226

LOT

PER

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spéc

Prix

99-00

- Régulation du volume et de la fréquence
- Réduction des gaz
- Ballonnement et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal

LIXIFOR

COMPOSITION : Dose par gélule

- Séné	140 mg
- Radis Noir	75 mg
- Anis Etoilé	5 mg
- Cascara	0 mg

Lot/À
de pré

X1030 1226

317M

LOT

PER

Prix

99.00

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour

- Régulation du volume et de la
- Réduction des gaz
- Ballonnement et pesanteur abdo
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal

لك الطبيب جرعة 12.5/160 ملغ 12.5 (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 12.5 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد)، ثم قد ينتقل من قرص كوتاريغ 25/160 ملغ (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 25 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد).

لا يرتبط تحديد الجرعة بعمر المريض. لم يتم تقييم فعالية وسلامة العلاج لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 سنة. كما لا ينصح باستخدام دواء كوتاريغ من قبل الأطفال والمراهقين، يجب ابتلاع أقراص دواء كوتاريغ مع سوائل قليلة بعيدا عن الوجبات. ومع ذلك، من الأفضل أخذ دواء كوتاريغ دائما في نفس الوقت من اليوم (على سبيل المثال في الصباح).

إذا نسيت أخذ الدواء، خذ الجرعة التالية كالمعتاد؛ لا تضاعف الجرعة!

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك، إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

لا تقم بتغيير الجرعة الموصوفة بنفسك. تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا شعرت أن فعالية الدواء ضعيفة أو قوية للغاية.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لدواء كوتاريغ؟

قد ينتج عن أخذ دواء كوتاريغ أعراض جانبية:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً: الصداع، التعب، التنميل، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، السعال، نزلات البرد، التهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي العلوي، قلة الشهية، الإسهال، الطفح الجلدي، آلام الظهر وآلام المفاصل والعجز.

الأعراض الجانبية غير الشائعة: تعذر الحمل عن الأعراض التالية: التهابات الفيروسية، الأرق، القلق، الاضطرابات الحسية،

أذن، خفقان، تسارع ضربات القلب،

التهاب الشعب الهوائية، ضيق

نفس، جفاف الفم، الجفاف، آلام في

ألم في الذراعين، في الساقين، في

تواء والسلالات، تشنجات العضلات،

نقص الرغبة الجنسية.



لك الطبيب جرعة 12.5/160 ملغ 12.5 (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 12.5 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد)، ثم قد ينتقل من قرص كوتاريغ 25/160 ملغ (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 25 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد).

لا يرتبط تحديد الجرعة بعمر المريض. لم يتم تقييم فعالية وسلامة العلاج لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 سنة. كما لا ينصح باستخدام دواء كوتاريغ من قبل الأطفال والمراهقين، يجب ابتلاع أقراص دواء كوتاريغ مع سوائل قليلة بعيدا عن الوجبات. ومع ذلك، من الأفضل أخذ دواء كوتاريغ دائما في نفس الوقت من اليوم (على سبيل المثال في الصباح).

إذا نسيت أخذ الدواء، خذ الجرعة التالية كالمعتاد؛ لا تضاعف الجرعة!

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك، إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

لا تقم بتغيير الجرعة الموصوفة بنفسك. تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا شعرت أن فعالية الدواء ضعيفة أو قوية للغاية.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لدواء كوتاريغ؟

قد ينتج عن أخذ دواء كوتاريغ أعراض جانبية:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً: الصداع، التعب، التنميل، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، السعال، نزلات البرد، التهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي العلوي، قلة الشهية، الإسهال، الطفح الجلدي، آلام الظهر وآلام المفاصل والعجز.

الأعراض الجانبية غير الشائعة: تعذر الحمل عن الأعراض التالية: التهابات الفيروسية، الأرق، القلق، الاضطرابات الحسية،

أذن، خفقان، تسارع ضربات القلب،

التهاب الشعب الهوائية، ضيق

نفس، جفاف الفم، الجفاف، آلام في

ألم في الذراعين، في الساقين، في

تواء والسلالات، تشنجات العضلات،

نقص الرغبة الجنسية.



PPV : 205.00 DH

لك الطبيب جرعة 12.5/160 ملغ 12.5 (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 12.5 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد)، ثم قد ينتقل من قرص كوتاريغ 25/160 ملغ (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 25 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد).

لا يرتبط تحديد الجرعة بعمر المريض. لم يتم تقييم فعالية وسلامة العلاج لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 سنة. كما لا ينصح باستخدام دواء كوتاريغ من قبل الأطفال والمراهقين، يجب ابتلاع أقراص دواء كوتاريغ مع سوائل قليلة بعيدا عن الوجبات. ومع ذلك، من الأفضل أخذ دواء كوتاريغ دائما في نفس الوقت من اليوم (على سبيل المثال في الصباح).

إذا نسيت أخذ الدواء، خذ الجرعة التالية كالمعتاد؛ لا تضاعف الجرعة!

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك، إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

لا تقم بتغيير الجرعة الموصوفة بنفسك. تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا شعرت أن فعالية الدواء ضعيفة أو قوية للغاية.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لدواء كوتاريغ؟

قد ينتج عن أخذ دواء كوتاريغ أعراض جانبية:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً: الصداع، التعب، التنميل، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، السعال، نزلات البرد، التهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي العلوي، قلة الشهية، الإسهال، الطفح الجلدي، آلام الظهر وآلام المفاصل والعجز.

الأعراض الجانبية غير الشائعة: تعذر الحمل عن الأعراض التالية: التهابات الفيروسية، الأرق، القلق، الاضطرابات الحسية،

أذن، خفقان، تسارع ضربات القلب،

التهاب الشعب الهوائية، ضيق

نفس، جفاف الفم، الجفاف، آلام في

ألم في الذراعين، في الساقين، في

تواء والسلالات، تشنجات العضلات،

نقص الرغبة الجنسية.



لك الطبيب جرعة 12.5/160 ملغ 12.5 (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 12.5 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد)، ثم قد ينتقل من قرص كوتاريغ 25/160 ملغ (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 25 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد).

لا يرتبط تحديد الجرعة بعمر المريض. لم يتم تقييم فعالية وسلامة العلاج لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 سنة. كما لا ينصح باستخدام دواء كوتاريغ من قبل الأطفال والمراهقين، يجب ابتلاع أقراص دواء كوتاريغ مع سوائل قليلة بعيدا عن الوجبات. ومع ذلك، من الأفضل أخذ دواء كوتاريغ دائما في نفس الوقت من اليوم (على سبيل المثال في الصباح).

إذا نسيت أخذ الدواء، خذ الجرعة التالية كالمعتاد؛ لا تضاعف الجرعة!

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك، إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

لا تقم بتغيير الجرعة الموصوفة بنفسك. تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا شعرت أن فعالية الدواء ضعيفة أو قوية للغاية.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لدواء كوتاريغ؟

قد ينتج عن أخذ دواء كوتاريغ أعراض جانبية:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً: الصداع، التعب، التنميل، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، السعال، نزلات البرد، التهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي العلوي، قلة الشهية، الإسهال، الطفح الجلدي، آلام الظهر وآلام المفاصل والعجز.

الأعراض الجانبية غير الشائعة: تعذر الحمل عن الأعراض التالية: التهابات الفيروسية، الأرق، القلق، الاضطرابات الحسية،

أذن، خفقان، تسارع ضربات القلب،

التهاب الشعب الهوائية، ضيق

نفس، جفاف الفم، الجفاف، آلام في

ألم في الذراعين، في الساقين، في

تواء والسلالات، تشنجات العضلات،

نقص الرغبة الجنسية.



لك الطبيب جرعة 12.5/160 ملغ 12.5 (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 12.5 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد)، ثم قد ينتقل من قرص كوتاريغ 25/160 ملغ (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 25 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد).

لا يرتبط تحديد الجرعة بعمر المريض. لم يتم تقييم فعالية وسلامة العلاج لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 سنة. كما لا ينصح باستخدام دواء كوتاريغ من قبل الأطفال والمراهقين، يجب ابتلاع أقراص دواء كوتاريغ مع سوائل قليلة بعيدا عن الوجبات. ومع ذلك، من الأفضل أخذ دواء كوتاريغ دائما في نفس الوقت من اليوم (على سبيل المثال في الصباح).

إذا نسيت أخذ الدواء، خذ الجرعة التالية كالمعتاد؛ لا تضاعف الجرعة!

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك، إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

لا تقم بتغيير الجرعة الموصوفة بنفسك. تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا شعرت أن فعالية الدواء ضعيفة أو قوية للغاية.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لدواء كوتاريغ؟

قد ينتج عن أخذ دواء كوتاريغ أعراض جانبية:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً: الصداع، التعب، التنميل، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، السعال، نزلات البرد، التهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي العلوي، قلة الشهية، الإسهال، الطفح الجلدي، آلام الظهر وآلام المفاصل والعجز.

الأعراض الجانبية غير الشائعة: تعذر الحمل عن الأعراض التالية: التهابات الفيروسية، الأرق، القلق، الاضطرابات الحسية،

أذن، خفقان، تسارع ضربات القلب،

التهاب الشعب الهوائية، ضيق

نفس، جفاف الفم، الجفاف، آلام في

ألم في الذراعين، في الساقين، في

تواء والسلالات، تشنجات العضلات،

نقص الرغبة الجنسية.



لك الطبيب جرعة 12.5/160 ملغ 12.5 (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 12.5 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد)، ثم قد ينتقل من قرص كوتاريغ 25/160 ملغ (وهو ما يعادل 160 ملغ من الفالسرتان و 25 ملغ من الهيدروكلوروثيازيد).

لا يرتبط تحديد الجرعة بعمر المريض. لم يتم تقييم فعالية وسلامة العلاج لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 سنة. كما لا ينصح باستخدام دواء كوتاريغ من قبل الأطفال والمراهقين، يجب ابتلاع أقراص دواء كوتاريغ مع سوائل قليلة بعيدا عن الوجبات. ومع ذلك، من الأفضل أخذ دواء كوتاريغ دائما في نفس الوقت من اليوم (على سبيل المثال في الصباح).

إذا نسيت أخذ الدواء، خذ الجرعة التالية كالمعتاد؛ لا تضاعف الجرعة!

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك، إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

لا تقم بتغيير الجرعة الموصوفة بنفسك. تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا شعرت أن فعالية الدواء ضعيفة أو قوية للغاية.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لدواء كوتاريغ؟

قد ينتج عن أخذ دواء كوتاريغ أعراض جانبية:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً: الصداع، التعب، التنميل، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، السعال، نزلات البرد، التهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي العلوي، قلة الشهية، الإسهال، الطفح الجلدي، آلام الظهر وآلام المفاصل والعجز.

الأعراض الجانبية غير الشائعة: تعذر الحمل عن الأعراض التالية: التهابات الفيروسية، الأرق، القلق، الاضطرابات الحسية،

أذن، خفقان، تسارع ضربات القلب،

التهاب الشعب الهوائية، ضيق

نفس، جفاف الفم، الجفاف، آلام في

ألم في الذراعين، في الساقين، في

تواء والسلالات، تشنجات العضلات،

نقص الرغبة الجنسية.



Amarel®

Glimpéride
Comprimé

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls le taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au glimépéride, aux autres sulfonurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antobactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

- si vous avez une maladie grave des reins ;
 - si vous avez une maladie grave du foie.
- Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous êtes blessés d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.
- Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).
- Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.
- Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)**
Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.
- Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :
 - malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;

- prise de pilules d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;

- fonction rénale diminuée ;

- maladie grave du foie ;

- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysoire ou des glandes surrénales) ;

- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;

- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;

- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réflexes, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.

- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angoisse de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre, par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou bûche sucrée. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

LOT : 21E001
PER : 06 2024

AMAREL 2MG
CP B30

P.P.V. : 60DH40

1180000060031

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amarel®

Glimpéride
Comprimé

Amarel 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls le taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au glimépéride, aux autres sulfonurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antobactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

- si vous avez une maladie grave des reins ;
 - si vous avez une maladie grave du foie.
- Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous êtes blessés d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection aux yeux, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.
- Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;

- prise de pilules d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;

- fonction rénale diminuée ;

- maladie grave du foie ;

- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysoire ou des glandes surrénales) ;

- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;

- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensoriels, vertiges, sensation de faiblesse ;
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angoisse de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre, par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou miel sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

LOT : 21E001

PER : 06 2024

CP B30

P.P.V. : 60DH40

1180000060031

6

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

1180000060031

Amarel®

Glimpéride
Comprimé

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls le taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au glimépéride, aux autres sulfonurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antobactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

- si vous avez une maladie grave des reins ;
 - si vous avez une maladie grave du foie.
- Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous êtes blessés d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.
- Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;

- prise de pilules d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;

- fonction rénale diminuée ;

- maladie grave du foie ;

• si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysoire ou des glandes surrénales) ;

- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;

- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensoriels, vertiges, sensation de faiblesse ;
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angoisse de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre, par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou bûche sucrée. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

LOT : 21E001
PER : 06 2024

6

CP B30

P.P.V. : 60DH40

1180000060031

060031

0

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

AMAREL 2MG

Amarel®

Glimpéride
Comprimé

Amarel 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls le taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au glimépéride, aux autres sulfonurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antobactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous êtes blessés d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de pilules d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysoire ou des glandes surrénales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensoriels, vertiges, sensation de faiblesse ;
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angoisse de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre, par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou bûche sucrée. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament pour le diabète, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de saignement ou de saignement prolongé.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque d'hypoglycémie.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque d'hypertension artérielle.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de diabète.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles du rythme cardiaque.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de la vision.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'audition.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'équilibre.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de la mémoire.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de la concentration.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'appétit.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de la digestion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'absorption.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'excrétion.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le risque de troubles de l'élimination.

La prise d'AMAREL, comprimé peut augmenter le

Amarel®

Glimpéride
Comprimé

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls le taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au glimépéride, aux autres sulfonurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antobactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous êtes blessés d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.
- Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).
- Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.
- Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)**
Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.
- Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :
 - malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

• modification du régime alimentaire ;

• prise de pilules d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;

• fonction rénale diminuée ;

• maladie grave du foie ;

• si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysoire ou des glandes surrénales) ;

• consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;

• prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;

• si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou

si vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes d'hypoglycémie incluent :

• faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, apathie, somnolence,

troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution

de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la

parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensoriels,

vertiges, sensation de faiblesse.

• les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite,

anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs

intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines

(angoisse de mort et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un

état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de

soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque,

une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à

une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement

après l'ingestion de sucre, par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou miel

sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par

contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace

ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé

régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang

pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

autre médicament, y compris un

Amarel®

Glimpéride
Comprimé

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls le taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au glimépéride, aux autres sulfonurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antobactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous êtes blessé d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de pilules d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysoire ou des glandes surrénales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réflexions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensoriels, vertiges, sensation de faiblesse ;
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angoisse de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre, par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou bile sucrée. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, y compris un médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.



0

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris un autre médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments.

1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRENE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMADEI comprises a unit on summertime in southern Africa.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMBITI

COMPRIME ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au glimepiride, aux autres sulfamylures (si vous êtes allergique à l'un de ces médicaments) ou au sucre dans le sang, tels que le (les) médicament(s) utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide, aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et sèches, douleurs musculaires) ;

- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament informez votre médecin ou votre pharmacien de

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé. Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires énumérées sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypodolémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne :

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrénales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- **faim** intense, maux de tête, nausées, vomissements, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réflexes, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse

- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (anxiété de mortine et troubles de rythme cardiaque)

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypovolémie

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines, ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

autre médicament, y compris un
riez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.

La dose d'AMAREL, comprimés si vous
prenez :
- sur-tout peuvent diminuer ou augmenter
- aux de sucre dans le sang.
- au du taux de sucre dans le sang) peut être
- et entraîner un risque d'hypoglycémie :
- liable (tels que l'insuline ou la metformine)
- ou l'inflammation (généralisation).

AMAREL 2M
CP B30
P.P.V. : 60DH
118000
6

l'effet d'A
augment
autres
médic

azoprop
• méd
antibac

- médicaments pour coaguler le sang (antivitamines K de type coumarine) tels que la warfarine ;

- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

