

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : **00626**

Société : **R A M**

Actif

Pensionné(e)

Autre : **RETRAITE**

Nom & Prénom : **TADILI SIDI REDONANE**

Date de naissance : **07/08/1944**

Adresse : **17, RUE AL BATTANI - ALAL - RABAT - 10090**

Desousne.tadili.95@gmail.com

Tél. : **0661 330226** Total des frais engagés : **1498.40 Dhs**

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : **13/09/2023**

Nom et prénom du malade : **TADILI Sidi Redonane** Age : **78**

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : **Cardiopathie ischémique**


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **RABAT** Le **15 NOV 2023**

Signature de l'adhérent(e) : **RA ACCUEIL** Le **18/09/2023**



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/05/2024	CS ECG	300,00 DT	Dr Kaoutar EL OUARDI Spécialiste en Maladie du Cœur et des Vaisseaux INP : 101254421	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
صيدلية القبيبات PHARMACIE DE KHEBIBAT SEDRATI M. PHARMACIEN 7, Rue Omar Slaoui KEBIBAT - RABAT Tel : 69.05.07	18.09.23	1198.40



**PHARMACIE DE KHEBIBAT
SEDRATI M. PHARMACIEN**
7, Rue Omar Slaoui KEBIBAT - RABA
Tel : 69.05.07

Cachet et signature de l'abonataire et du Radiotéléphoniste

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. EL OUARDIGHI Kaoutar

Spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux

Ancienne Cardiologue de l'Hôpital Érasme de Bruxelles - Belgique

Ancienne Interne du CHU Ibn Sina de Rabat

Diplôme de Cardiologie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

Diplôme d'Echocardiographie et d'imagerie vasculaire

non invasive de l'Université de Bordeaux - France

د. الورديغي كوثر

أخصائية في أمراض القلب والشرايين

طبيبة سابقة في مستشفى إبرازم بروكسل - بلجيكا

طبيبة داخلية سابقة في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط

دبلوم التخصص في أمراض القلب والشرايين من كلية الطب والصيدلة بالرباط

دبلوم في الفحص بالصدى والدوبلير من جامعة بوردو فرنسا

Rabat le :

18/09/2023

Mr TADILI SIDI REDOUAN

ORDONNANCE

$270,00 \times 2 =$ CO-PLAVIX 100/75 MG

1cp/j le matin

$185,20 \times 2 =$ SULIAT 10/160/25 MG

1cp/j le matin

— ROSUVASTATINE Sandoz 10MG

1cp/j le soir après repas

$96,00 \times 3 =$ PRAZOL 20 MG

1gel/j le matin à jeun

(- Traitement de 3 mois -)

الفيسبوك
PHARMACIE DE KEBIBAT
SEDRATI M. Pharmacie
1, Rue Omar Slaoui KEBIBAT
Tél : 69.05.07

صيدلية القبيبات
PHARMACIE DE KHEBIBAT
SEDRATI M. PHARMACIEN
1, Rue Omar Slaoui KEBIBAT - RABAT
Tél : 69.05.07

Dr Kaoutar EL OUARDIGHI
Spécialiste en Maladie
du Cœur et des Vaisseaux

SULIAT® HCT

160 mg/5 mg/12.5 mg

160 mg/5 mg/25 mg

160 mg/10 mg/12.5 mg

160 mg/10 mg/25 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28
Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à : Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient "grave" ou si vous remarquez un effet indésirable non médicament ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1- Qu'est-ce que SULIAT HCT et dans quel cas est-il utilisé ?

2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT HCT ?

3- Comment prendre SULIAT HCT ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver SULIAT HCT ?

6- Informations supplémentaires

1- QUEST-CE QUE SULIAT HCT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Rode ATC : C09CX01

Les comprimés de SULIAT HCT contiennent trois substances actives : Valsartan, Amlodipine contribuent au contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est élevée.

- L'Amlopédine appartient à un groupe de substances appelées « inhibiteurs calciques ». L'Amlopédine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à réduire la pression artérielle.

- Le Valsartan appartient à une classe de substances appelées « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

- L'Hydrochlorthiazide appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques qui augmentent le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle. Du fait de ces trois mécanismes, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension

Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes pris de l'Amlopédine, de Valsartan et d'Hydrochlorthiazide et qui peuvent bénéficier de ces substances.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - Indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également recommandé d'éviter.

- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan ou à d'autres médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'Hydrochlorthiazide.

- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale (GFR <60 ml/min/1,73 m²) et vous prenez SULIAT HCT en association avec des médicaments contenant de l'Aliskiren.

- Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.

- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation de bile dans le foie (cholestase).

- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

- Si vous êtes incapable d'uriner (urinie).

- Si vous prenez trop de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.

- Si vous prenez trop de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).

- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

- Si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant d'Aliskiren pour diminuer la pression artérielle.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou de magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de calcium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions, nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, motions fréquentes, soit faiblesse et contractions musculaires).

- Si vous avez des problèmes rénaux, il vous a été donné une greffe de rein ou si vous étiez informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.

- Si vous avez des problèmes hépatiques.

- Si vous avez ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine / Valsartan/Hydrochlorthiazide (10 mg/330 mg/25 mg).

- Si vous présentez une crise cardiaque. Suivez strictement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi modifier votre fonction rénale.

- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaississement de votre muscle cardiaque est augmenté de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).

- Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrenales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes atteint de cette situation.

- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythématoïde disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).

- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs ou à des diurétiques (des médicaments utilisés pour augmenter la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.

- Si vous êtes malade (voisements ou diarrhée).

- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT HCT.

- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, prévenez votre médecin le plus rapidement possible.

- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil ou pouvant survenir dans les heures voire dans la semaine qui suivent la prise de SULIAT HCT. Ceci peut entraîner des troubles de la vision permanents, en l'absence de traitement.

- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :

- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) (par exemple Enapril, Lisinopril, Ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.

- Aliskiren.

- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Risque accru de cancer de la peau non-mélanomate (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorthiazide (HCTZ).

- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à de signaler toute lésion cutanée suspecte ;

- Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique ;

- Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir

une protection adéquate en cas d'exposition solaire ;

- L'utilisation d'HCTZ doit aussi être réexaminée avec attention.

Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessous, parlez à votre

HCTZ n'est pas recommandé chez les personnes de 65 ans et plus.

Utilisé par les personnes âgées de 65 ans et plus, l'efficacité et la tolérance de l'HCTZ sont comparables à celles des personnes plus jeunes.

Si vous avez une maladie cardiaque ou si vous prenez certains médicaments.

comprimés pelliculés, avec d'autres médicaments.

comprimés pelliculés, avec d'autres

SULIAT® HCT

160 mg/5 mg/12.5 mg
160 mg/5 mg/25 mg
160 mg/10 mg/12.5 mg
160 mg/10 mg/25 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56
Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être dangereux.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en parler à votre pharmacien.

Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SULIAT HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT HCT ?
- Comment prendre SULIAT HCT ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SULIAT HCT ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SULIAT HCT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

Code ATC : C09CX01

Les comprimés de SULIAT HCT contiennent trois substances actives : Valsartan, Amlodipine et Hydrochlorothiazide. Ces substances contribuent au contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

L'Amlodipine appartient à un groupe de substances appelées « inhibiteurs calciques ».

Le Valsartan appartient à un groupe de substances appelées « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est une substance qui provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Le Hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés « diurétiques thiazidiques ». L'Hydrochlorothiazide augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Du fait de ces trois mécanismes, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la pression artérielle est déjà contrôlée par l'Amlodipine, du Valsartan et d'Hydrochlorothiazide et qui peuvent bénéficier de la prise d'un seul comprimé contenant ces substances.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - Indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT en début de grossesse.
- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'Hydrochlorothiazide, aux dérivés (des médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale (DFG <60 ml/min/1.73 m²) et vous prenez SULIAT HCT en association avec des médicaments contenant de l'alcispiride.
- Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation dans le foie (cholestase).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).
- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.
- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).
- Si vous présentez une maladie sévère de la pression artérielle (hypertension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle le cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.
- Si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant d'alcispiride pour la pression artérielle.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasme rythme cardiaque anormal).
- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).
- Si votre taux sanguin de calcium est bas (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, nausées fréquentes, soif, faiblesses et contractions musculaires).
- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous êtes informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous avez ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).
- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.

Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).

Si vous souffrez d'hypothyroïdostimulation. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone adrénergique. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.

Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythématoïde disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).

Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).

Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs ou à des diurétiques (des médicaments utilisés pour augmenter la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.

Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).

Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT HCT.

- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanescences pendant le traitement par SULIAT HCT, prévenez votre médecin le plus rapidement possible.

- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures voire dans la semaine qui suivent la prise de SULIAT HCT. Ceci peut entraîner des troubles de la vision permanents, en l'absence de traitement.

- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :

- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.

- Aliskiren.

Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ).

- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à déclarer toute lésion cutanée suspectée ;

- Les lésions cutanées suspectées doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique ;

- Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Ain sebaâ Casablanca

Copla/ix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V. : 270,00 DH

185,20

SULIAT® HCT

160 mg / 10 mg / 25 mg
28 comprimés pelliculés



6 118000 072348

ssum d'un

utilisé

tels que

dans le sang

de pointes

ques) et certai

lum dans le

ssum d'acide

g

l'acide

pe

Prazol® 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en demander une copie à votre pharmacien.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez des symptômes identiques d'autre, même en cas de symptômes identiques.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre, même en cas de symptômes identiques.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV : 96DH00

PER : 09/25

LOT : M1410-3

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI).....	20 mg
Excipients qsp	1 gélule

FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastrorésistants.
- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéruseuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

• Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

• Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :



Prazol® 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel en cas de symptômes identiques, cela peut être normal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV : 96DH00

PER : 09/25

LOT : M14/0-3

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI) 20 mg
Excipients qsp 1 gélule

FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastrorésistants.
- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

• Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

• Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :



Prazol® 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doumédecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne ! en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV : 96DH00

PER : 06/25

LOT : M2184

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI) 20 mg
Excipients qsp 1 gélule

FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastrorésistants.
- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours.

Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

