

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° M21- 0010530

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00626 Société : RAM  
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : RETRAITE  
 Nom & Prénom :  
 Date de naissance : 07-08-1944  
 Adresse : 17, rue AL SATIANI - AGDAL - 10900 - RABAT  
 Email : bedouane.tadili9@gmail.com  
 Tél. : 0661390246 Frais engagés : 233,40 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :  
 Date de consultation : 09/10/2023  
 Nom et prénom du malade : Mohamed Bedouane  
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
 Nature de la maladie : Bronchite chronique  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Rabat Le : 09/10/2023  
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/12/2023	CS	1	G	<div> <div>Pr. Jawad TADILI</div> <div>Professeur de l'enseignement supérieur</div> <div>Anesthésie - Réanimation</div> <div>RUCH</div> <div>Abn Sina - RABAT</div> </div>

**Pr. Jawad TADILI**  
Professeur de l'enseignement supérieur  
Anesthésie - réanimation  
RUCH  
CHU Ibn Sina - RABAT

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	N° de la Facture
صيدلية القديب PHARMACIE DE KEBIBAT SECRÉTARIAT M. PHARMACIEN 7, Rue Omar Sbaoui KEBIBAT - RABAT Tél : 69.05.07	09 10 28	233.40

PHARMACIE DE KEBIBAT  
102036316



[illegible][illegible]

## RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																																			
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COEFFICIENT DES TRAVAUX</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>MONTANTS DES SOINS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DEBUT D'EXECUTION</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>FIN D'EXECUTION</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div>																																		
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																																					
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>H</span> <span>G</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>25533412</span> <span>21433552</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>00000000</span> <span>00000000</span> </div> </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>D</span> <span>B</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>00000000</span> <span>00000000</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>35533411</span> <span>11433553</span> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> <b>(Création, remont, adjonction)</b>                      Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession                 </td> <td rowspan="10"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COEFFICIENT DES TRAVAUX</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>MONTANTS DES SOINS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DATE DU DEVIS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DATE DE L'EXECUTION</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> </td> </tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="3"></td></tr> </table>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>H</span> <span>G</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>25533412</span> <span>21433552</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>00000000</span> <span>00000000</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>D</span> <span>B</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>00000000</span> <span>00000000</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>35533411</span> <span>11433553</span> </div>		<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COEFFICIENT DES TRAVAUX</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>MONTANTS DES SOINS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DATE DU DEVIS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DATE DE L'EXECUTION</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div>																											
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>H</span> <span>G</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>25533412</span> <span>21433552</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>00000000</span> <span>00000000</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>D</span> <span>B</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>00000000</span> <span>00000000</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>35533411</span> <span>11433553</span> </div>																																			
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COEFFICIENT DES TRAVAUX</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>MONTANTS DES SOINS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DATE DU DEVIS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DATE DE L'EXECUTION</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div>																																		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

**Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.**

[illegible]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Pr. Jawad TADILI  
Professeur de l'enseignement supérieur  
Anesthésie - réanimation  
RUCH  
CHU Ibn Sina - RABAT

Rabat, 09/10/2023

M. TADILI Lidi Redouane

168,20

① Augmentin st 1g

14,00 x 2 =

② Doliprane 1000 mg

143,00

③ Rhocephin 1g

22,90

④ Bronchodilator s/s R10p

Pr. Jawad TADILI  
Professeur de l'enseignement supérieur  
Anesthésie - réanimation  
RUCH  
CHU Ibn Sina - RABAT

T = 233,40

صيدلية القبيبات  
PHARMACIE DE KHEBIBAT  
SEDRATIM PHARMACIEN  
7, Rue Omar Smaoui KEBIBAT - RABAT  
Tel : 69 05 07



**AUGMENTIN** 1 g/125 mg, ADULTES,

buvable en sachet-dose

**AUGMENTIN** 500 mg/62.5 mg ADULT

Amoxicilline/acide clavulanique

PPU: 168,20 DH  
LOT: 650427  
PER: 03/24

**AUGMENTIN** 1 g/125 mg  
16 sachets



**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre votre médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez de nouvelles questions, demandez plus d'information au médecin ou au pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant) et vous ne devez pas l'administrer à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les symptômes de la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que AUGMENTIN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Pourquoi sont les informations à connaître avant de prendre AUGMENTIN ?
3. Comment prendre AUGMENTIN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AUGMENTIN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL INDICÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : Association de pénicillines à large spectre - bêta-lactames

code ATC - J01CR02

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries

des maladies différentes, appelées amoxicilline et

appartenant à un groupe de médicaments appelés

d'être efficaces (être inactives). L'autre constitue

l'activation

AUGMENTIN agit contre :

infections de voies des tissus mous, in-

infections de l'oreille et des articulations.

infections des os et des articulations.

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

infection vus a informé(e) d'un

# bronchokod

carbocisté

**bronchokod**  
sans sucre Adultes

LOT:1173  
PER:12/24  
PPV:22,90DH

## FORMES ET PRESENTATIONS :

### • BRONCHOKOD SIROP

- Sirop enfants, flacon de 125 ml

- Sirop adultes { flacon de 125 ml  
flacon de 300 ml

### • BRONCHOKOD SANS SUCRE. Solution buvable

- Solution buvable adultes { flacon de 125 ml  
flacon de 300 ml

## COMPOSITION :

### BRONCHOKOD SIROP

	Sirop enfants	Sirop adultes
Carbocistéine	2 g	5 g
Excipient q.s.p	100 ml	100 ml

- Excipients à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle et Saccharose.

### BRONCHOKOD SANS SUCRE

	Solut. Buv. Adultes
Carbocistéine	5 g
Excipient q.s.p	100 ml

- Excipient à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle.

# Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL Comprimé

## DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose, maïs pré-gélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

## QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est utilisé dans des cas tels que maux de tête, états grippaux, douleurs musculaires et articulaires douloureuses. Il peut également être prescrit dans le traitement de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) : Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

### Contre-indications :

**Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants :**  
allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

## PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

### Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

### Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

**Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").**

### Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



# Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL Comprimé

## DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose, maïs pré-gélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

## QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est utilisé dans des cas tels que maux de tête, états grippaux, douleurs articulaires, douloureuses. Il peut également être prescrit dans le cadre de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

**Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants :**  
allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

## PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

## Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

*Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").*

## Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.





# RHINOFEBRAL®

Gélule, boîte de 20

Paracétamol/ Maléate de chlorphénamine/Acide ascorbique

- Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant les indications contenues dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

- Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, consultez votre médecin ou pharmacien.

- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous sentez moins bien après 5 jours de traitement.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que RHINOFEBRAL, gélule?
2. Quelles sont les informations à connaître?
3. Comment prendre RHINOFEBRAL, gélule?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver RHINOFEBRAL, gélule?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE RHINOFEBRAL, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : ANTALGIQUE

ANTIPIRETIQUE / ANTIHISTAMINIQUE INHIBITEUR DES RECEPTEURS H1 - N (Système nerveux central) / R (Système respiratoire)

Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient du paracétamol, un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C. Il est indiqué pour le traitement symptomatique de l'écoulement nasal lors d'un rhume avec maux de tête et/ou fièvre chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RHINOFEBRAL, gélule?

**Ne prenez jamais RHINOFEBRAL, gélule :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol, au maléate de chlorphénamine, à l'acide ascorbique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique : Informations complémentaires

- En cas de maladies associées à la rétention de fer, telles que l'hémochromatose, la thalassémie et l'anémie sidéroblastique,

- En cas d'insuffisance rénale sévère ou hémodialyse,

- Si vous avez une maladie grave du foie,

- Si vous avez une difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,

- Si vous avez un glaucome.

Ce médicament ne doit GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre RHINOFEBRAL, gélule.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prévenir immédiatement un médecin.

La prise concomitante de ce médicament en association avec l'alcool ou tous les médicaments contenant de l'alcool est déconseillée (voir RHINOFEBRAL, gélule avec de l'alcool).

**Ce médicament contient du paracétamol, du maléate de chlorphénamine, et de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie).**

En cas de survenue d'écoulement nasal purulent comme en cas d'aggravation ou en l'absence d'amélioration de votre état au bout de 5 jours de traitement (persistance de la fièvre...), CONSULTEZ UN MÉDECIN.

Il existe des médicaments plus adaptés pour les enfants de moins de 12 ans. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous ou votre enfant avez une maladie héréditaire rare appelée « déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase », demander l'avis de votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une maladie du foie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Des réactions cutanées graves ont été signalées très rarement chez des patients recevant du paracétamol. Par conséquent, arrêtez d'utiliser RHINOFEBRAL, gélule et contactez immédiatement votre médecin dès l'apparition d'une éruption cutanée ou tout autre signe d'hypersensibilité (tels que de la fièvre, des rougeurs ou de nombreuses petites pustules).

Demandez à un médecin avant utilisation en cas d'antécédents de calculs rénaux. L'acide ascorbique ne doit pas être administré à des doses supérieures à 1 gramme (1000 mg) aux patients atteints de lithiase rénale.

Si vous souffrez de glaucome (augmentation de la pression de l'œil), si vous avez du mal à uriner

d'origine prostatique, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection respiratoire chronique, un asthme bronchique ou lorsque vous consultez un médecin avant d'utiliser ce médicament.

Demandez à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament si vous êtes traité par des dépresseurs du système nerveux central. La chlorphénamine peut aggraver les effets de ces médicaments.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une affection du système nerveux central, y compris l'épilepsie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.