

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Declaration de Maladie

N° W21-653718

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ A

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 929 Société : 188874

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : H. A. Mou KHADIJA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : 15 NOV. 2023

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur FARADI Hasnaa
Médecine Générale
Echographie Urgence
Du Gynécologie Médical Infertilité
Suivi de Grossesse
Du Diabète
Du Rhumatisme
Tél : 05 22 89 07 69

Date de consultation : 19/10/2023

Nom et prénom du malade : H. A. Mou KHADIJA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Rhinopharyngite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'at médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19/10/2023	ca	on	200/-	INP : 08/10/2023 Docteur Farid B. B. B. Médecin Généraliste Echographie Urogénitale Du Gynécologie Médicale et Infertilité Suivi de Grossesse Du Pédiatrie Médicale et Nutrition Du Diabétologie 06 63 31 39 07 58

Docteur FARHAT
Médicine Urgence
Echographie Médicale
Du Gynécologie et de la Nutrition
Du Diabétologie
INP : 05 72 89 07 58
05 72 89 07 58

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	19/10/2021	188.00

Cachet du Pharmacien
 ou du Fournisseur
 PHARMACIE
 AZZAHRA
 16 Hay Hassani - Casablanca

[illegible][illegible]

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

SOINS DENTAIRES		Traitées	Soins	Coefficient	
					Coefficient des Travaux
					Montants des Soins
					Début d'exécution
					Fin d'exécution
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H 28533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			Coefficient des Travaux	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Montants des Soins	
				Date du devis	
				Date de l'exécution	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

Docteur FARADI Hasnaâ

الدكتورة فرضي حسناء

Médecine Générale

Echographie

Urgence

DU : Gynécologie Médical Infertilité

Suivi de Grossesse

DU : Diététique Médicale et Nutrition

DU : Diabetologie

Casablanca, le 19/10/2023

الطب العام

الفحص بالصدى

المستعجلات

العقم

متابعة الحمل

التغذية و الحمية الطبية

أمراض السكري

الدار البيضاء، في

Momoun Khadija

2x14,30

Rhinofelbral. (S.V.)

10,30 x3
Doliprane (S.V.)

92,00
only (S.V.)

20,00

D3 Don. (S.V.)

12,20

Toplesit. (S.V.)



Docteur FARADI Hasnaa
Médecine Générale
Echographie Urgence
DU : Gynécologie Médical Infertilité
DU : Suivi de Grossesse
DU : Diététique Médicale et Nutrition
DU : Diabetologie
INPE: 091063313
Tel: 05 22 89 07 58

إقامة البركة، شارع أفغانستان، رقم 2 عمارة 64 تجزئة GH 5a أمام المركز التكنولوجي - الحي الحسني - الدار البيضاء

Résidence Baraka, Bld Afghanistan N°2, Lot 64 - GH 5a (Face Centre Technologie Hay Hassani) - casablanca

Tél : 05 22 89 07 58

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le

traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul

pourra adapter le traitement à votre état.

En fin de gros

entraîner des

conséquent, l

médecin ava

la durée de t

Demandez c

avant de pre

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En raison de ces

propriétés sédatives prononcées, sa prise est à éviter en cas

d'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de

l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de

votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de

véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de

somnolence attachées à l'usage de ce médicament, surtout en

début du traitement.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées

ou de médicaments contenant de l'alcool.

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, sodium.

Mode d'administration

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 2 ANS

VOIE ORALE

Posologie

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg (soit 12 ans) : 10 ml

par prise, 4 fois par jour.

Chez l'enfant, la posologie quotidienne est fonction du poids

de l'enfant (1 ml de sirop par kg de poids corporel et par jour),

soit à titre indicatif :

• Enfant de 13 à 20 kg (soit 2 à 6 ans) : 5 ml par prise, 2 à 3 fois

par jour.

• Enfant de 20 à 30 kg (soit 6 à 10 ans) : 10 ml par prise, 2 à 3

fois par jour.

• Enfant de 30 à 40 kg (soit 10 à 12 ans) : 10 ml par prise, 3 à 4

fois par jour.

Fréquence d'administration

Renouvelez les prises, en cas de besoin, en les espaçant de 4



heures minimum.
Il convient de privilégier les prises v
l'effet sédatif, surtout en début de t
L'oxoméazine.
Durée du traitement
Le traitement doit être court (quelq
moments où survient la toux.
Si votre toux persiste, demandez co
Si vous avez l'impression que l'effet
fort ou trop faible, consultez votre r
pharmacien.
Si vous avez pris plus de TOPLEXIL
Consultez immédiatement votre m
Si vous oubliez de prendre TOPLEXIL
Ne prenez pas de dose double pour
vous avez oublié de prendre.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDES
Comme tous les médicaments, TOP
d'avoir des effets indésirables, bien
pas sujet.

Certains effets nécessitent d'ARR
LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR
- Réactions allergiques :
* de type éruption cutanée (éry
urticaire),
* œdème de Quincke (urticaire
du visage et du cou pouvant
respiratoire),
* choc anaphylactique,
* phénomènes de sensibilisatio
soit.

- Baisse importante des globules
se manifester par l'apparition
flèvre accompagnée ou non de
Diminution anormale des plaq
se traduire par des saignements
D'autres sont plus fréquents :
- Somnolence, baisse de la vigila
- Troubles de la mémoire ou de
- Incoordination motrice, trembl
- Confusion, hallucinations.

Cholécalciférol
Solution injectable IM en an

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

١٨٨٨
 ١٨٨٩
 ١٨٩٠
 ١٨٩١
 ١٨٩٢
 ١٨٩٣
 ١٨٩٤
 ١٨٩٥
 ١٨٩٦
 ١٨٩٧
 ١٨٩٨
 ١٨٩٩
 ١٩٠٠
 ١٩٠١
 ١٩٠٢
 ١٩٠٣
 ١٩٠٤
 ١٩٠٥
 ١٩٠٦
 ١٩٠٧
 ١٩٠٨
 ١٩٠٩
 ١٩١٠
 ١٩١١
 ١٩١٢
 ١٩١٣
 ١٩١٤
 ١٩١٥
 ١٩١٦
 ١٩١٧
 ١٩١٨
 ١٩١٩
 ١٩٢٠
 ١٩٢١
 ١٩٢٢
 ١٩٢٣
 ١٩٢٤
 ١٩٢٥
 ١٩٢٦
 ١٩٢٧
 ١٩٢٨
 ١٩٢٩
 ١٩٣٠
 ١٩٣١
 ١٩٣٢
 ١٩٣٣
 ١٩٣٤
 ١٩٣٥
 ١٩٣٦
 ١٩٣٧
 ١٩٣٨
 ١٩٣٩
 ١٩٤٠
 ١٩٤١
 ١٩٤٢
 ١٩٤٣
 ١٩٤٤
 ١٩٤٥
 ١٩٤٦
 ١٩٤٧
 ١٩٤٨
 ١٩٤٩
 ١٩٥٠
 ١٩٥١
 ١٩٥٢
 ١٩٥٣
 ١٩٥٤
 ١٩٥٥
 ١٩٥٦
 ١٩٥٧
 ١٩٥٨
 ١٩٥٩
 ١٩٦٠
 ١٩٦١
 ١٩٦٢
 ١٩٦٣
 ١٩٦٤
 ١٩٦٥
 ١٩٦٦
 ١٩٦٧
 ١٩٦٨
 ١٩٦٩
 ١٩٧٠
 ١٩٧١
 ١٩٧٢
 ١٩٧٣
 ١٩٧٤
 ١٩٧٥
 ١٩٧٦
 ١٩٧٧
 ١٩٧٨
 ١٩٧٩
 ١٩٨٠
 ١٩٨١
 ١٩٨٢
 ١٩٨٣
 ١٩٨٤
 ١٩٨٥
 ١٩٨٦
 ١٩٨٧
 ١٩٨٨
 ١٩٨٩
 ١٩٩٠
 ١٩٩١
 ١٩٩٢
 ١٩٩٣
 ١٩٩٤
 ١٩٩٥
 ١٩٩٦
 ١٩٩٧
 ١٩٩٨
 ١٩٩٩
 ٢٠٠٠
 ٢٠٠١
 ٢٠٠٢
 ٢٠٠٣
 ٢٠٠٤
 ٢٠٠٥
 ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧
 ٢٠٠٨
 ٢٠٠٩
 ٢٠١٠
 ٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 ٢٠١٦
 ٢٠١٧
 ٢٠١٨
 ٢٠١٩
 ٢٠٢٠
 ٢٠٢١
 ٢٠٢٢
 ٢٠٢٣
 ٢٠٢٤
 ٢٠٢٥
 ٢٠٢٦
 ٢٠٢٧
 ٢٠٢٨
 ٢٠٢٩
 ٢٠٣٠
 ٢٠٣١
 ٢٠٣٢
 ٢٠٣٣
 ٢٠٣٤
 ٢٠٣٥
 ٢٠٣٦
 ٢٠٣٧
 ٢٠٣٨
 ٢٠٣٩
 ٢٠٤٠
 ٢٠٤١
 ٢٠٤٢
 ٢٠٤٣
 ٢٠٤٤
 ٢٠٤٥
 ٢٠٤٦
 ٢٠٤٧
 ٢٠٤٨
 ٢٠٤٩
 ٢٠٥٠
 ٢٠٥١
 ٢٠٥٢
 ٢٠٥٣
 ٢٠٥٤
 ٢٠٥٥
 ٢٠٥٦
 ٢٠٥٧
 ٢٠٥٨
 ٢٠٥٩
 ٢٠٦٠
 ٢٠٦١
 ٢٠٦٢
 ٢٠٦٣
 ٢٠٦٤
 ٢٠٦٥
 ٢٠٦٦
 ٢٠٦٧
 ٢٠٦٨
 ٢٠٦٩
 ٢٠٧٠
 ٢٠٧١
 ٢٠٧٢
 ٢٠٧٣
 ٢٠٧٤
 ٢٠٧٥
 ٢٠٧٦
 ٢٠٧٧
 ٢٠٧٨
 ٢٠٧٩
 ٢٠٨٠
 ٢٠٨١
 ٢٠٨٢
 ٢٠٨٣
 ٢٠٨٤
 ٢٠٨٥
 ٢٠٨٦
 ٢٠٨٧
 ٢٠٨٨
 ٢٠٨٩
 ٢٠٩٠
 ٢٠٩١
 ٢٠٩٢
 ٢٠٩٣
 ٢٠٩٤
 ٢٠٩٥
 ٢٠٩٦
 ٢٠٩٧
 ٢٠٩٨
 ٢٠٩٩
 ٢١٠٠
 ٢١٠١
 ٢١٠٢
 ٢١٠٣
 ٢١٠٤
 ٢١٠٥
 ٢١٠٦
 ٢١٠٧
 ٢١٠٨
 ٢١٠٩
 ٢١١٠
 ٢١١١
 ٢١١٢
 ٢١١٣
 ٢١١٤
 ٢١١٥
 ٢١١٦
 ٢١١٧
 ٢١١٨
 ٢١١٩
 ٢١٢٠
 ٢١٢١
 ٢١٢٢
 ٢١٢٣
 ٢١٢٤
 ٢١٢٥
 ٢١٢٦
 ٢١٢٧
 ٢١٢٨
 ٢١٢٩
 ٢١٣٠
 ٢١٣١
 ٢١٣٢
 ٢١٣٣
 ٢١٣٤
 ٢١٣٥
 ٢١٣٦
 ٢١٣٧
 ٢١٣٨
 ٢١٣٩
 ٢١٤٠
 ٢١٤١
 ٢١٤٢
 ٢١٤٣
 ٢١٤٤
 ٢١٤٥
 ٢١٤٦
 ٢١٤٧
 ٢١٤٨
 ٢١٤٩
 ٢١٥٠
 ٢١٥١
 ٢١٥٢
 ٢١٥٣
 ٢١٥٤
 ٢١٥٥
 ٢١٥٦
 ٢١٥٧
 ٢١٥٨
 ٢١٥٩
 ٢١٦٠
 ٢١٦١
 ٢١٦٢
 ٢١٦٣
 ٢١٦٤
 ٢١٦٥
 ٢١٦٦
 ٢١٦٧
 ٢١٦٨
 ٢١٦٩
 ٢١٧٠
 ٢١٧١
 ٢١٧٢
 ٢١٧٣
 ٢١٧٤
 ٢١٧٥
 ٢١٧٦
 ٢١٧٧
 ٢١٧٨
 ٢١٧٩
 ٢١٨٠
 ٢١٨١
 ٢١٨٢
 ٢١٨٣
 ٢١٨٤
 ٢١٨٥
 ٢١٨٦
 ٢١٨٧
 ٢١٨٨
 ٢١٨٩
 ٢١٩٠
 ٢١٩١
 ٢١٩٢
 ٢١٩٣
 ٢١٩٤
 ٢١٩٥
 ٢١٩٦
 ٢١٩٧
 ٢١٩٨
 ٢١٩٩
 ٢٢٠٠
 ٢٢٠١
 ٢٢٠٢

पुनः पुनः । पुनः पुनः । पुनः पुनः ।

الحمد لله

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez
 avoir une grossesse, demandez conseil
 à votre pharmacien avant de prendre ce
 médicament. En cas de besoin, ce médicament peut être
 utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement.

PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

...وَجِبْرَتُهُ وَبِقُدْرَتِهِ
...وَبِقُدْرَتِهِ وَبِقُدْرَتِهِ

[illegible]

Uniquement sur ordonnance / Only upon prescription/
فقط بوصفة طبية / Only with a doctor's prescription

لايحة - اا - اسل - لسلة

ZENITH Pharma

AMM N° 1/11/16 DMF 12/11/16



PPV: 20,90 DH

- Veuillez
information
Vous devez
dans cette
- Gardez ce
- Adressez-
- Si vous re
si vous ren
- Vous dev
vous sente

LOT : 230014
EXP : 01/2026
PPV : 14,30DH

756.836.07.19

UT.AV.:

LOT N°:

PPV (DH):

Que conti
1. Qu'est
2. Quelles
3. Comin
4. Quels
5. Comin
6. Inform

1. QU'EST
Classe ph
ANTIPIRE
central) / f
Indications
Ce médic
Il est indi
tête et/ou fièvre

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
Ne prenez jamais RHINOFEFBRAL, gélule :
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol, au maléate de chlorphénamine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament rubrique : Informations supplémentaires
- En cas de maladies associées à la rétention de fer, telles que l'hémochromatose ou l'anémie sidéroblastique.
- En cas d'insuffisance rénale sévère ou hémodialyse.
- Si vous avez une maladie grave du foie.
- Si vous avez une difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre.
- Si vous avez un glaucome.

Ce médicament ne doit GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant l'allaitement. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre RHINOFEFBRAL, gélule avec de l'alcool ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prév

La prise concomitante de ce médicament en association avec l'alcool ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prév

Ce médicament contient du paracétamol, du maléate de chlorphénamine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie).

En cas de survenue d'écoulement nasal purulent comme en cas d'aggravation de votre état au bout de 5 jours de traitement (persistance de la fièvre), consultez votre médecin.

Il existe des médicaments plus adaptés pour les enfants de moins de 12 ans. Adressez-vous à votre pharmacien.

Si vous ou votre enfant avez une maladie héréditaire rare appelée « déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase », demandez l'avis de votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Si vous souffrez d'une maladie du foie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament. Des réactions cutanées graves ont été signalées très rarement chez des personnes prenant du paracétamol. Par conséquent, arrêtez d'utiliser RHINOFEFBRAL, gélule et consultez votre médecin dès l'apparition d'une éruption cutanée ou tout autre signe d'aggravation de la fièvre, des rougeurs ou de nombreuses petites pustules).

Demandez à un médecin avant utilisation en cas d'antécédents de calculs rénaux. Ce médicament ne doit pas être administré à des doses supérieures à 1 gramme (1000 mg) par jour.

Si vous souffrez de glaucome (augmentation de la pression de l'œil), si vous

side as
édicamen
sement le
pn.
édecin ou
notice.
aucune a

cas es
idre RHIN
AS EST-IL
TEURS H

chlorphénamine
nasal lors d'u
12 ans.

RHINOFEFBRAL

- Veuillez
information
Vous devez
dans cette
- Gardez ce
- Adressez-
- Si vous re
si vous ren
- Vous dev
vous sente

LOT : 230014
EXP : 01/2026
PPV : 14,30DH

LOT N° :
PPV (DH) :

756.836.07.19

cide as
édicamen
sement le
pn.
édecin ou
notice.
: aucune a

cas es
idre RHIN

AS EST-IL
TEURS H

chlorphénan
ment nasal lors d'u
12 ans.

Que conti
1. Qu'est
2. Quelles
3. Comin
4. Quels
5. Comin
6. Inform

1. QU'EST
Classe ph
ANTIPIRE
central) / f
Indications
Ce médic
Il est indiqu
tête et/ou fièvre

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE

Ne prenez jamais RHINOFEFBRAL, gélule :
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol, au maléate de chlorphéniramine, à l'aspirine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament rubrique : Informations supplémentaires
- En cas de maladies associées à la rétention de fer, telles que l'hémochromatose, l'anémie sidéroblastique,
- En cas d'insuffisance rénale sévère ou hémodialyse,
- Si vous avez une maladie grave du foie,
- Si vous avez une difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- Si vous avez un glaucome.
Ce médicament ne doit GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant l'allaitement. **EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.**

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre RHINOFEFBRAL, gélule avec de l'alcool ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prévient votre médecin.

La prise concomitante de ce médicament en association avec l'alcool ou avec d'autres médicaments contenant de l'alcool est déconseillée (voir RHINOFEFBRAL, gélule avec de l'alcool).

Ce médicament contient du paracétamol, du maléate de chlorphéniramine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie).

En cas de survenue d'écoulement nasal purulent comme en cas d'aggravation de votre rhinite, arrêtez d'utiliser RHINOFEFBRAL, gélule et consultez votre médecin. L'amélioration de votre état au bout de 5 jours de traitement (persistance de la rhinite) est un signe d'efficacité.

Il existe des médicaments plus adaptés pour les enfants de moins de 12 ans. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous ou votre enfant avez une maladie héréditaire rare appelée « déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase », demandez l'avis de votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Si vous souffrez d'une maladie du foie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament. Des réactions cutanées graves ont été signalées très rarement chez des personnes prenant du paracétamol. Par conséquent, arrêtez d'utiliser RHINOFEFBRAL, gélule et consultez votre médecin dès l'apparition d'une éruption cutanée ou tout autre signe d'hyper-sensibilité (comme de la fièvre, des rougeurs ou de nombreuses petites pustules).

Demandez à un médecin avant utilisation en cas d'antécédents de calculs rénaux. Ce médicament ne doit pas être administré à des doses supérieures à 1 gramme (1000 mg) par jour.

Si vous souffrez de glaucome (augmentation de la pression de l'œil), si vous

OXYMAG[®] 375 mg

Magnésium marin, bisglycinate & malate. Vit B2, B6

Comprimés
Sans sucre
Sans sel



OXYMAG[®] 375 mg
Magnésium marin, bisglycinate & malate. Vit B2, B6

Lot / Batch n° :

Exp. date : 23290

06/26

PPC (DH) : 92,00

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Magnésium malate, Vitamine B6, Vitamine B2, Vitamine B12, Stéarate de magnésium (Lubrifiant), silice colloïdale, Cellulose microcristalline (Désintégrant).

Quantité en mg / 1 comprimé	DJR*
375	100%
4,8	343%
2	143%

(*) Dose journalière recommandée

PRO

Le magnésium est présent dans tous les tissus et organes, il participe à la bonne marche de toutes les grandes fonctions de l'organisme sans exception, notamment : Métaboliques, musculaires, nerveuses, immunitaires...

OXYMAG 375 mg permet de compléter l'alimentation pour combler le manque magnésique dans l'organisme en fournissant 375 mg de magnésium élément (utilisable par l'organisme) ce qui correspond à 100% des apports journaliers recommandés.

POSOLOGIE :

Voie orale.

Pour adultes : 1 comprimé par jour.

CONSEILS D'UTILISATION :

Comprimé à avaler avec un verre d'eau.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Il est conseillé de prendre ce produit dans le cadre d'un régime alimentaire sain.

CONTRE INDICATIONS :

Hypersensibilité à l'un des composants.

Insuffisance rénale grave.

Myasthénie.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fermer le tube immédiatement après usage.

Tenir hors de la portée et la vue des enfants.

Conserver dans un endroit frais et sec.



Lot Bachkou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Maroc

Pharmacien responsable : O. MOTII

Doliprane® 500 mg

PARACÉTAMOL

comprimé

COMPOSITION ET PRESENTATION :

- Paracétamol 500 mg 500 mg

PPV: 10DH30
PER: 08/25
LOT: L2791

que. Il calme la douleur.
ser la température en cas de fièvre.

paracétamol.

s avec douleur et/ou fièvre, telle que maux de tête,
taires, courbatures, règles douloureuses, chez
27kg : (environ 8 ans).

mol,

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
- Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Doliprane® 500 mg comprimé peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.



Doliprane® 500 mg

PARACÉTAMOL

comprimé

COMPOSITION ET PRESENTATION :

- Paracétamol 500 mg 500 mg

PPV: 10DH30
PER: 08/25
LOT: L2791

que. Il calme la douleur.
ser la température en cas de fièvre.

paracétamol.

s avec douleur et/ou fièvre, telle que maux de tête,
taires, courbatures, règles douloureuses, chez
27kg : (environ 8 ans).

mol,

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
- Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Doliprane® 500 mg comprimé peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.



Doliprane® 500 mg

PARACÉTAMOL

comprimé

COMPOSITION ET PRESENTATION :

- Paracétamol 500 mg 500 mg

PPV: 10DH30
PER: 08/25
LOT: L2791

que. Il calme la douleur.
ser la température en cas de fièvre.

paracétamol.

s avec douleur et/ou fièvre, telle que maux de tête,
taires, courbatures, règles douloureuses, chez
27kg : (environ 8 ans).

mol,

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
- Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Doliprane® 500 mg comprimé peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

