

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-001042

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11135

Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : JEBRARI

ABDELHOTIF

Date de naissance : 21/12/1970

Adresse :

Tél. : 066 13 726 43

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Docteur MOUNIR M.**  
OPHTALMOLOGISTE  
Clinique Spécialisée  
33, Lot. Sania, Bd Hassan II  
Mohammedia

Date de consultation : 30/12/2013

Nom et prénom du malade : Jebraïli Abdelhotif

Age : ..... Ans

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Nature de la maladie : Affection oculaire

Enfant

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

des soins	Nature des Actes	Nombre et Coefficent	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30/10/2015	16			<i>Dr. Mounir Hassan</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE MOUNIR EL ALIA MOHAMMEDIA INPE: 09 204 4049 TEL: 05 23 28 44 85</i>	30-10-2015	170,20

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficents	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX		
DETERMINATION DU COEFFICIENT PROTHESES DENTAIRES	MASTICATOIRE				MONTANTS DES SOINS	
H	25533412	21433552	D	00000000		00000000
	00000000	00000000	G	00000000		35533411
B	35533411	11433553				
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession						
DATE DU DEVIS					DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



المصحة المتخصصة المحمدية  
في أمراض وجراحة العيون

CLINIQUE SPECIALISÉE MOHAMMEDIA  
OPHTHALMOLOGIE

الدكتور منير م.

DOCTEUR MOUNIR M.

طب وجراحة العيون

خريج كلية الطب بليج (بلجيكا)

داخلي سابقًا بمستشفيات باريس

Ophtalmologiste

Diplômé de la faculté de médecine  
de Liège (Belgique)

Médecin interne des Hôpitaux de Paris

Mohammedia le :

30 octobre 2023

Mr JEBBARI ABDELLATIF

74.80

CATEX 500 MG COMPRIME

1cp 2f/j pd 5j

AS

24.00

RONIC 1 MG COLLYRE

AS

PHARMACIE MOUMEN  
80 LA PALESTRE LOT MOUMEN  
EL ALIA MOHAMMEDIA  
INPE 06 204 ▲ 049  
TEL 05 23 28 44 85

AS  
OPHTALMOCLINIC  
05 23 28 44 85

45.90

CILOXAN COLL

AS

1 gtt x 4/j pd 10j

25.50

PANSEMENT OCULAIRE ADULTE 1 BOITE

AS

changer le pansement chaque matin

AS  
Doctor MOUNIR M.  
OPHTHALMOLOGISTE  
Clinique Spécialisée  
33, Lot Sania, Bd Hassan II  
Mohammedia

AS  
CLINIQUE SPÉCIALE MOHAMMEDIA  
OPHTHALMOLOGIE  
33, Lot SANIA Av Hassan II - Mohammedia

33, Lot SANIA Av Hassan II - Mohammedia  
Tél. : 05 23 32 90 02 / 03 - Fax : 05 23 32 38 63  
RDV : 06 50 12 88 66 - Site Web : [www.ophtalmoclinic.ma](http://www.ophtalmoclinic.ma)  
ICE : 001949640000068

**CATEX® 250 mg & 500 mg**  
Boîtes de 10 et 20 comprimés pelliculés  
Ciprofloxacine

La notice avise de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.  
Veuillez lire la notice.  
As d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Précaution : Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.  
Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel cas est-il utilisé ?  
Comment conserver CATEX ?  
Quels effets indésirables éventuels ?  
Informations supplémentaires

**OU EST-CE QUE CATEX® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**  
CATEX® est utilisé pour traiter les infections bactériennes suivantes :  
Fluorouracil - code ATC : J01MA02

CATEX® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluorouracines. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines bactéries et certaines bactéries.

**Indications thérapeutiques :**

chez l'adulte

CATEX® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

• infections bactériennes respiratoires.

• infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.

• infections urinaires.

• infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.

• infections de la peau et des tissus mous.

• infections des os et des articulations.

• Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.

• Exposition à la maladie du choléra.

CATEX® est également utilisé pour le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de ce médicament.

chez l'enfant et l'adolescent

CATEX® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

• infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.

• infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).

• Exposition à la maladie du choléra.

CATEX® est également utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

**2- OÙ SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CATEX® ?**

**Liste des informations nécessaires avant l'prise du médicament :**

**Contre-indications :**

• As d'urticaire à la ciprofloxacine :

• Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• Si vous prenez la transtuzomab.

**En cas d'ergolysie et d'interactions possibles d'emploi :**

• Informez votre pharmacien avant de prendre CATEX®, comprimé pelliculé.

Avant de prendre les comprimés, parlez-en à votre médecin dans les cas suivants :

• Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux qui pourraient nécessiter d'adapter votre traitement.

• Si vous souffrez d'ostéoporose ou d'une autre affection osseuse.

• Si vous avez déjà présenté des problèmes cardiaques ou des symptômes de la même famille que CATEX®.

• Si vous êtes diabétique car vous pourrez risquer de présenter une hypoglycémie avec la ciprofloxacine;

• Si vous souffrez de myasthénie (maladie qui entraîne une faiblesse musculaire) car les symptômes peuvent être exacerbés;

• Si vous avez des problèmes cardiaques. La ciprofloxacine peut être associée avec une réaction anaphylactique dans le sang (notamment un taux élevé de potassium ou de magnétes dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé "bradycardie"), si vous avez un cœur affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez déjà eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme ou une personne âgée ou si vous prenez d'autres médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG;

• Si vous ou un membre de votre famille êtes atteint d'un déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase (G6PD), car vous pourrez alors risquer de présenter une anémie avec la ciprofloxacine;

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

Pour plus d'informations, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Si vous avez des symptômes ou des réactions indésirables, n'oubliez pas d'en parler à votre pharmacien ou à votre médecin. Veuillez consulter votre pharmacien ou votre médecin si vous présentez des symptômes ou des réactions indésirables.

**Pendant la prise de CATEX®, comprimé pelliculé :**

• Prenez immédiatement votre médicament si l'un des troubles suivants va se produire : le traitement par CATEX doit être arrêté.

• Réactions cutanées graves (éruption cutanée anaphylactique, maladie de Quincke). Si vous présentez une réaction cutanée grave, arrêtez le traitement par CATEX et contactez immédiatement votre médecin.

• Des douleurs et gonflement des articulations ainsi que des tendinites peuvent survenir occasionnellement, en particulier si vous êtes atteint d'ostéoporose ou d'une autre affection osseuse. Si vous présentez des douleurs et gonflement des articulations ou des tendons, arrêtez de prendre ce médicament, contactez votre médecin.

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous souffrez d'ostéoporose ou d'une autre maladie neurologique telle qu'une sclérose cérébrale ou un accident vasculaire cérébral (convulsions) pourraient ne produire. Si des crises convulsives surviennent, arrêtez CATEX et contactez immédiatement votre médecin.

• Votre pharmacien ou votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir ou réduire les réactions indésirables, tels que les médicaments contre les crises convulsives.

• Des réactions psychiques peuvent survenir dès la première prise de CATEX. Si vous souffrez de dépression ou de psychose, vos symptômes peuvent s'aggraver ou s'aggraver avec l'administration de CATEX. Si vous présentez des symptômes de dépression ou de psychose, contactez immédiatement votre médecin.

• Dans de rares cas, une dépression ou une psychose peuvent évoluer vers des pensées suicidaires, des tentatives d'autodétruction, ou une intention de se suicider.

• Des cas d'hypoglycémie ont été rapportés le plus souvent chez des patients diabétiques, principalement dans la population âgée.

• Une diarrhée peut se produire pendant la prise d'antibiotiques, y compris avec ce médicament, et même plusieurs semaines après la fin de la prise. Si vous présentez une diarrhée, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension ou de "reflux" d'un gros vaisseau sanguin (anémie artérielle ou anémie périphérique d'un gros vaisseau);

• Si vous avez déjà présenté des symptômes de la maladie de Behcet (maladie qui entraîne des ulcérations dans la bouche, les yeux et les voies génitales, ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Elie-Darthon vasculaire, ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une artérite périphérique connue);

• Si vous ressentez une douleur doucereuse et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, renvez-vous immédiatement au service d'urgence d'un

LC®

## Flacon de dexaméthasone

# 1 mg/ml Collyre en solution

Flacon de 5 ml

### Notice d'information de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les personnes sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez quelque chose de bizarre, parlez-en à votre pharmacien. Il pourra vous dire si l'effet est identique à ce que vous ressentez.

EXP 03 2025

Date Fabric. 03 2022

Lot 220360

#### Que contient ce médicament?

1. Qu'est-ce que le médicament?
2. Quelles sont les indications pour l'utiliser?
3. Comment utiliser le médicament?
4. Quels sont les effets indésirables?
5. Comment conserver le médicament?
6. Contenu de l'emballage.

#### 1. Qu'est-ce que le médicament?

Ronic collyre en solution est un médicament destiné à être appliqué dans les yeux. Il est destiné à traiter des affections conjonctivales (conjonctivite, brûlure de la cornée ou de la conjonctive, bactérienne ou virale), l'iridocyclite, foyers chorio-rétiniens, d'ulcéronephrose et des situations conjonctivales d'origine virale. Ronic est indiqué dans les états inflammatoires et ne doit pas être utilisé dans l'infection virale de l'œil. Doit être tenu une surveillance médicale étroite pendant l'utilisation de ce médicament.

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ronic?

##### N'utilisez jamais Ronic:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la phosphate sodique de dexaméthasone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6);
- Si vous avez de la kératite herpétique ou mycosique;
- Si vous avez de la tuberculose oculaire;
- Si vous êtes avec varicelle;
- Si vous avez une infection causée par le virus vaccinia;
- Si vous avez des antécédents glaucomateux;
- Si vous souffrez de l'immunosuppression (réduction ou l'élimination de défense du corps);
- Au-delà de 28 jours, après la première ouverture du flacon.

##### Avertissement:

Adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin avant

d'utiliser ce médicament. Attendez au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut également provoquer une irritation des yeux, surtout si vous souffrez du syndrome de l'œil sec ou de troubles de la cornée (couche transparente à l'avant de l'œil). En cas de sensation anormale, de picotements ou de douleur dans les yeux après avoir utilisé.

#### Ronic contient phosphates

Ce médicament contient 5,6 mg de phosphates par ml de solution.

Si vous souffrez de dommages sévères de la cornée (couche transparente située à l'avant de l'œil) les phosphates peuvent causer, dans de très rares cas, des troubles de la vision en raison de l'accumulation de



€100,38.05.01

cessive et votre médecin.

#### Si vous avez utilisé plus de Ronic que vous n'auriez dû

Pour la forme pharmaceutique en collyre, aucun cas de surdosage n'a été détecté jusqu'à présent.

#### Si vous oubliez d'utiliser Ronic

- Si vous êtes encore loin de la prochaine application, vous devez appliquer immédiatement le médicament sans doubler la dose. Ensuite, poursuivez le traitement comme prescrit;
- Si vous êtes presque au moment de la prochaine application, appliquez le collyre seulement à ce moment, sans doubler la dose. Puis continuez normalement le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

##### Fréquents ( $\geq 1/100, < 1/10$ ):

- Déconfort ;
  - Brûlure ;
  - Sensation de picotement.
- Ces effets sont légers et toujours passagers.

##### Peu fréquent ( $\geq 1/1000, < 1/100$ ):

- Congestion conjonctivale;
- Sécheresse autour des yeux;
- Irritation oculaire;
-

