

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- N° 004030

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2847 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : DOUNIA CHANSADHA
Date de naissance : 06/01/1953
Adresse : 59 B. ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLORES
9^{ème} E.T.G. App 28 CASA MAROC
Tél. 0651989687 Total des frais engagés : 1891 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 31/10/2023
Nom et prénom du malade : Dounia Chamsadha Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Hépatopathie chronique @ Jamboussab
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 1

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 31/10/2023
Signature de l'adhérent(e) : F. F.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/10/2023	CS	300	16	Dr. Fatima Zahra Khamis Hepato-gastro-entérologie et Proctologie 7, Angle Bd Abdelmoumen et Rue Rachati Imm. 3 Etg. 2 ar Casa Tél : 05 20 35 35 35 05 20 35 35 35
26/11/2023	conclut	6		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

31/10/2023

395,00

24/11/23

29,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

10.11.23

8800

1097,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins


Coefficient

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION



O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 G 00000000
35533411 11433553
B


[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

STIM
TONUS **Activ®**

د. فاطمة الزهراء خرباشي

إختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد - أمراض وجراحات الأمعاء
نخس القلوب والعدة بالمنظار - النخس بالهيدرو

Casablanca

Casablanca

Service de l'Hôpital Saint Joseph - Paris

Service digestif - Lyon

Service de l'intestin - Lille

ORDONNANCE

Casablanca le,

11/11/2023

Mme DOUNIA CHAMSADHA

د. فاطمة الزهراء خرباشي

1) **Stimactiv**

1 ampoule par jour pendant 10 jours



LOT : 0009
PER : 02 2026
PPC : 99.00DH

BIOCODEX
Maroc

كاديطال (ونيس 7: ملتقى شارع عبد المومن و زنفة الرشاشي، عمارة 3 الطابق 2 المكتبة رقم 50، (فوق مرجان ماركت) . الدار البيضاء

Capital Office: 7 Angle Bd Abdelmoumen et Rue Rachati, Imm. N 3, 2ème étage bureau N 50 - Casablanca
(au dessus de Marjane Market Quartier des Hôpitaux) - Tél: 05 20 88 88 55 - E-mail: kharbachi.fatimazahra@gmail.com

EXAMEN du : 10/11/23 à 10h01

Edité le : 10/11/23 à 13h40

Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Patient 155472 Né(e) le 01/01/1953

Dr. KHARBACHI Fatima Zahra

Prélevé par le Laboratoire

Page : 1 / 5

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

(Technique Cytométrie de Flux sur SYSMEX XN 1000)

		NORMES	ANTECEDENTS
HEMATIES	4,21	M/mm ³ (4.0 à 5.3)	27/01/22 : 4.38
Hémoglobine	12,2	g/dL (12.5 à 15.5)	27/01/22 : 12.4
Hématocrite	35,2	% (37 à 46)	27/01/22 : 37.0
V.G.M.....	83,6	fL (80 à 95)	27/01/22 : 84.5
T.G.M.H.....	29,0	pg (28 à 32)	27/01/22 : 28.3
C.G.M.H.....	34,7	% (30 à 35)	27/01/22 : 33.5
LEUCOCYTES	5 100	/mm ³ (4000 à 10000)	27/01/22 : 6910
Polynucléaires neutrophiles..	64,9	% (40 à 75)	27/01/22 : 71.8
soit...	3 310	/mm ³ (2000 à 7500)	
Lymphocytes.....	24,1	% (20 à 45)	27/01/22 : 20.0
soit...	1 229	/mm ³ (1500 à 4000)	
Monocytes.....	8,4	% (2 à 8)	27/01/22 : 6.2
soit...	428	/mm ³ (200 à 800)	
Polynucléaires éosinophiles..	2,4	% (1 à 4)	27/01/22 : 1.6
soit...	122	/mm ³ (100 à 600)	
Polynucléaires basophiles....	0,2	% (0 à 1)	27/01/22 : 0.4
soit...	10	/mm ³ (0 à 150)	
PLAQUETTES	116	Mille/mm ³ (150 à 450)	27/01/22 : 145
Volume Plaquettaire Moyen ...	9,0	fL (N : 11.5 à 14.5)	27/01/22 : 8.5

Dr BIOLOGISTE

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX - CBH**
3, Rue du Colonel GROS - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 / 06 61 75 52 65

EXAMEN du : 10/11/23 à 10h01

Edité le : 10/11/23 à 13h40

Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Patient 155472 Né(e) le 01/01/1953

Dr. KHARBACHI Fatima Zahra

Prélevé par le Laboratoire

Page : 2 / 5

BIOCHIMIE

NORMES


ANTECEDENTS

C.R.P. us : PROTEINE C-REACTIVE ULTRA-SENSIBLE

(Technique Immunoturbidimétrique sur COBAS 6000 - ROCHE)

C.R.P us 1,51 mg/L (< 6.0)

27/01/22 : 1.75



Remarques

La Procalcitonine (P.C.T) est disponible, elle permet :

- 1-Diagnostic précoce de l'infection bactérienne systémique, du sepsis et de la défaillance multi-viscérale.
- 2-Indication de la sévérité et du pronostic de l'infection.
- 3-Diagnostic différentiel entre infection bactérienne et infection virale.
- 4-Diagnostic différentiel entre infection systémique et maladie inflammatoire aiguë.
- 5-Surveillance de la survenue d'infection chez les patients à haut risque (transplantés, immunosuppression,).

L'Interleukine-6 (IL-6) est également disponible en routine.

Dr BIOLOGISTE

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HOPITAUX « CHH »**
3, Rue du Colonel Gros - Castelnau
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 12
Fax: 05 22 20 35 15

EXAMEN du : 10/11/23 à 10h01

Edité le : 10/11/23 à 13h40

Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Patient 155472 Né(e) le 01/01/1953

Dr. KHARBACHI Fatima Zahra

Prélevé par le Laboratoire
10/11/23

Page : 3 / 5

ENZYMOLOGIE

NORMES

ANTECEDENTS

BILAN HEPATIQUE

ASAT (GOT) : ASPARTATE AMINO TRANSFERASES

(Enzymologie selon IFCC 37°C sur COBAS 6000 - ROCHE)

ASAT 28 UI/L (N : < 32) 10/01/19 : 21

ALAT (GPT) : ALANINE AMINO TRANSFERASES

(Enzymologie selon IFCC 37°C sur COBAS 6000 - ROCHE)

ALAT 23 UI/L (N : < 31) 10/01/19 : 19

G.G.T. : GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE

(Enzymologie selon IFCC 37°C sur COBAS 6000 - ROCHE)

G.G.T. 60 UI/L (N : 13 à 60) 10/01/19 : 77

PAL : PHOSPHATASES ALCALINES

(Enzymologie selon IFCC 37°C sur COBAS 6000 - ROCHE)

PAL 118 UI/L (N : 53 à 141)

BILIRUBINE

(Enzymologie selon Diazo sur COBAS 6000 - ROCHE)

BILIRUBINE TOTALE 5,12 mg/L : 0 à 10) 24/07/18 : 6,00

8,76

μmol/L

BILIRUBINE DIRECTE 1,90

mg/L (N : 0 à 2)

3,25

μmol/L

BILIRUBINE INDIRECTE ... 3,22

mg/L (N : 0 à 10)

5,51

μmol/L

Dr BIOLOGISTE

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX - CBH**
3, rue du Colonel GROS - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 / 06 61 75 52 65
Fax: 05 22 20 35 15

EXAMEN du : 10/11/23 à 10h01
Edité le : 10/11/23 à 13h40
Mme DOUNIA CHAMSA-DHA
Patient 155472 Né(e) le 01/01/1953
Dr. KHARBACHI Fatima Zahra

Prélevé par le Laboratoire

Page : 4 / 5

HEMOSTASE

NORMES

ANTECEDENTS

T.Q : TEMPS DE QUICK


(Automate STA SATELLITE STAGO)

Temps du Témoin	13,3	sec	
TQ Patient	15,6	sec	10/01/19 : 15.5
TAUX DE PROTHROMBINE ...	78,0	%	(N : > 75) 10/01/19 : 77.0
INR	1,18		10/01/19 : 1.19

ZONES THERAPEUTIQUES : Recommandations Françaises

Traitement Anticoagulant pré-opératoire (2 semaines avant)

- Chirurgie de la hanche	2.0	à	3.0
- Chirurgie différente de la hanche	1.5	à	2.5
- Prévention de thrombose veineuse	2.0	à	3.0
- Prévention de thrombose Artérielle	3.0	à	4.5



ALIMENTS RICHES EN VITAMINE K A EVITER PENDANT LE TRAITEMENT

- Chou, choucroute, chou-fleur
- Epinards, brocolis, persil, coriandre, légumes verts

Dr BIOLOGISTE

CENTRE DE BIOLOGIE
DES HOPITAUX de CHH
1, Rue du Colonel Gros - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 73
Fax: 05 22 20 35 15

EXAMEN du : 10/11/23 à 10h01

Edité le : 10/11/23 à 13h40

Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Patient 155472 Né(e) le 01/01/1953

Dr. KHARBACHI Fatima Zahra

Prélevé par le Laboratoire
10/11/23

Page : 5 / 5

BIOCHIMIE

NORMES

ANTECEDENTS

ALBUMINE 45,20 g/L (N : 35 à 52)
(Test Immunoturbidimétrique COBAS 6000 - ROCHE)

BILAN THYROIDIEN


NORMES

ANTECEDENTS

T.S.H. us : THYREOSTIMULINE ULTRA-SENSIBLE 3G
(Technique Chimiluminescence COBAS 6000 - ROCHE)

T.S.H us 1,630 mUI/L (N : 0.27 à 4.20)

29/05/23 : 2.510



Dr BIOLOGISTE

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX - CBH**
3, rue du Colonel GROS - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 / 06 61 75 52 65
Fax: 05 22 20 35 15

Dr. Fatima Zahra KHARBACHI

Hepato-Gastro-enterologue et Proctologue

Endoscopie digestive - Echographie

Proctologie médico-interventionnelle

د. فاطمة الزهراء خرباشي

إختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد - أمراض وجراحات المعبر
نحصى القولون والعمدة بالمنظار - الفحص بالصدى

- Lauréate de la faculté de médecine Hassan II - Casablanca
- Ancien médecin au CHU Ibn Rochd - Casablanca
- Ancien médecin en Unité de Proctologie de l'Hôpital Saint Joseph - Paris
- Diplômée en proctologie - Rennes
- Diplômée en pathologie fonctionnelle digestive - Lyon
- Diplômée en maladie inflammatoire chronique de l'intestin - Lille

ORDONNANCE

Casablanca le,

31/10/2023

Mme DOUNIA CHAMSADHA

- 1) Nfs-plq
- 2) CRP
- 3) Asat-alat-PAL-GGT-BC
- 4) Albuminémie
- 5) TP
- 6) Tsh US

CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX « CBH »
3, Rue du Colonel Gios - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 74
Fax: 05 22 20 25 15
(A)

Dr. Fatima Zahra KHARBACHI
Hépatogastro-entérologue et
Proctologue
7, Angle du Boulevard Mohammed VI et
Rue Rachati - Casablanca
Tél: 05 20 88 88 55

كابيطال لوفيس 7: ملتقى شارع عبد الومن و زنفرة الرشاشي، عبارة 3 الطابق 2 المكتب رقم 50، (فوق سرجات ماركيت) - الدار البيضاء

Capital Office: 7 Angle Bd Abdelmoumen et Rue Rachati, Imm. N 3, 2ème étage bureau N 50 - Casablanca
(au dessus de Marjane Market Quartier des Hôpitaux) - Tél: 05 20 88 88 55 - E-mail: kharbachi.fatimazahra@gmail.com

LABORATOIRE CENTRE DE BIOLOGIE DES HÔPITAUX CBH
3, rue du Colonel Gros (Caïd Najem) Quartier des Hôpitaux 20100 Casablanca

Tél : 05.22.20.35.35/05.22.27.66.74

Fax : 05.22.20.35.15

Patente : 36332437

I.F. : 40288423

CNSS : 8036726

N° ICE : 0017 10887 0000 70

Code INPE: 093062362



FACTURE No : 200741

Casablanca, le : 10/11/2023

Analyses effectuées le .. : 10/11/23 à 10h01

Sur prescription du : Dr KHARBACHI Fatima Zahra

Identité Patient : Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Code Patient : 155472

BILAN :

1 NFP	NUMERATION FORMULE PLAQUETTES	B	80
2 CRP	CRP	B	100
3 BH	BILAN HEPATIQUE : TRANSA BILI PAL GGT	B	270
4 TP	TAUX DE PROTHROMBINE + INR	B	40
5 ALB	ALBUMINE SERIQUE	B	60
6 TSH	TSH US ULTRA-SENSIBLE	B	250

TOTAL B : 800

TOTAL HN : 0

0

MONTANT : 1097,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : 1097,00 DH

Dr. Youssef RENKIRAN
Chimiste Biologiste
Centre de Biologie des Hôpitaux Casablanca
Tél: 0522 20 35 35 - 0522 27 66 74

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX * CBH ***
3, Rue du Colonel Gros - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 74
Fax: 05 22 20 35 15

Dr. Fatima Zahra KHARBACHI

Hépatogastro-entérologue et Proctologue

Endoscopie digestive - Echographie

Proctologie médico-interventionnelle

د. فاطمة الزهراء خرباشي

إختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد - أمراض وجراحات القولون
نعمن القولون والعدة بالنظار - الفحص بالبري

- Lauréate de la faculté de médecine Hassan II - Casablanca
- Ancien médecin au CHU Ibn Rochd - Casablanca
- Ancien médecin en Unité de Proctologie de l'Hôpital Saint Joseph - Paris
- Diplômée en proctologie - Rennes
- Diplômée en pathologie fonctionnelle digestive - Lyon
- Diplômée en maladie inflammatoire chronique de l'intestin - Lille

ORDONNANCE

Casablanca le, 31/05/2023

PHARMACIE DE L'HOPITAL
IBNOU ROCHD sari
11, RUE GRASSET, QUARTIER
DES HOPITAUX - CASABLANCA
05 22 89 20 20

Mme DOUNIA CHAMSADHA

1° neobiline sirop

1 cas * 2 par jour pendant 2 semaines (avant les repas)

2° kalmagas

1 cp * 2 par jour pendant 2 semaines (à distance des repas)

3° inexistum 20

1 cp * 2 par jour pendant 2 semaines

4° meteospasmyl caps

1 capsule * 2 par jour pendant 2 semaines

5° librax

1 cp le soir au coucher pendant 1 mois

Librax®

Chlordiazépoxide
+ Bromure de Clidinium

5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés

كابيطال (ونيس 7: ملتقى شارع عبد المؤمن و زنقة) (الرشاشي، عبارة 3 (الطابق 2) (الكتب رقم 50)، (فوق مرجحات ماركت) - الدار البيضاء

Capital Office: 7 Angle Bd Abdelmoumen et Rue Rachati, Imm. N 3, 2ème étage bureau N 50 - Casablanca
(au dessus de Marjane Market Quartier des Hôpitaux) - Tél: 05 20 88 88 55 - E-mail: kharbachi.fatimazahra@gmail.com



Solution buvable
Voie orale

Neobiline® Digest

FORME ET PRESENTATION :

Solution buvable, flacon de 200ml

COMPOSITION :

Artichaut (Cynara scolymus) feuilles extrait sec, Ortie
Cassis (Ribes nigrum) feuilles extrait sec, Chardon-Ma
sec, nicotinamide, vitamine B6, vitamine B12, jus conc
Prune, eau déminéralisée, fructose, arôme, conservat

PROPRIETES ET UTILISATIONS :

Neobiline® Digest solution buvable est à base d'acti
digestif global.

CONSEILS D'UTILISATIONS :

1 cuillère à soupe 2 fois par jour, avant les principaux re

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Ne pas dépasser la dose journalière conseillée sans l'a
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par Pharmalife Research s.r.l.

Importé au Maroc par MEDIPRO Pharma

Autorisation ministère de la santé : DA20180907119DMP/20UCA/MAV3





Gouttes buvables
Voie orale

KALMAGAS®

Comprimé et Gouttes buvables



Comprimé
Voie orale

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé.
Gouttes buvables, flacon 30 ml.

COMPOSITION :

KALMAGAS® Comprimé : Charbon végétal antiagglomérant : dioxyde de silicium, essence essentielle de Menthe (*Mentha piperita*), polyvinylpyrrolidone, magnésium.
KALMAGAS® Gouttes buvables : Eau de menthe sec (6,7%), Camomille (*Matricaria recutita*), Conservateur naturel : Sorbate de Potassium.

PROPRIETES :

KALMAGAS® Comprimé est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal (dérivé de la tourbe) à grande capacité d'absorption des gaz, qui permet de soulager les patients ballonnés et améliorer la digestion.
- Huiles essentielles de Menthe et de Camomille pour éliminer les gaz intestinaux et lutter contre le transit intestinal.

KALMAGAS® Gouttes buvables :

- Fenouil et Carvi reconnus pour éliminer les gaz intestinaux.
- Menthe poivrée et Camomille pour améliorer la digestion.

UTILISATIONS :

- **KALMAGAS® Comprimé** est indiqué en cas de digestion difficile et de Troubles fonctionnels de l'intestin.
- **KALMAGAS® Gouttes buvables** sont indiquées chez l'enfant en cas de coliques, de constipation.

CONSEILS D'UTILISATIONS :

- **KALMAGAS® Comprimé :**
 - 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec un verre d'eau avant les principaux repas.
 - Il est recommandé de prendre **KALMAGAS® Comprimé** à distance des médicaments.
 - **KALMAGAS® Gouttes buvables :**
 - de 0 à 6 mois : 5 à 10 gouttes 1 fois par jour.
 - de 6 à 12 mois : 10 à 15 gouttes 1 fois par jour.
 - de 1 à 3 ans : 15 à 20 gouttes 1 fois par jour.
 - de 3 à 12 ans : 20 à 30 gouttes 1 fois par jour.
- Les doses peuvent être augmentées en toute sécurité selon les besoins.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par Thérapiapharm.

Numéro d'enregistrement au Ministère de la Santé et de la protection sociale :

KALMAGAS® Comprimé : DA20200606DMP/20UCA/MAv3

KALMAGAS® Gouttes buvables : DA 20201305591DMP/20UCA/MAv3



Pharmalife Research srl - Fabriqué en Italie

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.

• Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Nexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Nexium

3. Comment prendre Nexium

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Nexium

6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Nexium et dans quels cas est-il utilisé

Nexium contient un médicament appelé *ésooméprazole*. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. Nexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

• Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.

• Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.

• Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). Nexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.

• Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables. Si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants, contactez un médecin immédiatement :

• Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Nexium 20 mg, comprimés gastro-rés

Nexium 40 mg, comprimés gastro-rés

Notice : information du patient

ésooméprazole

Que faire si vous avez des difficultés à avaler ?

• Si vous avez des difficultés à avaler, mettez les comprimés dans un verre d'eau et écrasez-les.

• Mettez les comprimés dans un verre d'eau et écrasez-les.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Le mélange doit être consommé immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

AstraZeneca



20

20 mg

EXP. FEB-26
LOT ZENX
FAB. MAR-23

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubier brou el souan roches
noires carablanca
INEXIUM

20 mg C2 GR

Boîte 14

840U50MP121NRO P.P.V.: 82.10 DH
100811 9

Nexium 20 mg, comprimés gastro-rés

Nexium 40 mg, comprimés gastro-rés

Notice : information du patient

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.

• Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir

rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Nexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Nexium
3. Comment prendre Nexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Nexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Nexium et dans quels cas est-il utilisé

Nexium contient un médicament appelé *ésooméprazole*. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. Nexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.
- Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). Nexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.

Nexium agit dans l'estomac dû à une excroissance au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) après prévention de la récurrence.

Que faire si vous avez des difficultés à avaler ?

• Si vous avez des difficultés à avaler, mettez les comprimés dans un verre d'eau et écrasez-les.

• Mettez les comprimés dans un verre d'eau et écrasez-les.

• Remuez jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous.

• Buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange pendant la prise.

• Afin de prendre le médicament, buvez-le avec de l'eau.

• Si vous ne pouvez pas avaler le comprimé, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

Utilisation chez les enfants

Nexium, comprimés gastro-rés, est autorisé chez les enfants de 12 ans et plus.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous avez pris plus de Nexium que recommandé, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

AstraZeneca



20

20 mg

EXP. FEB-26
LOT ZENX
FAB. MAR-23

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubier brou el souan roches
noires carablanca
INEXIUM

20 mg

Boîte 14

840M50MP121NRO P.P.V.: 82.10 DH

100811 9

MeteoSpasmyl®

Capsule molle - Boite de 20
Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire
de prendre
des inform
Vous devez
en suivant
fournies d
médecin ou
• Gardez cet
reliure.
• Adressez-
conseil ou
• Si vous re
parlez-en
cien. Ceci
indésirable
cette notio
• Ne laissez
enfants.

ميتيوسباسمیل

مايوني
سيندلو

VN9167
03-2023
03-2026

LOT / رقم الحصة :
FAB / الإنتاج :
EXP / الص :
: : :

ميتيوسباسمیل®

سترات الأفيرين 60 ملغ سميكون 300 ملغ

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg
P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Elouadi - Casablanca



20 كبسولة ليثة

عن طريق الفم

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?

Informations supplémentaires.

pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL,
capsule molle ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISÉ ?

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dus à une tension psychique.

Composition :

5 mg de chlórdiazépoxide et 2,5 mg de bromure de clidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de

Propriétés :

Le chlórdiazépoxide et le bromure de clidinium sont des médicaments à action tranquillisante. Le chlórdiazépoxide, benzodiazépine, agit comme un relaxant musculaire et myorelaxant. Son emploi est de manière causale ou secondaire. Le bromure de clidinium est un antispasmodique qui agit sur la musculature lisse et inhibe l'action des médiateurs de l'acétyle, permet une action à la fois centrale et périphérique lors de troubles fonctionnels survenant au niveau des urinaires. Dans de tels cas, elle agit sur les végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlórdiazépoxide est absorbé en majeure partie sous forme inchangée. La concentration maximale est atteinte en moyenne 1 à 2 heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution est de 10 à 15 fois le poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques est inchangée ainsi que le desméthylchlórdiazépoxide actif, traversent rapidement les barrières biologiques. Ils sont également en petites quantités dans le lait maternel. La demi-vie plasmatique du chlórdiazépoxide est de 20 heures. Le volume de distribution et de dix heures environ. La demi-vie plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 heures. Le chlórdiazépoxide est retrouvé dans l'urine sous forme de chlórdiazépoxide et l'hydroxylation hépatique du chlórdiazépoxide sont les deux voies pharmacologiquement actifs : desméthylchlórdiazépoxide. Le démoépam et le desméthylchlórdiazépamide sont les deux produits de l'acide glucuronique. Lors d'administration chronique, l'inchangé s'installe en l'espace de trois jours. Le chlórdiazépoxide se beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spasmodique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

COMPOSITION :

Clidinium bromure (DCI) 2,5 mg
Chlórdiazépoxide 5 mg e-4-
Excipients q.s.p 1 comprimé dragéifié lum
Excipients à effet notoire :
Lactose et saccharose.
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

Librax® 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



LOT 23068 PER 04/2026
PPV 21.00 DH

Fabriqué sous licence **Meda**
par les laboratoires **Steripharma**
Z.I. Lina N° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable
Les comprimés s'accumulent