

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 055724

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10578 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : MAJHOUM MBAREK
Date de naissance : 10/03/1960
Adresse : AKID ELALLAM N° 8 HAJ MOULAY RACHID II BOURMAZIL
Tél. : 06 10 38 35 35 Total des frais engagés : 1384,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

MUPRAS
CHIRURGIE GENERALE
12 Bd du Nil bloc 22. 1er étage
Sidi Othmane
Tél 0522.37.36.37

Date de consultation : 17/11/2023
Nom et prénom du malade : Sawleja Fek
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 17/11/2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/11/23		5	25000	BELFAKIR ADIL YASSINE CHIRURGIE GÉNÉRALE 47 Bd du Nil bloc 22 1er étage Sidi Othmane Tél 0522.37.36.35

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

17/11/23

1134,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

A M

P C

I M

I V

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins

Coefficient

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr . BELFAKIR ADIL YASSINE

CHIRURGIE GENERALE

الدكتور بلفكير عادل ياسين

الجراحة العامة

- CHIRURGIE DIGESTIVE
- CHIRURGIE ENDOCRINIENNE
- CÆLIO CHIRURGIE
- ECHOGRAPHIE



- جراحة الجهاز الهضمي
- جراحة الغدد
- الجراحة بالمنظار
- الفحص بالصدى

Fait ,le : 17/11/2013

Sawlejane Fekher :

169500 Curaflex Sarel

90,00 Sarel / Geron

34400 Dispaunel

1/2 x 3/4

82100 Ager de S

84500 Zetalex

14000 Sarel



Dr. BELFAKIR ADIL YASSINE
CHIRURGIE GENERALE
42 Bd du Nil bloc 22 - 1er étage
Sidi Othmane
Tél: 05 22 37 36 35

42, Boulevard du Nil, Bloc 22, 1 er étage Sidi Othmane - Casablanca - Tél : 05 22 37 36 35

42, شارع النيل بلوك 22 الطابق الأول - سيدي عثمان - الدار البيضاء - الهاتف 05 22 37 36 35

E-mail : belfakiradil@hotmail.com - GSM : 06 44 88 62 04

2800
x 6

⑥ phosphorylase
peroxy

8200
x 6

⑦ phosphorylase
peroxy

2134,50

~~M. BELFAKIR ADIL YASSINE
CHIRURGIE GENERALE
47 Bd du Nil bloc 22. 1er étage
Sidi Othmane
Tél 0522.37.36.33~~

PHARMACIE BASMA
35, Bd. A. EL AMAM
Boumazel - Casablanca
Tél: 05.22.70.58.18

M. BELFAKIR ADIL YASSINE
CHIRURGIE GENERALE
47 Bd du Nil bloc 22. 1er étage
Sidi Othmane
Tél 0522.37.36.33

CuraFlor

Sachets

Lot : 02902

A consommer de
préférence avant le : 09/2025

PPC : 169,50 DH

FORME ET PRESENTATIONS :

Sachets monodose, Boite de 10 sachets et Boite de 20 sachets.

COMPOSITION :

Fructo-oligosaccharides de fruits (FOS), Inuline, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01- LMG P-21384, maltodextrine, Lactobacillus rhamnosus SD5217, Agents antiagglomérants : dioxyde de silicium, stéarate de magnésium végétal; arôme.

PROPRIÉTÉS :

CuraFlor® sachets est un symbiotique à base de probiotiques et de prébiotiques qui favorise l'équilibre de la flore intestinale.

- Recommandé en cas de déséquilibre de la flore intestinale.

Stable aux températures de 2 à 8°C

CuraFlor

Sachets

LOT: 02902
PER: 09/2025
PPC: 90,000H

FORME ET PRESENTATIONS :

Sachets monodose, Boite de 10 sachets et Boite de 20 sachets.

COMPOSITION :

Fructo-oligosaccharides de fruits (FOS), Inuline, Bifidobacterium animalis subsp.lactis BS01- LMG P-21384, maltodextrine, Lactobacillus rhamnosus SD5217, Agents antiagglomérants : dioxyde de silicium, stéarate de magnésium végétal; arôme.

PROPRIÉTÉS :

CuraFlor® sachets est un symbiotique à base de probiotiques et de prébiotiques qui favorise l'équilibre de la flore intestinale.

- Recommandé en cas de déséquilibre de la flore intestinale

DISPAINOL® 80

comprimés dispersibles et orodispersibles et
Phloroglucinol dihydraté

34,40

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles ?
3. Comment prendre DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE - code ATC : A03AX12 (A: appareil digestif et métabolisme) (G : système génito-urinaire).

DISPAINOL appartient à une classe de médicaments appelés antispasmodiques. Il agit contre les spasmes (contractions).

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles ?

Ne prenez jamais DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles :

- si vous êtes allergique au phloroglucinol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles.

Autres médicaments et DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament, ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Allaitement

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

DISPAINOL n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Ce médicament contient du lactose et de l'aspartam.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

3. COMMENT PRENDRE DISPAINOL 80 mg, comprimés dispersibles et orodispersibles ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

DISPAINOL est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Posologie

Chez l'adulte :

Prendre 2 comprimés oraux au moment de la crise. Renouveler en cas de spasmes importants, en

الصبيدلي
في آخر حشر في حال

Zetalax^{DM}[®]

microlavement

Lot : 038
À utiliser de
préférence avant le : 04/2027

PPC : 84,50 DH

QUAND UTILISER ZETALAX^{DM}[®] MICROLAVEMENT :

Zetalax^{DM}[®] Microlavement s'utilise en cas de constipation. La constipation consiste en l'altération du rythme normal d'évacuation; elle peut être liée à des facteurs comme un changement du style de vie, des habitudes alimentaires, etc.
En cas de constipation chronique, il est conseillé de consulter un médecin.

COMMENT FONCTIONNE ZETALAX^{DM}[®] MICROLAVEMENT :

Zetalax^{DM}[®] Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Les ingrédients contenus dans le microlavement garantissent le ramollissement et la lubrification de la masse fécale, ce qui permet ensuite une expulsion rapide et aisée des matières fécales.

Zetalax^{DM}[®] Microlavement ne contient pas de substances actives au niveau pharmacologique et son action est exclusivement mécanique. La présence d'extraits végétaux à action émolliente atténue l'effet irritant de la glycérine au niveau du rectum, ce qui rend son introduction plus aisée.

CAS DANS LESQUELS IL NE FAUT PAS UTILISER LE PRODUIT :

Zetalax^{DM}[®] Microlavement ne doit pas être utilisé en cas de douleur abdominale aiguë, nausée, vomissement, obstruction intestinale, saignement rectal d'origine inconnue, grave état de déshydratation, rectocolite hémorragique et inflammation hémorroïdale.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux ingrédients contenus dans le produit.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Avant d'utiliser le produit, demander conseil au médecin ou au pharmacien.

COMMENT UTILISER CE PRODUIT :

- Ouvrir l'emballage.
 - Enlever le bouchon du microlavement et lubrifier la canule avec une goutte du produit.
 - Introduire délicatement la canule dans le rectum, sans presser le tube.
 - Appuyer à fond sur le microlavement.
 - Extraire la canule sans relâcher la pression sur le tube, pour ne pas aspirer à nouveau le liquide.
- Il est conseillé d'appliquer un ou deux microlavements par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.
Suivre attentivement le mode d'emploi.
Conserver hors de portée des enfants.

INGÉDIENTS :

Glycérol, amidon, camomille extrait fluide, mauve extrait fluide, eau.

DATE D'ÉMISSION :

08/05/2011

Dispositif médical classe 1.

Autorisation ministère de la santé n° : 860/16116/2016/ DMP/20/DM



Fabricant

Zeta Farmaceutici S.p.A.
Via Galvani, 10
Sandrigo (VI)
ITALY

Importé au Maroc par :

Laboratoires IRCOS
N°109 Q.I sidi ghanem
40000 MARRAKECH

Distribué au Maroc par :

MEDI PRO PHARMA
Borj El yacout, Bd Rahal El Meskini.
20120. Casablanca.

Doliprane® 1000

PARACETAMOL

Comprimé

PPV: 14DH00

PER: 06/26

LOT: M1903

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, providone K30, amidon de maïs pré-gélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants :

allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



ملغ 2,5/ ملغ

ملغ 5/ ملغ 500

ملغ 5/ ملغ 1000

غلوكوفانس

غلوكوفانس

أقراص مغلفة

كلوربيدات الميتورمين / غلينكلاميد

عن طريق الفم

- إذا كنت مرضعاً،

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو لماسح يتطلب حقن ملون مبيان أساسه اليود، في دورتك الدورية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو جوري التوسع أو محيط بالجافية،

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذاء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيراً جانبياً نادراً، ولكنه خطير، يسمى "الذاء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الداء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد (انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاضطرابات الطبية الأخرى التي تجعل الجسم يتقبل الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلاً). فإذا انطقت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة اجتفاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بآرغب مستشفى إذا ظهرت عليك أعراض الداء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الداء اللاكتوزيدي:

- الآم المعدة (الآم في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالآلام عاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونقص القلب.

إن الداء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، يجب أن تتوقف عن تناول غلوكوفانس عند إجراء العملية وبعدها لبعض الوقت. وسيقرر طبيبك متى تتوقف عن العلاج بغلوكوفانس ومتى تعود إليه.

خطر هبوط سكر الدم

- إذا كنت تعاني من أعراض مرتبطة بانخفاض سكر الدم.
قد تظهر الأعراض بدون سابق إنذار، مثل التعرق البارد، شحوب الجلد وبرودته، الدوخة، الصداع، هيجان القلب، غثيان، الإحساس بالجوع الشديد، اضطرابات البصر مؤقتاً، النعاس، الإعياء والتعب بشكل غير اعتيادي، العصبية، الارتعاش، الإحساس بالغث واللبس وصعوبة التركيز.
- يكون المرضى المسنون (65 سنة وما فوق) حساسين أكثر لهبوط سكر الدم الناتج عن الغلبيكلاميد، وهم بذلك أكثر عرضة لخطر هبوط سكر الدم. قد يصعب التعرف على هبوط سكر الدم عند المرضى المسنين، ولذلك يجب تحديد الجرعة البدائية وجرعة الصيانة من غلينكلاميد بعناية شديدة من طرف الطبيب لتجنب أي هبوط في سكر الدم.

إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض :

- تناول أقراص غلوكوز أو مادة حلوة (عسل، حلوى، عصير فاكهة)،
- يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب فوراً لأن الأمر قد يقتضي نقلك إلى المستشفى والبقاء فيه حتى يعود سكر الدم إلى مستوى طبيعي، ثم استريح.

نصائح عامة: أخبر أفراد عائلتك واصفائك وزملائك بأن يغيروا وضعتك على الجنب وأن يطلبوا فوراً مساعدة طبيب إذا غبت عن الوعي. لا يجب أبداً أن يمشواك شرباً للآكل أو الشرب وأنت غائب عن الوعي لأن ذلك قد يخفك.

قد يحدث هبوط سكر الدم :

- إذا لم تأكل ما يكفي أو تخطيت وجبة،
- إذا كانت تغذية لا تحتوي على ما يكفي من السكريات أو غير متوازنة،
- إذا كنت تستهلك الكحول،
- إذا تمرنت أكثر من المعتاد،
- إذا كانت لديك مشاكل كبد أو كلي، أو اضطرابات هرمونية،
- إذا كانت جرعة دوائك عالية،
- إذا كنت مسناً،

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأشد احتياجاً إلى قراءتها من جديد.
- توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
- هذا الدواء موصوف لك شخصياً ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- 1- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- 2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- 3- كيف يتشتمل هذا الدواء ؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- 5- كيف يحتفظ دواء غلوكوفانس ؟
- 6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

يتكون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوربيدات الميتورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغلبيكلاميد).

الأنسولين هرمون تساعد خلايا الجسم على استقلاب الجلوكوز (السكر) من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة أو لتخزينه واستعماله لاحقاً. البنكرياس عند المرضى المصابين بالسكري من النوع 2 (يعني سكري غير مرتبط بالأنسولين) لا يفرز ما يكفي من الأنسولين أو جسمهم لا يستجيب بطريقة صحيحة للأنسولين المفرز. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم. غلوكوفانس يساعد على خفض نسبة سكر الدم واستقراره في نسبة عادية. يستعمل غلوكوفانس عن طريق الفم (بلعاً) لعلاج السكري من نوع 2 عند المرضى البالغين. ويستعمل غلوكوفانس الذي كان يتناول بموجبه المرضي هاتين المادتين الفعالتين (كلوربيدات الميتورمين والغلبيكلاميد) منفردتين، والذين ثبت لديهم فعالية الجمع بينهما في السيطرة على نسب سكر الدم.

2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟

لا يجب أبداً استعمال غلوكوفانس في الحالات التالية:
- إذا كان لديك تحسس (فرط تحسس) من كلوربيدات الميتورمين، أو من الغلبيكلاميد، أو غيرها من السلفونيل يوريا أو من أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، المذكورة في الفقرة 6؛
- إذا كنت تعاني من تقيؤ حاد في وظيفة الكلية؛
- إذا كنت تعاني من اعتلالات كبدية؛
- إذا كنت مصاباً بالسكري من النوع 1 (الاعتماد على الأنسولين)؛
- إذا كان السكري عندك خارج السيطرة، مثلاً فرط نسبة سكر الدم (نسبة جلوكوز عالية بالدم)، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الإسهال، أو فقدان الوزن سريعاً، أو الداء اللاكتوزيدي (انظر فقرة "خطر الداء اللاكتوزيدي" أدناه) أو حمض.
في حالة الحمض، تتركز الأملاح الكيتونية في الدم مما قد يؤدي إلى حالة سلبية لغيبوبة سكري. ومن ضمن أعراضها: آلام المعدة، تنفس سريع وعميق، نعاس، رائحة غير مألوفة بالدم كالفاكهة.
- إذا كان لديك اعتلال خطير (مثل اعتلال المسالك التنفسية أو البولية)
- إذا كنت تعاني من الاجتهاد (بسبب الإسهال المتواصل أو الخطير، أو التقيؤ المتكرر مثلاً)
- إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مشاكل القلب أو إذا تعرضت حديثاً لنزعة صدرية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس
- إذا كنت تعاني من الزفيرية (مرض وراثي نادر ينتج عن نقص في الإنزيمات يجعل الجسم ينتج ويفرز البورفيرين بكمية زائدة، وهي المادة التي تنتج جزء الصباغ الدموي الذي ينقل الأكسجين)
- إذا كنت تتناول دواء ميكونازول (لعلاج بعض الفطريات)، ولو كان يستعمل موضعياً
- إذا كنت تعوز في استهلاك الكحول (سواء يومياً أو من وقت لآخر)،

ملغ 2,5/ ملغ

ملغ 5/ ملغ 500

ملغ 5/ ملغ 1000

غلوكوفانس

غلوكوفانس

أقراص مغلقة

كلوربيدات الميتورمين / غلينكلاميد

عن طريق الفم

- إذا كنت مرضعاً،

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو لماسح يتطلب حقن ملون مبيان أساسه اليود، في دورتك الدورية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو جوري التوسع أو محيط بالجافية،

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذاء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيراً جانبياً نادراً، ولكنه خطير، يسمى "الذاء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الداء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد (انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاضطرابات الطبية الأخرى التي تجعل الجسم ينتقل إلى الأسيجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلاً). فإذا انطقت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة اجتفاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بآرغب مستشفى إذا ظهرت عليك أعراض الداء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الداء اللاكتوزيدي:

- الآم المعدة (الآم في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالآلام عاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونضج القلب.

إن الداء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، يجب أن تتوقف عن تناول غلوكوفانس عند إجراء العملية وبعدها لبعض الوقت. وسيقرر طبيبك متى تتوقف عن العلاج بغلوكوفانس ومتى تعود إليه.

خطر هبوط سكر الدم

- إذا كنت تعاني من أعراض مرتبطة بانخفاض سكر الدم.
قد تظهر الأعراض بدون سابق إنذار، مثل التعرق البارد، شحوب الجلد وبرودته، الدوخة، الصداع، هيجان القلب، غثيان، الإحساس بالجوع الشديد، اضطرابات البصر مؤقتاً، النعاس، الإعياء والتعب بشكل غير اعتيادي، العصبية، الارتعاش، الإحساس بالغث واللبس وصعوبة التركيز.
- يكون المرضى المسنون (65 سنة وما فوق) حساسين أكثر لهبوط سكر الدم الناتج عن الغلبيكلاميد، وهم بذلك أكثر عرضة لخطر هبوط سكر الدم. قد يصعب التعرف على هبوط سكر الدم عند المرضى المسنين، ولذلك يجب تحديد الجرعة البدائية وجرعة الصيانة من غلينكلاميد بعناية شديدة من طرف الطبيب لتجنب أي هبوط في سكر الدم.

إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض :

- تناول أقراص غلوكوز أو مادة حلوة (عسل، حلوى، عصير فاكهة)،
- يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب فوراً لأن الأمر قد يقتضي نقلك إلى المستشفى والبقاء فيه حتى يعود سكر الدم إلى مستوى طبيعي، ثم استريح.

نصائح عامة: أخبر أفراد عائلتك واصفائك وزملائك بأن يغيروا وضعتك على الجنب وأن يطلبوا فوراً مساعدة طبيب إذا غبت عن الوعي. لا يجب أبداً أن يمشواك شرباً للآكل أو الشرب وأنت غائب عن الوعي لأن ذلك قد يخفك.

قد يحدث هبوط سكر الدم :

- إذا لم تأكل ما يكفي أو تخطيت وجبة،
- إذا كانت تغذية لا تحتوي على ما يكفي من السكريات أو غير متوازنة،
- إذا كنت تستهلك الكحول،
- إذا تمرنت أكثر من المعتاد،
- إذا كانت لديك مشاكل كبد أو كلي، أو اضطرابات هرمونية،
- إذا كانت جرعة دوائك عالية،
- إذا كنت مسناً،

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأشدّ حدّ حتّى إذا قرأتها من جديد.
- توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
- هذا الدواء موصوف لك شخصياً ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- 1- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- 2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- 3- كيف يتّخذ هذا الدواء ؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- 5- كيف يحتفظ بدواء غلوكوفانس ؟
- 6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

يتكون غلوكوفانس من دوائين خافضين لسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوربيدات الميتورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغلبيكلاميد).

الأنسولين هرمون تساعد خلايا الجسم على استقلاب الجلوكوز (السكر) من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة أو لتخزينه واستعماله لاحقاً. البنكرياس عند المرضى المصابين بالسكري من النوع 2 (يعني سكري غير مرتبط بالأنسولين) لا يفرز ما يكفي من الأنسولين أو جسمهم لا يستجيب بطريقة صحيحة للأنسولين المفرز. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم. غلوكوفانس يساعد على خفض نسبة سكر الدم واستقراره في نسبة عادية. يستعمل غلوكوفانس عن طريق الفم (بلعاً) لعلاج السكري من نوع 2 عند المرضى البالغين. ويستعمل غلوكوفانس الذي كان يتناول بموجبه المرضي هاتين المادتين الفعالتين (كلوربيدات الميتورمين والغلبيكلاميد) منفردتين، والذين ثبت لديهم فعالية الجمع بينهما في السيطرة على نسب سكر الدم.

2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟

لا يجب أبداً استعمال غلوكوفانس في الحالات التالية:
- إذا كان لديك حمى (فرط حمى) من كلوربيدات الميتورمين، أو من الغلبيكلاميد، أو غيرها من السلفونيل يوريا من أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، المذكورة في الفقرة 6؛
- إذا كنت تعاني من تقيؤ حاد في وظيفة الكلى؛
- إذا كنت تعاني من اعتلالات كبدية؛
- إذا كنت مصاباً بالسكري من النوع 1 (الاعتماد على الأنسولين)؛
- إذا كان السكري عندك خارج السيطرة، مثلاً فرط نسبة سكر الدم (نسبة جلوكوز عالية بالدم)، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الإسهال، أو فقدان الوزن سريعاً، أو الداء اللاكتوزيدي (انظر فقرة "خطر الداء اللاكتوزيدي" أدناه) أو حمض.
في حالة الحمض، تتركز الأملاح الكيتونية في الدم مما قد يؤدي إلى حالة سلبية لغيبوبة سكري. ومن ضمن أعراضها: آلام المعدة، تنفس سريع وعميق، نعاس، رائحة غير مألوفة بالدم كالفاكهة.
- إذا كان لديك اعتلال خطير (مثل اعتلال المسالك التنفسية أو البولية)
- إذا كنت تعاني من الاجتهاد (بسبب الإسهال المتواصل أو الخطير، أو التقيؤ المتكرر مثلاً)
- إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مشاكل القلب أو إذا تعرضت حديثاً لنزعة صدرية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس
- إذا كنت تعاني من الزفيرية (مرض وراثي نادر ينتج عن نقص في الإنزيمات يجعل الجسم ينتج ويفرز البورفيرين بكمية زائدة، وهي المادة التي تنتج جزء الصباغ الدموي الذي ينقل الأكسجين)
- إذا كنت تتناول دواء ميكونازول (لعلاج بعض الفطريات)، ولو كان يستعمل موضعياً
- إذا كنت تعوز في استهلاك الكحول (سواء يومياً أو من وقت لآخر)،

ملغ 2,5/ ملغ

ملغ 5/ ملغ 500

ملغ 5/ ملغ 1000

غلوكوفانس

غلوكوفانس

أقراص مغلقة

كلوربيدات الميتورمين / غلينكلاميد

عن طريق الفم

- إذا كنت مرضعاً،

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو لماسح يتطلب حقن ملون مبيان أساسه اليود، في دورتك الدورية،

- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو جوريبي التوسع أو محيط بالجافية،

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذاء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيراً جانبياً نادراً، ولكنه خطير، يسمى "الذاء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الداء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد (انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاضطرابات الطبية الأخرى التي تجعل الجسم يتقبل الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلاً).

فإذا انطقت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة اجتفاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بآرغب مستشفى إذا ظهرت عليك أعراض الداء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الداء اللاكتوزيدي:

- الآم المعدة (الآم في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالآلام عاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونضج القلب.

إن الداء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، يجب أن تتوقف عن تناول غلوكوفانس عند إجراء العملية وبعدها لبعض الوقت. وسيقرر طبيبك متى تتوقف عن العلاج بغلوكوفانس ومتى تعود إليه.

خطر هبوط سكر الدم

- إذا كنت تعاني من أعراض مرتبطة بانخفاض سكر الدم.
قد تظهر الأعراض بدون سابق إنذار، مثل التعرق البارد، شحوب الجلد وبرودته، الدوخة، الصداع، هيجان القلب، غثيان، الإحساس بالجوع الشديد، اضطرابات البصر مؤقتاً، النعاس، الإعياء والتعب بشكل غير اعتيادي، العصبية، الارتعاش، الإحساس بالغث واللبس وصعوبة التركيز.
- يكون المرضى المسنون (65 سنة وما فوق) حساسين أكثر لهبوط سكر الدم الناتج عن الغلبيكلاميد، وهم بذلك أكثر عرضة لخطر هبوط سكر الدم. قد يصعب التعرف على هبوط سكر الدم عند المرضى المسنين، ولذلك يجب تحديد الجرعة البدائية وجرعة الصيانة من غلينكلاميد بعناية شديدة من طرف الطبيب لتجنب أي هبوط في سكر الدم.

إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض :

- تناول أقراص غلوكوز أو مادة حلوة (عسل، حلوى، عصير فاكهة)،
- يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب فوراً لأن الأمر قد يقتضي نقلك إلى المستشفى والبقاء فيه حتى يعود سكر الدم إلى مستوى طبيعي، ثم استريح.

نصائح عامة: أخبر أفراد عائلتك واصفانك وزملائك بأن يغيروا وضعتك على الجنب وأن يطلبوا فوراً مساعدة طبيب إذا غبت عن الوعي. لا يجب أبداً أن يمشواك شرباً للآكل أو الشرب وأنت غائب عن الوعي لأن ذلك قد يخنقك.

قد يحدث هبوط سكر الدم :

- إذا لم تأكل ما يكفي أو تخطيت وجبة،
- إذا كانت تغذية لا تحتوي على ما يكفي من السكريات أو غير متوازنة،
- إذا كنت تشرب الكحول،
- إذا تمرنت أكثر من المعتاد،
- إذا كانت لديك مشاكل كبد أو كلي، أو اضطرابات هرمونية،
- إذا كانت جرعة دوائك عالية،
- إذا كنت مسناً،

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأشدّ حدّ حتّى إذا قرأتها من جديد.
- توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
- هذا الدواء موصوف لك شخصياً ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- 1- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- 2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- 3- كيف يتّخذ هذا الدواء ؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- 5- كيف يحتفظ دواء غلوكوفانس ؟
- 6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

يتكون غلوكوفانس من دوائين خافضين لسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوربيدات الميتورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغلبيكلاميد).

الأنسولين هرمون تساعد خلايا الجسم على استقلاب الجلوكوز (السكر) من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة أو لتخزينه واستعماله لاحقاً. البنكرياس عند المرضى المصابين بالسكري من النوع 2 (يعني سكري غير مرتبط بالأنسولين) لا يفرز ما يكفي من الأنسولين أو جسمهم لا يستجيب بطريقة صحيحة للأنسولين المفرز. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم. غلوكوفانس يساعد على خفض نسبة سكر الدم واستقراره في نسبة عادية. يُستعمل غلوكوفانس عن طريق الفم (بلعاً) لعلاج السكري من نوع 2 عند المرضى البالغين. ويُستعمل عوض العلاج الذي كان يتناول بموجبه المرضى هاتين المادتين الفعالتين (كلوربيدات الميتورمين والغلبيكلاميد) منفردتين، والذين ثبت لديهم فعالية الجمع بينهما في السيطرة على نسب سكر الدم.

2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟

لا يجب أبداً استعمال غلوكوفانس في الحالات التالية:

- إذا كان لديك تحمض (فرط تحمض) من كلوربيدات الميتورمين، أو من الغلبيكلاميد، أو غيرها من السلفونيل يوريا من أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، المذكورة في الفقرة 6؛
- إذا كنت تعاني من تقيؤ حاد في وظيفة الكلى؛
- إذا كنت تعاني من اعتلالات كبدية؛
- إذا كنت مصاباً بالسكري من النوع 1 (الاعتماد على الأنسولين)؛
- إذا كان السكري عندك خارج السيطرة، مثلاً فرط نسبة سكر الدم (نسبة جلوكوز عالية بالدم)، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الإسهال، أو فقدان الوزن سريعاً، أو الداء اللاكتوزيدي (انظر فقرة "خطر الداء اللاكتوزيدي" أدناه) أو حمض.

في حالة الحمض، تتركز الأملاح الكيتونية في الدم مما قد يؤدي إلى حالة سلبية لغيبوبة سكري. ومن ضمن أعراضه: الآم المعدة، تنفس سريع وعميق، نعاس، رائحة غير مألوفة بالدم كالفاكهة.

- إذا كان لديك اعتلال خطير (مثل اعتلال المسالك التنفسية أو البولية)
- إذا كنت تعاني من الاجتهاد (بسبب الإسهال المتواصل أو الخطير، أو التقيؤ المتكرر مثلاً)
- إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مشاكل القلب أو إذا تعرضت حديثاً لنزعة صدرية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس
- إذا كنت تعاني من الزفيرية (مرض وراثي نادر ينتج عن نقص في الإنزيمات يجعل الجسم ينتج ويفرز البورفيرين بكمية زائدة، وهي المادة التي تنتج جزء الصباغ الدموي الذي ينقل الأكسجين)
- إذا كنت تتناول دواء ميكونازول (لعلاج بعض الفطريات)، ولو كان يستعمل موضعياً
- إذا كنت تعوز في استهلاك الكحول (سواء يومياً أو من وقت لآخر)،

ملغ 2,5/ ملغ

ملغ 5/ ملغ 500

ملغ 5/ ملغ 1000

غلوكوفانس

غلوكوفانس

أقراص مغلفة

كلوربيدات الميتورمين / غلينكلاميد

عن طريق الفم

- إذا كنت مرضعاً،

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو لماسح يتطلب حقن ملون مبيان أساسه اليود، في دورتك الدورية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو جوريبي التوسع أو محيط بالجافية،

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذاء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيراً جانبياً نادراً، ولكنه خطير، يسمى "الذاء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الداء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد (انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاضطرابات الطبية الأخرى التي تجعل الجسم ينتقل إلى الأسيجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلاً). فإذا انطقت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة اجتفاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بآرغب مستشفى إذا ظهرت عليك أعراض الداء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الداء اللاكتوزيدي:

- الآم المعدة (الآم في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالآلام عاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونضج القلب.

إن الداء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، يجب أن تتوقف عن تناول غلوكوفانس عند إجراء العملية وبعدها لبعض الوقت. وسيقرر طبيبك متى تتوقف عن العلاج بغلوكوفانس ومتى تعود إليه.

خطر هبوط سكر الدم

- إذا كنت تعاني من أعراض مرتبطة بانخفاض سكر الدم.
قد تظهر الأعراض بدون سابق إنذار، مثل التعرق البارد، شحوب الجلد وبرودته، الدوخة، الصداع، هيجان القلب، غثيان، الإحساس بالجوع الشديد، اضطرابات البصر مؤقتاً، النعاس، الإعياء والتعب بشكل غير اعتيادي، العصبية، الارتعاش، الإحساس بالغث واللبس وصعوبة التركيز.
- يكون المرضى المسنون (65 سنة وما فوق) حساسين أكثر لهبوط سكر الدم الناتج عن الغلبيكلاميد، وهم بذلك أكثر عرضة لخطر هبوط سكر الدم. قد يصعب التعرف على هبوط سكر الدم عند المرضى المسنين، ولذلك يجب تحديد الجرعة البدائية وجرعة الصيانة من غلينكلاميد بعناية شديدة من طرف الطبيب لتجنب أي هبوط في سكر الدم.

إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض :

- تناول أقراص غلوكوز أو مادة حلوة (عسل، حلوى، عصير فاكهة)،
- يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب فوراً لأن الأمر قد يقتضي نقلك إلى المستشفى والبقاء فيه حتى يعود سكر الدم إلى مستوى طبيعي، ثم استريح.

نصائح عامة: أخبر أفراد عائلتك واصفانك وزملائك بأن يغيروا وضعتك على الجنب وأن يطلبوا فوراً مساعدة طبيب إذا غبت عن الوعي. لا يجب أبداً أن يمشواك شرباً للآكل أو الشرب وأنت غائب عن الوعي لأن ذلك قد يخنقك.

قد يحدث هبوط سكر الدم :

- إذا لم تأكل ما يكفي أو تخطيت وجبة،
- إذا كانت تغذية لا تحتوي على ما يكفي من السكريات أو غير متوازنة،
- إذا كنت تستهلك الكحول،
- إذا تمرنت أكثر من المعتاد،
- إذا كانت لديك مشاكل كبد أو كلي، أو اضطرابات هرمونية،
- إذا كانت جرعة دوائك عالية،
- إذا كنت مسناً،

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأشدّ حدّ حتّى إذا قرأتها من جديد.
- توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
- هذا الدواء موصوف لك شخصياً ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- 1- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- 2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- 3- كيف يتّخذ هذا الدواء ؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- 5- كيف يحتفظ دواء غلوكوفانس ؟
- 6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

يتكون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوربيدات الميتورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغلبيكلاميد).

الأنسولين هرمون تساعد خلايا الجسم على استقلاب الجلوكوز (السكر) من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة أو لتخزينه واستعماله لاحقاً. البنكرياس عند المرضى المصابين بالسكري من النوع 2 (يعني سكري غير مرتبط بالأنسولين) لا يفرز ما يكفي من الأنسولين أو جسمهم لا يستجيب بطريقة صحيحة للأنسولين المفرز. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم. غلوكوفانس يساعد على خفض نسبة سكر الدم واستقراره في نسبة عادية. يُستعمل غلوكوفانس عن طريق الفم (بلعاً) لعلاج السكري من نوع 2 عند المرضى البالغين. ويُستعمل عوض العلاج الذي كان يتناول بموجبه المرضى هاتين المادتين الفعالتين (كلوربيدات الميتورمين والغلبيكلاميد) منفردتين، والذين ثبت لديهم فعالية الجمع بينهما في السيطرة على نسب سكر الدم.

2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟

لا يجب أبداً استعمال غلوكوفانس في الحالات التالية:
- إذا كان لديك تحمض (فرط تحمض) من كلوربيدات الميتورمين، أو من الغلبيكلاميد، أو غيرها من السلفونيل يوريا من أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، المذكورة في الفقرة 6؛
- إذا كنت تعاني من تقيؤ حاد في وظيفة الكلى؛
- إذا كنت تعاني من اعتلالات كبدية؛
- إذا كنت مصاباً بالسكري من النوع 1 (الاعتماد على الأنسولين)؛
- إذا كان السكري عندك خارج السيطرة، مثلاً فرط نسبة سكر الدم (نسبة جلوكوز عالية بالدم)، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الإسهال، أو فقدان الوزن سريعاً، أو الداء اللاكتوزيدي (انظر فقرة "خطر الداء اللاكتوزيدي" أدناه) أو حمض.
في حالة الحمض، تتركز الأملاح الكيتونية في الدم مما قد يؤدي إلى حالة سلبية لغيبوبة سكري. ومن ضمن أعراضها: آلام المعدة، تنفس سريع وعميق، نعاس، رائحة غير مألوفة بالدم كالفاكهة.
- إذا كان لديك اعتلال خطير (مثل اعتلال المسالك التنفسية أو البولية)
- إذا كنت تعاني من الاجتهاد (بسبب الإسهال المتواصل أو الخطير، أو التقيؤ المتكرر مثلاً)
- إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مشاكل القلب أو إذا تعرضت حديثاً لنزبة صدرية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس
- إذا كنت تعاني من الزفيرية (مرض وراثي نادر ينتج عن نقص في الإنزيمات يجعل الجسم ينتج ويفرز البورفيرين بكمية زائدة، وهي المادة التي تنتج جزء الصباغ الدموي الذي ينقل الأكسجين)
- إذا كنت تتناول دواء ميكونازول (لعلاج بعض الفطريات)، ولو كان يستعمل موضعياً
- إذا كنت تعوز في استهلاك الكحول (سواء يومياً أو من وقت لآخر)،

ملغ 2,5/ ملغ

ملغ 5/ ملغ 500

ملغ 5/ ملغ 1000

غلوكوفانس

غلوكوفانس

أقراص مغلفة

كلوربيدات الميتورمين / غلينكلاميد

عن طريق الفم

- إذا كنت مرضعاً،

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو لماسح يتطلب حقن ملون مبيان أساسه اليود، في دورتك الدورية،

- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو جوري التوسع أو محيط بالجافية،

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذاء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيراً جانبياً نادراً، ولكنه خطير، يسمى "الذاء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الداء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد (انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاضطرابات الطبية الأخرى التي تجعل الجسم يتقبل الأسيجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلاً).

فإذا انطقت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة اجتفاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بآرغب مستشفى إذا ظهرت عليك أعراض الداء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الداء اللاكتوزيدي:

- الآم المعدة (الآم في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالآلام عاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونقص القلب.

إن الداء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، يجب أن تتوقف عن تناول غلوكوفانس عند إجراء العملية وبعدها لبعض الوقت. وسيقرر طبيبك متى تتوقف عن العلاج بغلوكوفانس ومتى تعود إليه.

خطر هبوط سكر الدم

- إذا كنت تعاني من أعراض مرتبطة بانخفاض سكر الدم.
قد تظهر الأعراض بدون سابق إنذار، مثل التعرق البارد، شحوب الجلد وبرودته، الدوخة، الصداع، هيجان القلب، غثيان، الإحساس بالجوع الشديد، اضطرابات البصر مؤقتاً، النعاس، الإعياء والتعب بشكل غير اعتيادي، العصبية، الارتعاش، الإحساس بالغث واللبس وصعوبة التركيز.
- يكون المرضى المسنون (65 سنة وما فوق) حساسين أكثر لهبوط سكر الدم الناتج عن الغلبيكلاميد، وهم بذلك أكثر عرضة لخطر هبوط سكر الدم. قد يصعب التعرف على هبوط سكر الدم عند المرضى المسنين، ولذلك يجب تحديد الجرعة البدائية وجرعة الصيانة من غلينكلاميد بعناية شديدة من طرف الطبيب لتجنب أي هبوط في سكر الدم.

إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض :

- تناول أقراص غلوكوز أو مادة حلوة (عسل، حلوى، عصير فاكهة)،
- يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب فوراً لأن الأمر قد يقتضي نقلك إلى المستشفى والبقاء فيه حتى يعود سكر الدم إلى مستوى طبيعي، ثم استريح.

نصائح عامة: أخبر أفراد عائلتك واصفائك وزملائك بأن يغيروا وضعتك على الجنب وأن يطلبوا فوراً مساعدة طبيب إذا غبت عن الوعي. لا يجب أبداً أن يمشواك شرباً للآكل أو الشرب وأنت غائب عن الوعي لأن ذلك قد يخنقك.

قد يحدث هبوط سكر الدم :

- إذا لم تأكل ما يكفي أو تخطيت وجبة،
- إذا كانت تغذية لا تحتوي على ما يكفي من السكريات أو غير متوازنة،
- إذا كنت تستهلك الكحول،
- إذا تمرنت أكثر من المعتاد،
- إذا كانت لديك مشاكل كبد أو كلي، أو اضطرابات هرمونية،
- إذا كانت جرعة دوائك عالية،
- إذا كنت مسناً،

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأشدّ حدّ حتّى إذا قرأتها من جديد.
- توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
- هذا الدواء موصوف لك شخصياً ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- 1- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- 2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- 3- كيف يتّخذ هذا الدواء ؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- 5- كيف يحتفظ بدواء غلوكوفانس ؟
- 6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

يتكون غلوكوفانس من دوائين خافضين لسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوربيدات الميتورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغلبيكلاميد).

الأنسولين هرمون تساعد خلايا الجسم على استقلاب الجلوكوز (السكر) من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة أو لتخزينه واستعماله لاحقاً. البنكرياس عند المرضى المصابين بالسكري من النوع 2 (يعني سكري غير مرتبط بالأنسولين) لا يفرز ما يكفي من الأنسولين أو جسمهم لا يستجيب بطريقة صحيحة للأنسولين المفرز. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم. غلوكوفانس يساعد على خفض نسبة سكر الدم واستقراره في نسبة عادية. يُستعمل غلوكوفانس عن طريق الفم (بلعاً) لعلاج السكري من نوع 2 عند المرضى البالغين. ويُستعمل عوض العلاج الذي كان يتناول بموجبه المرضى هاتين المادتين الفعالتين (كلوربيدات الميتورمين والغلبيكلاميد) منفردتين، والذين ثبت لديهم فعالية الجمع بينهما في السيطرة على نسب سكر الدم.

2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟

لا يجب أبداً استعمال غلوكوفانس في الحالات التالية:
- إذا كان لديك حمى (فرط حمى) من كلوربيدات الميتورمين، أو من الغلبيكلاميد، أو غيرها من السلفونيل يوريا من أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، المذكورة في الفقرة 6؛
- إذا كنت تعاني من تقيؤ حاد في وظيفة الكلى؛
- إذا كنت تعاني من اعتلالات كبدية؛
- إذا كنت مصاباً بالسكري من النوع 1 (الاعتماد على الأنسولين)؛
- إذا كان السكري عندك خارج السيطرة، مثلاً فرط نسبة سكر الدم (نسبة جلوكوز عالية بالدم)، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الإسهال، أو فقدان الوزن سريعاً، أو الداء اللاكتوزيدي (انظر فقرة "خطر الداء اللاكتوزيدي" أدناه) أو حمض.
في حالة الحمض، تتركز الأملاح الكيتونية في الدم مما قد يؤدي إلى حالة سلبية لغيبوبة سكري. ومن ضمن أعراضها: آلام المعدة، تنفس سريع وعميق، نعاس، رائحة غير مألوفة بالدم كالفاكهة.
- إذا كان لديك اعتلال خطير (مثل اعتلال المسالك التنفسية أو البولية)
- إذا كنت تعاني من الاجتهاد (بسبب الإسهال المتواصل أو الخطير، أو التقيؤ المتكرر مثلاً)
- إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مشاكل القلب أو إذا تعرضت حديثاً لنزعة صدرية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس
- إذا كنت تعاني من الزفيرية (مرض وراثي نادر ينتج عن نقص في الإنزيمات يجعل الجسم ينتج ويفرز البورفيرين بكمية زائدة، وهي المادة التي تنتج جزء الصباغ الدموي الذي ينقل الأكسجين)
- إذا كنت تتناول دواء ميكونازول (لعلاج بعض الفطريات)، ولو كان يستعمل موضعياً
- إذا كنت تعوز في استهلاك الكحول (سواء يومياً أو من وقت لآخر)،

ملغ 2,5/ ملغ

ملغ 5/ ملغ 500

ملغ 5/ ملغ 1000

غلوكوفانس

غلوكوفانس

أقراص مغلقة

كلوربيدات الميتورمين / غلينكلاميد

عن طريق الفم

- إذا كنت مرضعاً،

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو لماسح يتطلب حقن ملون مبيان أساسه اليود، في دورتك الدورية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو جوريي التوسع أو محيط بالجافية،

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذاء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيراً جانبياً نادراً، ولكنه خطير، يسمى "الذاء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الداء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد (انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاضطرابات الطبية الأخرى التي تجعل الجسم يتقبل الأسيجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلاً). فإذا انطقت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة اجتفاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بآرغب مستشفى إذا ظهرت عليك أعراض الداء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الداء اللاكتوزيدي:

- الآم المعدة (الآم في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالآلام عاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونضج القلب.

إن الداء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، يجب أن تتوقف عن تناول غلوكوفانس عند إجراء العملية وبعدها لبعض الوقت. وسيقرر طبيبك متى تتوقف عن العلاج بغلوكوفانس ومتى تعود إليه.

خطر هبوط سكر الدم

- إذا كنت تعاني من أعراض مرتبطة بانخفاض سكر الدم.
قد تظهر الأعراض بدون سابق إنذار، مثل التعرق البارد، شحوب الجلد وبرودته، الدوخة، الصداع، هيجان القلب، غثيان، الإحساس بالجوع الشديد، اضطرابات البصر مؤقتاً، النعاس، الإعياء والتعب بشكل غير اعتيادي، العصبية، الارتعاش، الإحساس بالغث واللبس وصعوبة التركيز.
- يكون المرضى المسنون (65 سنة وما فوق) حساسين أكثر لهبوط سكر الدم الناتج عن الغلبيكلاميد، وهم بذلك أكثر عرضة لخطر هبوط سكر الدم. قد يصعب التعرف على هبوط سكر الدم عند المرضى المسنين، ولذلك يجب تحديد الجرعة البدائية وجرعة الصيانة من غلينكلاميد بعناية شديدة من طرف الطبيب لتجنب أي هبوط في سكر الدم.

إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض :

- تناول أقراص غلوكوز أو مادة حلوة (عسل، حلوى، عصير فاكهة)،
- يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب فوراً لأن الأمر قد يقتضي نقلك إلى المستشفى والبقاء فيه حتى يعود سكر الدم إلى مستوى طبيعي، ثم استريح.

نصائح عامة: أخبر أفراد عائلتك واصفائك وزملائك بأن يغيروا وضعتك على الجنب وأن يطلبوا فوراً مساعدة طبيب إذا غبت عن الوعي. لا يجب أبداً أن يعموك شيئاً للأكل أو الشراب وأنت غائب عن الوعي لأن ذلك قد يخفك.

قد يحدث هبوط سكر الدم :

- إذا لم تأكل ما يكفي أو تخطيت وجبة،
- إذا كانت تغذية لا تحتوي على ما يكفي من السكريات أو غير متوازنة،
- إذا كنت تستهلك الكحول،
- إذا تمرنت أكثر من المعتاد،
- إذا كانت لديك مشاكل كبد أو كلي، أو اضطرابات هرمونية،
- إذا كانت جرعة دوائك عالية،
- إذا كنت مسناً،

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأشدّ حدّ حتّى إذا قرأتها من جديد.
- توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
- هذا الدواء موصوف لك شخصياً ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- 1- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- 2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- 3- كيف يتّخذ هذا الدواء ؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- 5- كيف يحتفظ بدواء غلوكوفانس ؟
- 6- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

يتكون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوربيدات الميتورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغلبيكلاميد).

الأنسولين هرمون تساعد خلايا الجسم على استقلاب الجلوكوز (السكر) من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة أو لتخزينه واستعماله لاحقاً. البنكرياس عند المرضى المصابين بالسكري من النوع 2 (يعني سكري غير مرتبط بالأنسولين) لا يفرز ما يكفي من الأنسولين أو جسمهم لا يستجيب بطريقة صحيحة للأنسولين المفرز. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم. غلوكوفانس يساعد على خفض نسبة سكر الدم واستقراره في نسبة عادية. يُستعمل غلوكوفانس عن طريق الفم (بلعاً) لعلاج السكري من نوع 2 عند المرضى البالغين. ويُستعمل عوض العلاج الذي كان يتناول بموجبه المرضى هاتين المادتين الفعالتين (كلوربيدات الميتورمين والغلبيكلاميد) منفردتين، والذين ثبت لديهم فعالية الجمع بينهما في السيطرة على نسب سكر الدم.

2- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟

لا يجب أبداً استعمال غلوكوفانس في الحالات التالية:
- إذا كان لديك تحمض (فرط تحمض) من كلوربيدات الميتورمين، أو من الغلبيكلاميد، أو غيرها من السلفونيل يوريا من أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، المذكورة في الفقرة 6؛
- إذا كنت تعاني من تقيؤ حاد في وظيفة الكلى؛
- إذا كنت تعاني من اعتلالات كبدية؛
- إذا كنت مصاباً بالسكري من النوع 1 (الاعتماد على الأنسولين)؛
- إذا كان السكري عندك خارج السيطرة، مثلاً فرط نسبة سكر الدم (نسبة جلوكوز عالية بالدم)، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الإسهال، أو فقدان الوزن سريعاً، أو الداء اللاكتوزيدي (انظر فقرة "خطر الداء اللاكتوزيدي" أدناه) أو حمض.
في حالة الحمض، تتركز الأملاح الكيتونية في الدم مما قد يؤدي إلى حالة سلبية لغيبوبة سكري. ومن ضمن أعراضها: آلام المعدة، تنفس سريع وعميق، نعاس، رائحة غير مألوفة بالفم كالفاكهة.
- إذا كان لديك اعتلال خطير (مثل اعتلال المسالك التنفسية أو البولية)
- إذا كنت تعاني من الاجتهاد (بسبب الإسهال المتواصل أو الخطير، أو التقيؤ المتكرر مثلاً)
- إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مشاكل القلب أو إذا تعرضت حديثاً لنزعة صدرية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس
- إذا كنت تعاني من الزفيرية (مرض وراثي نادر ينتج عن نقص في الإنزيمات يجعل الجسم ينتج ويفرز البورفيرين بكمية زائدة، وهي المادة التي تنتج جزء الصباغ الدموي الذي ينقل الأكسجين)
- إذا كنت تتناول دواء ميكونازول (لعلاج بعض الفطريات)، ولو كان يستعمل موضعياً
- إذا كنت تعوز في استهلاك الكحول (سواء يومياً أو من وقت لآخر)،