

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Cadre réservé à l'adhérent (e) *4680*

Matricule : *4680* Société :

Actif Pensionné(e) Autre : *Retraité*

Nom & Prénom : *SKALLI - HOUSSAINI - MOHAMAD*

Date de naissance : *18-07-1930*

Adresse : *4, Rue ORAN (Résidence AIDA) 2^e étage*

Appartement CHAFTIER (CASA)

Tél. : *06-66-12-08-09* Total des frais engagés : *79,70* Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :/...../.....

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *CHAGA* Le : *21/11/2023*

Signature de l'adhérent(e) : *CHAGA*

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
	15/11/23	7970

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Pharmacie NARJIS

SKALLI ZAKIA

FACTURE

Page 1

N° FACTURE : 588919
Date : 15/11/2023

Client :
KALLI MOHAMED

Désignation Produits	Quantité	P.V	Total
ZITHROMAX 500MG B/3 COMP	1	79.70	79.70

Total TTC = 79.70

étée La Présente Facture à La Somme De : SOIXANTE-DIX-NEUF DIRHAMS 70 CTS

établissement

patente 35803244
CNSS 1129908 identifiant fiscal 40900380



ZITHROMAX®

Zithromax 500 mg comprimés pelliculés
Zithromax 500 mg/5 ml poudre pour suspension buvable
Aztreonamycine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre/donner à l'enfant ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourrez la montrer à la pharmacie, au pharmacien ou à votre infirmier.

• Si vous avez des questions, interrogez votre pharmacien, votre pharmacien ou votre infirmier.

• Ce médicament vous est prescrit pour prendre. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir l'rubrique 4.

Cette notice

1. Pourquoi prendre Zithromax et dans quel cas est-il utilisé

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre/donner à l'enfant Zithromax

3. Comment prendre à l'enfant Zithromax

4. Quels sont les effets indésirables

UT.AV. : 10 2024

P.P.V.

79 70

7920

LOT N° : GT0535

09366130/4

Avertissements

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre/donner à l'enfant Zithromax.

• si vous avez ou avez déjà eu des problèmes avec un rythme cardiaque ou présentant un rythme cardiaque

• si vous avez ou avez déjà eu des problèmes hépatiques (voir la rubrique "Autres médicaments et Zithromax") : Dans ces cas, la prudence est indispensable avant de débuter le traitement par Zithromax;

• si vous êtes sous ergotamine ou ses dérivés (voir la rubrique "Autres médicaments et Zithromax") ;

• si vous souffrez de problèmes rénaux graves (insuffisance rénale sévère) ;

• si vous n'avez de troubles de l'thyroïde (maladie de Basedow, goitre) : Zithromax peut entraîner des troubles du rythme cardiaque également dans ces cas (voir rubrique 4 - Effets secondaires possibles).

Par conséquent, ce produit doit être utilisé avec précaution :

- chez les patients présentant des anomalies congénitales du cœur, avec un rythme cardiaque très lent (bradycardie), des troubles du rythme cardiaque (arythmie) ou des problèmes de l'oreillette (tachycardie auriculaire) ;

- chez les patients qui ont déjà pris un médicament pouvant affecter le rythme cardiaque, telle que : quinidine, propofol, dofetidole, amiodarone, sotalol (médicaments pour traiter les troubles du rythme cardiaque), cisipride (médicament contre le reflux du contenu de l'estomac dans l'œsophage), terfenadine (médicament contre les allergies), pimozide (médicament contre les troubles mentaux), citalopram (médicament pour la dépression), moxifloxacine, levofoxacin, et chloramphénicol (antibiotiques) ;

- chez les personnes souffrant de faibles concentrations de potassium et de magnésium dans le sang ;

- chez les personnes âgées et les femmes.

Veuillez informer votre médecin si l'une des conditions suivantes se manifeste ou s'aggrave pendant le traitement par Zithromax (voir également la rubrique 4 "Effets secondaires possibles") :

- des réactions allergiques, y compris des réactions graves nécessitant peut-être d'arrêter l'utilisation et d'entretenir la liaison avec un spécialiste d'allergie, ainsi qu'au besoin de prendre Zithromax et adrénergine : voir à votre médecin ;

- si des symptômes d'un dysfonctionnement du foie apparaissent comme une faiblesse soudaine et associée à une coloration jaune de la peau ou des muqueuses, une urine foncée et une tendance à saigner ou des symptômes cérébraux (par exemple, confusion, altération de l'état de conscience ou crise). Arrêtez immédiatement de prendre Zithromax et consultez votre médecin qui vous recommandera de faire faire une analyse de sang pour vérifier l'état du foie.

- lorsque vous prenez l'antécidéine (il s'agit d'un surdosage de certains de nos médicaments de vie) qui apparaissent au réveil. Ce produit peut provoquer l'étrangement d'une partie de l'estomac. Si vous remarquez l'un de ces symptômes chez votre enfant, consultez immédiatement le médecin qui le soigne ;

- symptômes d'une nouvelle infection ou persistance des symptômes de l'infection en cours. Cette situation pourrait être causée par des bactéries insensibles au Zithromax (bactéries résistantes) ou de micro-organismes autres que les bactéries (infection fongique) ;

- aggravation de la diarrhée, qui peut être légère, mais mortelle dans certains cas (colite fatale). La diarrhée peut survenir par la prise quotidienne des antibiotiques, y compris Zithromax, et est due à l'altération de la flore bactérienne normale, ce qui permet ainsi la prolifération d'une bactérie appelée Clostridium difficile. En cas de diarrhée, votre médecin surveillera attentivement parce que l'infection à Clostridium difficile peut également apparaître deux mois après la fin de la prise de ce produit.

- répétition ou aggravation de la fièvre/fausse muqueuse et fatigabilité accrue, à savoir les symptômes de myasthénia gravis.

Effets indésirables

Zithromax peut être utilisé chez les enfants et les adolescents.

Avant de prendre Zithromax, informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez/avez pris ou pourrez prendre/utiliser tout médicament.

Quand vous prenez l'un des médicaments ci-dessous et que vous vous apprêtez à prendre Zithromax, veuillez en informer le médecin car la prudence s'impose dans certains cas :

- antidiabétiques (médicaments pour l'insuline ou l'Urofloxacin) : évitez de prendre un antidiabétique et Zithromax simultanément ;

- médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque. En cas de prise concomitante de ce médicament et de Zithromax, la dose de digoxine doit être éventuellement surveillée ;

- colchicine (utilisée pour la goutte et la fièvre méditerranéenne/familiale) ;

- zidovudine (médicament contre les infections par le VIH) ;

- ergotamine (médicament contre la migraine). La prise concomitante de ce médicament et de Zithromax est déconseillée car des troubles de la circulation sanguine peuvent survenir, en particulier dans les doigts et les orteils (crise d'ergotisme) ;

- statines (médicaments qui permettent de réduire le taux de graisse dans le sang). La prise concomitante de ce médicament et de Zithromax peut provoquer la rupture des cellules musculaires (rhabdomyolyse) ;

- cikloporsine (un médicament contre le rejet après une transplantation d'organes). En cas de prise concomitante de ce médicament et de Zithromax, la dose de cikloporsine doit être soigneusement surveillée ;

- Zithromax peut entraîner des effets de type contremauvais (par exemple, la warfarine). La prise concomitante de ce médicament et de Zithromax ne doit pas être pris avec d'autres médicaments pouvant affecter le rythme cardiaque (voir la rubrique "Avertissements et précautions d'emploi").

Zithromax avec aliments et boissons

Zithromax peut être pris avec ou sans nourriture. Prenez de préférence ce médicament après avoir mangé.

Grossesse

Conseil : n'y a pas suffisamment d'informations sur la sécurité de Zithromax lorsqu'il est pris pendant la grossesse, si vous prenez ce médicament qu'en cas de stricte nécessité, si vous êtes enceinte.

Allaitement

Zithromax est sécrété dans le lait maternel. En conséquence, si vous allaitez, votre médecin ne vous prescrira ce médicament qu'en cas de stricte nécessité.

Conduire véhicules et utilisation de machines

Conseil : n'est pas disponible concernant l'aptitude de ce médicament au travail à conduire de véhicules ou à utiliser de machines.

Zithromax 500 mg comprimés pelliculés contenant du lactose

Zithromax contient du lactose (sucre du lait). Si votre médecin vous a diagnostiqué une intolérance à certains sucres, consultez votre pharmacien ou demandez à votre pharmacien de prendre ce médicament sans lactose.

Zithromax 200 mg/ml poudre pour suspension buvable contenant du saccharose (5 ml de suspension contenant 3,87 g de saccharose). A prendre en considération chez les patients souffrant de diabète sucré.

3. Comment prendre/donner à l'enfant Zithromax

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez avec votre pharmacien ou demandez à votre pharmacien de prendre ce médicament.

ADULTES ET ADOLESCENTS QUI POSENT 45 KILOGRAMMES OU PLUS

• Pour le traitement des infections des voies respiratoires supérieures et inférieures (sinusite, amygdale, pharyngite, bronchite et pneumonie), des infections de la peau et des tissus mous ainsi que les infections ostéométaboliques :

• Pour le traitement des infections sexuellement transmises, causées par des souches sensibles de Chlamydia trachomatis et d'Haemophilus duvarensi : la posologie recommandée est de 1 000 mg par jour, en une seule prise.

ENFANTS QUI PÉSENT MOINS DE 45 KG

Pour les enfants et les adolescents pesant moins de 45 kg, la dose doit être déterminée en fonction du poids corporel. Les schémas posologiques exacts sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Poids (kg)	Schéma posologique
<15	10 mg/kg par jour pendant 3 jours
15-25	200 mg (5 ml) par jour pendant 3 jours
25-35	300 mg (7,5 ml) par jour pendant 3 jours
35-45	400 mg (10 ml) par jour pendant 3 jours
45-55	500 mg par jour pendant 3 jours (la même dose adulte)

• Pour le traitement de l'ostéomérite aiguë chez les enfants : la posologie recommandée est de 10 mg/kg par jour pendant 3 jours consécutifs ou 30 mg/kg en une seule dose (voir aussi plus loin "Comment prendre la posologie pour enfant")

• Pour le traitement de la pharyngite streptococcique chez les enfants : la posologie recommandée est de 10 mg/kg ou 20 mg/kg, en une seule administration et pendant 3 jours consécutifs mais sans jamais dépasser la dose quotidienne de 500 mg.

La dose quotidienne recommandée pour une thérapie pédiatrique est de 1 500 mg.

Patients particuliers

Si vous êtes âgé et que vous souffrez d'une insuffisance hépatique ou rénale légère ou modérée, le médecin pourra vous prescrire les mêmes posologies indiquées ci-dessous.

Conseil : n'est pas recommandé.

Veuillez à toutes les fois prendre ce médicament en entier. Prenez les comprimés avec un verre d'eau en une seule dose quotidienne. Les comprimés peuvent être pris soit à jeun soit après les repas. Ingérez de la nourriture avant de prendre ce médicament pour atténuer les effets négatifs au niveau de l'estomac et de l'intestin causés par ce médicament.

Comment prendre la posologie pour enfant :

1. Dévissez le flacon de plastique et ouvrez le couvercle (correspondant à 9 ml).

2. Remplir l'ouverture plastique de la poudre (correspondant à 40 mg) et refermer le flacon.

3. Verser l'ouverture plastique dans l'aspérositive plastique.

4. Bien agiter jusqu'à ce que toute la poudre passe en suspension.

Après reconstitution, la suspension contient 40 mg d'aztreonamycine par ml (correspondant à 200 mg pour une dose de 5 mg/kg).

Toujours bien agiter la suspension avant utilisation.

Après reconstitution, la suspension doit être administrée à l'aide d'une seringue graduée (capacité de 5 ml) :

1. Dévissez le flacon en plastique et insérez dans le flacon la seringue.

2. Fermez l'ouverture plastique de la poudre (correspondant à 9 ml).

3. Verser la seringue dans l'aspérositive plastique.

4. Administrez la suspension directement dans la bouche de l'enfant avec la seringue.

• Reférez le flacon avec son bouchon. Rincer la seringue graduée.

ATTENTION

Parce que Zithromax peut provoquer des réactions graves chez les enfants, la dose de 30 mg/kg peut être prise en une seule administration. Pour cela, remplir la seringue graduée : maitriser de faire de sorte que la dose soit de 30 mg/kg.

Si vous avez pris/donné à l'enfant plus de Zithromax que vous n'avez dû :

Si vous avez pris/donné à l'enfant une dose excessive de ce médicament, les effets indésirables possibles seront les mêmes que ceux observés à des doses normales. En cas de surdose, consulter immédiatement le médecin.

Si vous avez des doutes sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

4. Effets indésirables possibles

Comme tous les médicaments, Zithromax peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les patients.

Les effets indésirables suivants sont survenus après avoir pris Zithromax :

ARRÊTEZ immédiatement d'utiliser Zithromax si les effets indésirables suivants apparaissent chez vous ou votre enfant :