

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 528

Société : R.A.M. 183784

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENOUHOU D. MOHAMED

Date de naissance : 29/01/42

Adresse : 3, Rue Saïd ZBIR ZOUNAM, 3ème, Apt n° 5
ESCA B. 12. Palmera Casablanca

Tél : 0522250700
CRM : 0666880621

Total des frais engagés : 2541,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

25/11/2022

Date de consultation :

BENOUHOU D.

Age :

Lien de parenté :

Qui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Bronchitis pneumonie

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 25/11/2022

Le : 25/11/2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
17/11/2023	Ca S	200.50	200.50	Docteur IMA Centr. Soins et Médecin Médecin Agrée pour les Visites et Visites de suivi Casablanca - Tel: 05 22 22 22 22
17/11/2023	Ca			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	17/11/23	341.83

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Centre de Radiologie El Oufra 24, Chem. Béchir, Rue 50 N°2 Casablanca - 20220 05 22 93 04 93	17/11/23	Angio Scan thoracique	200.00 041142357

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
				

DEBUT D'EXECUTION	MONTANTS DES SOINS
-------------------	--------------------

FIN D'EXECUTION	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
-----------------	-------------------------

DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE	MONTANTS DES SOINS
---	--------------------

H 25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000
35533411 11433553
B

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU DEVIS	DATE DE L'EXECUTION
---------------	---------------------

DATE DE L'EXECUTION	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION
---------------------	---

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CENTRE DE RADIOLOGIE EL OULFA

Docteur Fatiha LASRI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II.

Ex médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam.

Docteur Bouchaib ELMDARI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II

Ex médecin attaché au CHU Ibn Rochd

Casablanca, le 15/11/2023

FACTURE N°11634/2023

NOM & PRENOM: BENOUEHOUD MOHAMED

EXAMEN	MONTANT
ANGIO-SCANNER THORACIQUE	2000 DH
TOTAL	2000 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :DEUX MILLE DH TTC

Centre de Radiologie El Oulfa
Bd. Oued Oum Rabii - Rue 50 N°2
Casablanca - 20220
Tel : 05 22 93 04 93

Docteur LASRI Fatiha
Radiologue
Ibn Rochd

Bd. Oued Oum Rabii – Rue 50, N°2- Oulfa – 20220 Casablanca
Tél. : 0522 93 04 93 / 05 22 93 05 93 / 05 22 93 32 99 – Fax 0522 93 563 Capital: 100 000, 00
Dhs - RC: SCP – TP: 37989156 – IF: 4049398 – ICE: 001581917000057
E-mail: radiologie-oulfa@.com



Docteur Fatiha LASRI

Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité - Nancy II
- Ex Médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam

- Scanner Spirale Corps Entier
- Dentascanner - Panoramique Dentaire
- Echographie Générale

Dr Bouchaïb EL MDARI

Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité - Nancy II
- Ex-Médecin attaché au CHU Ibn Rochd

- Echographie-Doppler Couleur
- Echographie Ostéo Articulaire
- Radiologie Numérisée

- Ostéodensitométrie
- Mammographie Numérisée
- Radiographie Rachis Entier
- Radio - Photo

Casablanca , le 15/11/2023

PATIENT

: BENOUEHOUD MOHAMED

MEDECIN TRAITANT

: DR. BENOUEHOUD Imane

EXAMEN(S) REALISE(S)

: ANGIO-SCANNER THORACIQUE

Technique :

TDM thoracique en haute résolution sans injection de produit de contraste.

Résultat :

- Le tronc de l'artère pulmonaire, les artères pulmonaires droite et gauche, ainsi que leurs branches de division lobaires, segmentaires et sous-segmentaires sont de calibre normal, normo-opacifiées sans lacune endoluminale notable.
- Foyer de condensation parenchymateuse postérobasale bilatérale légèrement plus marquée à droite.
- Absence de lésion en verre dépoli.
- Absence d'adénopathie médiastinale et inter bronchique.
- Absence d'épanchement pleuro péri-cardique.
- Absence de lyse ou de condensation osseuse

Conclusion :

- Aspect de petits foyers de pneumopathies postéro-basales bilatérales d'allure inhalatoire.
- Absence de signe d'embolie pulmonaire.

Confraternellement

DR. LASRI FATHIA

I.S*

Centre de Radiologie El Oulfa
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2
Casablanca - 20220
Tél : 05 22 93 04 93

Docteur LASRI FATHIA
Médecin Radiologue

Doctor Imane Benouhoud

Diplômée de la faculté
de Médecine de Casablanca
Médecine Générale

Nutritioniste

Médecin agréé par le Ministère de la santé
Visite Médicale pour permis de conduire



الدكتورة إيمان بنوحو

خريجة كلية الطب

الدار البيضاء

الطب العام

اختصاصية في الحمية والتغذية

طبيبة معتمدة من طرف وزارة الصحة

الفحص الطبي لرخصة القيادة

Casablanca, le : 25/11/2023

Mr BENOUHOU D
MOHAMED

Amjad Scone

Thierry Cugue

Centre de Radiologie El Oulfa
22 Oum Bab El Ouarda 20220
Casablanca 20220
Tel: 05 22 93 04 93



إقامة الرضا، 6، رقم 4، العمارة 35، (قرب الحاج فاتح) الألفة - الدار البيضاء.

الهاتف : 05 22 93 15 79

Résidence Arreda, GH 6, N° 4 A 35 (prés de Haj Fateh) Hay El Oulfa Casablanca.

INPE : 0091164749 / ICE : 001892910000051

Docteur Imane Benouhoud

الدكتورة إيمان بنو حوط

Diplômée de la faculté
de Médecine de Casablanca
Médecine Générale

Nutritioniste

**Médecin agréé par le Ministère de la santé
Visite Médicale pour permis de conduire**



خريجة كلية الطب
الدار البيضاء
الطب العام

الخصائص في الحمية والتغذية طبية معتمدة من طرف وزارة الصحة الفرص الطبيعية لرخصة السيارة

Casablanca, le : 15/11/2023

MR BENNOTHAN ▷

МОНАПЕД

1) Olike 200 SV
Mys 1cp + 2 fl R C
log

2) Cepo 05/08/17 17:00 CP + 2FI
3418.0 Log →

الدار البيضاء - الألفة (قرب الحاج فاتح) .35 .العمارنة رقم 4 . GH الرضا .اقامات

الهاتف : 05 22 93 15 79

Résidence Arreda, GH 6, N° 4 A 35 (prés de Haj Fateh) Hay El Oulfa Casablanca.

INPE : 0091164749 / ICE : 001892910000051

Ciproxine 250 mg, comprimé pelliculé
Ciproxine 500 mg, comprimé pelliculé

Ciprofloxacine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en lire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourraient leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cet application aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. QUEL EST-CE QUE CIPROXINE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CIPROXINE
comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE CIPROXINE, comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CIPROXINE, comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE CIPROXINE, comprimé pelliculé ET DANS QUELLES INDICATIONS EST-ELLE UTILISÉE ?

CIPIROXINE contient une substance active, la ciprofloxaciné. La ciprofloxaciné est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte

CIPROFLEX® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- infections des voies respiratoires
- infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus
- infections urinaires
- infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme
- infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales
- infections de la peau et des tissus mous
- infections des os et des articulations
- prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*
- exposition à la maladie du charbon

CIPROXINE peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de CIPROXINE.

Chez l'enfant et l'adolescent

CIPROXINE® est utilisée chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :
- infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose
- infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite)
exposition à la maladie du charbon.

CIPROXINE peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

PROXINE, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais CIPROXINE, comprimé pelliculé.

- si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionné en rubrique 6 : informations supplémentaires);
 - si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2: Autres médicaments et CYPROVIGNE comprimé pelliculé).

Mises en garde et précautions

Avant de prendre ce médicament

vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant CIPROXINE, comprimé pelliculé si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'un fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin.

par CIPROXINE. Dès les premiers symptômes (par exemple au niveau de l'épaule), arrêtez de prendre CIPROXINE, au repos. Évitez tout effort important sur le tendon.

- ... antibiotiques de
négatation de votre tau
glycémie), ou une diminution de votre taux de sucre dans le sang en dessous
à valeur normale, pouvant entraîner une perte de conscience (comme
cérébral) dans les cas graves (voir rubrique 4. Quels sont les effets indésirables
? 7). Ceci est important à prendre en compte pour les patients diabétiques. Si
diabétique, votre taux de sucre dans le sang doit être étroitement surveillé
diarrhée peut se produire lors de la prise d'antibiotiques, y compris avec
XINE, même plusieurs semaines après la fin du traitement. Si la diarrhée devient
ou persiste, ou si vous remarquez la présence de sang ou de mucus dans vos
débarbez immédiatement de prendre CIPROXINE, car votre vie pourrait être mise
en danger. Ne prenez pas de médicaments destinés à bloquer ou ralentir le trans-
tive, et contactez votre médecin.

Si vous vous dégradez ou si vous ressentez un quelconque effet au niveau de l'œil, consultez immédiatement un ophtalmologiste.

Le peau devient plus sensible au soleil et aux rayons ultraviolets (UV) lorsque vous prenez CIPROXINE. Évitez toute exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV ou sous les lampes de bronzage. Si vous avez des questions, consultez votre médecin ou le laboratoire d'analyses que vous prenez CIPROXINE.

- Si vous prenez CIPROXINE, il est important que vous prenez CIPROXINE si vous
avez des problèmes rénaux, présentez votre médecin car la dose de
CIPROXINE devra éventuellement être adaptée.
CIPROXINE peut provoquer des troubles hépatiques. Si vous remarquez le moindre
signe de type perte d'appétit, ictere (jaunisse), urines foncées, démangeaisons, douleurs
dans l'estomac ou la palpation, arrêtez de prendre CIPROXINE et contactez
immédiatement votre médecin.
Pour diminuer le taux de vos globules blancs dans la
sang, arrêtez de prendre CIPROXINE et contactez
votre médecin.

otre médecin ou pharmacien si vous avez des questions.

Si vous ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou prendre tout autre médicament.

Les effets indésirables tels qu'une baisse de la tension artérielle et des **l'air rubrique 2 - Ne prenez jamais CIPROXINE comprimé pelliculé,**

ment suivants sont connus pour interagir avec CIPROXINE. Prendre en même temps que ces médicaments pourrait avoir une incidence sur les théutiques de ces produits, et augmenter la probabilité de survenue des

OFIKEN®

Céfixime

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

DENOMINATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....

200 mg

Excipients.....

q.s.p un comprimé pelliculé.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....

100 mg

Excipients.....

q.s.p 5 ml de suspension reconstituée.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimé pelliculé, boîtes de 8 et 16.

OFIKEN® 100 mg/5 ml :

Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml soit 150 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml soit 300 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml soit 500 doses/kg

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de 3^{ème} génération.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Comprimé pelliculé :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des :

- Otites et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

Poudre pour suspension buvable :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois, dans le traitement des :

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.

ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :

• Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, ou à l'un des excipients de ces médicaments.

Comprimé pelliculé :

- Enfant de moins de 12 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Mises en garde spéciales :

Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin. En effet, la survenue d'une réaction allergique impose l'arrêt du traitement. Il existe une possibilité d'allergie (5 à 10% des cas) chez les sujets allergiques aux pénicillines ou autres bêta-lactamines. Signaler à votre médecin toute allergie ou manifestations allergiques survenues lors de traitement par les antibiotiques du groupe des pénicillines.

En cas de diarrhée survenant au cours du traitement, prenez rapidement avis auprès de votre médecin. Ne prenez pas de traitement antidiarrhéique sans prescription médicale.

Si vous avez déjà eu une anémie hémolytique après la prise d'un antibiotique de la famille des céphalosporines y compris OFIKEN (diminution des globules rouges, ce qui peut entraîner une pâleur, une faiblesse ou un essoufflement), vous devez prévenir votre médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous avez une réaction cutané sévère de type éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps et vous mettre en danger (Syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson) ou un syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS), arrêtez immédiatement ce médicament.

231089
01 03 25
EXP 170.00 DH
PPV