

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0032287

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6425 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☒ Autre : 183932
 Nom & Prénom : HEMMI Abdelmjid
 Date de naissance : 14-08-62
 Adresse : 107 RUE 15 RIAD EL ALI - CASA
 Tél. : 0668574756 Total des frais engagés : #2806,90# Dhs

Cadre réservé au Médecin : Ahmed LAKLALECH

Cachet du médecin :

Médecine Générale
 Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis
 Hay Mohammadi-Casablanca
 Tél: 05 22 62 81 38

Date de consultation : 02/10/2023

Nom et prénom du malade : ACHTOUK FATIMA Age : 62

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète + Rho

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 02/10/2023

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-4-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/10/2023		6	15900	Ahmed LAKLAL Médecine Générale Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis Hay Mohammadi-Casablanca Tél: 05 22 62 81 38

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

Date

02/10/23

Ahmed LAKLAL
Médecine Générale
Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis
Hay Mohammadi-Casablanca
Tél: 05 22 62 81 38

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du
Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des
Coefficients

Montant
des Honoraires

05/10/23

B 840
9 PC

1000 DH

05/10/23
23

TDM
6430
SACAD

13000

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du
Praticien

Date des
Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé
des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient



COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE

H		G	
25533412	21433552		
00000000	00000000		
D		B	
00000000	00000000		
35533411	11433553		

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Ahmed LAKLALECH

Médecine Générale

Ancien Médecin des Hôpitaux Publics

Hay Lamia, Bloc 6 N° 2 Bis

Hay Mohammadi, Ain Sebâa

Casablanca

Tél. : 0522 62 81 38

PHARMACIE MALIKA
Dr LEBBAR MALIKA
579, Boulevard Moudibouketa
Casablanca
Tél : 05 22 80 75 59

الدكتور أحمد لقلالاش
الطب العام

طبيب سابق بالمستشفيات العمومية

حي لمياء - بلوك 6 - رقم 2 مكرر
الحي المحمدي - عين السبع - الدار البيضاء
الهاتف: 0522 62 81 38

Casablanca, le 02/10/2023 في الدار البيضاء،

9. ACHTOUK FATIMA

7500

1/

MERPAL 15mg q

1/11, le soir 12

2/

1320

ALGIR q

1/11 3at

3/

9082

VITAMINIC 1mg (2h)

4/

8210

2h 2a

5/

12610

EUROL 2mg 1x1

1/11 le soir

6/

12610

SINTRA plus 10mg (2h)

1 AB, le matin

PHARMACIE MALIKA
Dr LEBBAR MALIKA
579, Boulevard Moudibouketa -
Casablanca
Tél : 05 22 80 75 59

05 22 80 75 59

SP

Docteur Ahmed LAKLALECH
Médecine Générale
Hay Lamia, Bloc 6 - N°2 bis
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél : 05 22 62 81 38

érence avant fin :

143.80 DM

Lot: 116705

Per: 02-2025

20201812529DMP/20UCA/MaV

toire

SNAPHARM

un - Maârif extension-Casablanca -Maroc



6 111255 870158

GINSA PLUS®

5 flacons monodoses 25ml

BILAN BIOLOGIQUE

Calend

Nom / Prénom:

Achrouk Fatma

Date:

02/10/2023

Hématologie

- ☒ NFS - Plaquettes
- ☐ Réticulocyte
- ☐ Frottis Sanguin
- ☐ VS
- ☐ CRP

Glucose

- ☒ Glycémie à jeun
- ☐ GPP
- ☒ HBA_{1c}

Néphrologie

- ☐ Urée
- ☒ Créatinine
- ☐ Clairance de Créatinine
- ☒ Acide Urrique

Ionogramme Sanguin

- ☐ Na⁺
- ☐ K⁺
- ☐ Cl⁻
- ☐ Ca⁺⁺
- ☐ Phosphore
- ☐ Mg⁺⁺

Bilan Lipidique

- ☒ Cholestérol Total
- ☒ Cholestérol HDL
- ☒ Cholestérol LDL
- ☒ Triglycérides

Bilan Hépatique

- ☐ Phosphatases Alcalines
- ☒ Transaminases, ASAT, ALAT
- ☐ Gamma-GT
- ☐ Triglycérides

Bilan Hémostase

- ☐ Temps de Prothrombine
- ☐ TCK
- ☐ Fibrinogène
- ☐ INR

Bilan Martial

- ☐ Fer Sérique
- ☐ CTF
- ☒ Ferritine
- ☐ Transferrine

Bilan Hormonal

- ☐ TSH
- ☐ T4L
- ☐ T3L
- ☐ AC ANTI TPO
- ☐ AC ANTI TG
- ☐ AC ANTI R TSH
- ☐ Cortisolémie de 8h
- ☐ FSH-LH
- ☐ OEstrogènes
- ☐ Testostérone
- ☐ Prolactine

Bilan Prostatique

- ☐ P.S.A Totale
- ☐ P.S.A Libre

Bilan Cardiaque

- ☐ CPK (créatinine Phosphokinase)
- ☐ Troponine

Bilan Phosphocalcique

- ☐ Dosage Vitamine D
- ☐ Calcémie
- ☐ Calciurie
- ☐ Phosphorémie

Groupe Sanguin

- ☐ ABO
- ☐ Rhésus
- ☐ RAI

Bilan Gestationnel

- ☐ TPHA-VDRL
- ☐ Sérologie Rubéole
- ☐ Sérologie Toxoplasmose

Ionogramme Urinaire

- ☐ Ca⁺⁺
- ☐ Phosphore
- ☒ Na⁺
- ☐ K⁺
- ☐ Cl⁻
- ☐ Urée
- ☐ Créatinine

Examen des Urines

- ☐ ECBU
- ☐ AntibioGramme
- ☐ Protéinurie des 24h
- ☐ Microalbuminurie des 24h

Cachet du Médecin

Dr. J.L. KHALLOU
Médecin Généraliste
N°2 bis
Tél: 05 22 62 81 28



Laboratoire Chahdia d'Analyses Médicales

مختبر الشهدية للتحليلات الطبية

Dr J.L. KHALLOUK / Médecin Biologiste

الدكتورة جيهان لمياء خلوق

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca, Ex Médecin Interne CHU Ibn Rochd - Casablanca

Dr J.L. KHALLOUK/ Médecin Biologiste

349, Bd Oued Daoura Lot CHAHEDIA Oulfa CASABLANCA- TEL 0522933344, Mail: labochahdia@gmail.com
INPE: 093062149 / ICE: 001718112000062 / IF : 18800233

Casablanca le 5 octobre 2023

Madame ACHTOUK FATIMA

FACTURE N°	12355		
Analyses :			
Numération formule sanguine -----	B	80	Total : B 840
Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
Hémoglobine glycosylée -----	B	100	
Urée -----	B	30	
Créatinine -----	B	30	
Acide urique -----	B	30	
Cholestérol total -----	B	30	
Cholestérol HDL -----	B	50	
Cholestérol LDL -----	B	50	
Triglycérides -----	B	60	
Transaminases OT -----	B	50	
Transaminases PT -----	B	50	
Ferritine -----	B	250	
Prélèvements :			
Sang-----	Pc	1,5	
TOTAL DOSSIER		1 000,00 DH	

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Dirhams

Laboratoire CHAHEDIA
ANALYSES MÉDICALES
Dr J.L. KHALLOUK
Médecin Biologiste
349, Bd Oued Daoura 1^{er} Etage Lot Chahdia
Casablanca - Tél: 05 22 93 33 44



07 66 41 93 94
05 22 93 33 44



labochahdia@gmail.com



349, Bd Oued Daoura – Lot Chahdia 1^{er} Etage Oulfa – Casablanca
شارع واد الدورة تجزئة الشهدية - الطابق الأول - الألفة-الدار البيضاء

INPE : 093062149 - ICE : 001718112000062 - IF : 18800233

CENTRE DE RADIOLOGIE EL OULFA

Docteur Fatiha LASRI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spécialisé-Nancy II.

Ex médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam.

Docteur Bouchaib ELMDARI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spécialisé-Nancy II

Ex médecin attaché au CHU Ibn Rochd

Casablanca, le 04/10/2023

FACTURE N°09880/2023

NOM & PRENOM: ACHTOUK FATIMA

EXAMEN	MONTANT
TDM LOMBO-SACRE	1300 DH
TOTAL	1300 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :MILLE TROIS CENTS DH TTC

Centre de Radiologie El Oulfa
Bd. Oued Oum Rabii - Rue 50, N°2 - Oulfa - 20220 Casablanca
Tél : 0522 93 04 93 / 05 22 93 05 93 / 05 22 93 32 99 - Fax 0522 93 563
Dhs - RC: SCP - TP: 37989156 - IF: 4049398 - ICE: 001581917000057
E-mail: radiologie-oulfa@.com

Dr Bouchaib EL MDARI
Médecin Radiologue
Centre de Radiologie El Oulfa

Bd. Oued Oum Rabii – Rue 50, N°2- Oulfa – 20220 Casablanca
Tél. : 0522 93 04 93 / 05 22 93 05 93 / 05 22 93 32 99 – Fax 0522 93 563
Capital: 100 000, 00
Dhs - RC: SCP – TP: 37989156 – IF: 4049398 – ICE: 001581917000057
E-mail: radiologie-oulfa@.com

ORDONNANCE

Ahmed LAKLALECH
Médecine Générale
Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis
Mohammadi-Casablanca
Tél: 05 22 62 81 38

Am. Le: 02/10/2023

7-AHDOUK PATRICK

De susp. d'une hernie discol.
L4 L5 et L5-S1

11

11

T. DM Lombaire

Centre de Radiologie El Oulfa
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2
Casablanca - 20220
Tél: 05 22 62 04 93

Ahmed LAKLALECH
Médecine Générale
Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis
Hay Mohammadi-Casablanca
Tél: 05 22 62 81 38

MEFSAL® 7,5 mg, comprimé - B/10 & B/20
MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable - B/10 & B/20
(Méloxicam)

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, d'information à votre médecin ou à

Ce médicament vous a été personnellement prescrit par un médecin. Quelqu'un d'autre, même en cas de sinistère, ne doit pas l'utiliser.

Si l'un des effets indésirables décrits ci-dessous vous paraît indésirable non mentionné dans cette notice, consultez votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Substance active :

- MEFSAL® 7,5 mg, comprimé :

Méloxicam

Pour 1 comprimé

- MEFSAL® 15 mg, comprimé sécable :

Méloxicam

Pour 1 comprimé

Excipients : Amidon préagglutiné (1500), Lactose, Citrate de sodium, Cellulose microcristalline (Avicel), Stéarate de magnésium, q.s.p. 1 comprimé.

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté.

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Anti-inflammatoire non stéroïdien, Oxycam - codé MEFSAL® contient une substance active dénommée méloxicam appartenant à un groupe de médicaments non stéroïdiens (AINS), qui sont utilisés pour réduire les douleurs et les inflammations des articulations et les muscles.

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

MEFSAL® est utilisé dans :

- Le traitement de courte durée des douleurs arthrosiques.
- Le traitement de longue durée :
- De la polyarthrite rhumatoïde,
- De la spondylarthrite ankylosante (également).

4. POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

La dose recommandée est de :

- Poussées aiguës d'arthrose

7,5 mg (un comprimé à 7,5mg ou un demi-comprimé à 15mg) une fois par jour. Elle peut être augmentée jusqu'à 15 mg (deux comprimés à 7,5mg ou 1 comprimé à 15mg) une fois par jour.

- Polyarthrite rhumatoïde et Spondylarthrite ankylosante

15 mg (deux comprimés à 7,5mg ou un comprimé à 15mg) une fois par jour. Elle peut être réduite à 7,5 mg (un comprimé à 7,5mg ou un demi-comprimé à 15mg) une fois par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec de l'eau, ou un autre liquide, au cours d'un repas.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais MEFSAL® dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au Méloxicam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- Au cours des trois derniers mois de la grossesse,
- Enfant et adolescents de moins de 16 ans,
- Si vous êtes allergique à l'aspirine ou à d'autres médicaments anti-inflammatoires (AINS),
- Si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris de l'aspirine ou d'autres AINS :
 - Respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme),
 - Obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux),
 - Eruptions cutanées / urticaire,
 - Gonflement soudain des tissus sous la peau ou les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke),
- Si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :
 - Un saignement de l'estomac ou des intestins,
 - Des perforations de l'estomac ou des intestins,
 - Ulcères ou saignement de l'estomac ou des intestins,
 - Antécédents d'ulcères ou de saignements récidivants peptiques ou de l'estomac (ulcération ou saignement s'étant produit au moins deux fois),
 - Insuffisance hépatique sévère,
 - Insuffisance rénale sévère non dialysée,
 - Saignements récents dans le cerveau (hémorragie cérébrovasculaire),
 - Troubles hémorragiques de quelque type que ce soit,
 - Insuffisance cardiaque sévère,
 - Intolérance à certains sucres étant donné que ce produit contient du lactose (voir rubriques « Composition » et « Mise en garde spéciales et précautions particulières

d'emploi »).
Si vous n'êtes pas certain de ne pas être allergique, consultez votre médecin.

6. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, MEFSAL® peut provoquer certains effets indésirables, mais ils ne sont pas toujours graves.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants, consultez votre médecin.

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

• Maux de tête, vertiges, étourdissements, fatigue, troubles du sommeil.

• Nausées, vomissements, diarrhées, constipation, flatulences, sensation de malaise.

• Douleurs abdominales, selles de coloration noire.

• Vomissements de sang, inflammation de la muqueuse.

• Aggravation des symptômes de la maladie de Moins fréquemment, une

Effets indésirables du

- Très fréquents : touchés par plus de 10 personnes sur 100.

• Sensation de malaise, constipation, flatulences.

- Fréquents : touchés par plus de 10 personnes sur 100.

• Céphalées.

- Peu fréquents : touchés par moins de 10 personnes sur 100.

• Etourdissements, vertiges,

• Somnolence,

• Anémie (réduction de la

• Augmentation de la

• Bouffées de chaleur (ry

• Rétention hydro-sodée,

• Augmentation du taux

symptômes suivants :

• Troubles du rythme car

• Palpitations (perception

• Faiblesse des muscles.

MEFSAL® 15 mg
20 comprimés sécables



VITANEVRIL FORT 100 mg,

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI): Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée.....
Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antistatique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyneuropathies.
- proposé dans d'autres polyneuropathies supposées d'origine toxico-alimentaire.
- utilisée, à la dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

Mode et voies d'administration ;
Voie orale.

Durée du traitement ;
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Fréquence d'administration ;
2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

NHESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPOISONNEMENT

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS

Saccharose

Parlons

EN

VO

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VITANEVRIL® FORT 100 mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 180593

14. MENTION, SI NECESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc
- Sans objet
- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc
- SYNTHEMEDIC
- 20-22, Rue Zoubeyr Ibnou Al Aouam
- Roches Noires
- 20300 Casablanca
- Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est la : 03/2015

• après le premier trimestre : cet analgésique non anti-inflammatoire ne paraît pas faire courir de risque fœtal lors de prises au cours des 2^e et 3^e trimestres.

En conséquence, le paracétamol (dans les conditions normales d'emploi) peut être prescrit pendant la grossesse.

• **Allaitement** : A dose thérapeutique, l'administration de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

POSOLOGIE

Enfants :

• 7 à 11 ans : 1/2 comprimé, 1 à 3 fois par jour.

• 12 à 15 ans : 1 comprimé, 1 à 3 fois par jour.

Ne pas dépasser la dose maximale de 50 mg/kg/jour.

Adultes :

1 à 2 comprimés, 1 à 3 fois par jour

Les prises peuvent être espacées de 4 heures au minimum.

Ne pas dépasser 6 comprimés par jour, soit 3 g de paracétamol par jour.

Eviter l'administration prolongée.

En cas d'insuffisance rénale sévère, l'intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Administration par voie orale

Avaler les comprimés avec de l'eau.

DUREE DU TRAITEMENT

La durée du traitement sera aussi brève que possible (maximum 10 jours) et n'excédera pas la période symptomatique.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Lié au paracétamol :

Symptômes : nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales, apparaissent généralement dans les 24 premières heures.

Un surdosage massif (supérieur à 10 g de paracétamol, 150 mg/kg de poids corporel chez l'enfant) peut provoquer une cytolysé hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose complète et irréversible, se traduisant par des anomalies du métabolisme glucidique, une acidose métabolique, une encéphalopathie pouvant aller jusqu'au coma et à la mort. Simultanément, on observe une augmentation des transaminases hépatiques, de la lactico-déshydrogénase, de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine pouvant apparaître 12 à 48 heures après l'ingestion.

Conduite d'urgence :

- transfert immédiat en milieu hospitalier,

- évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique,

- avant de commencer le traitement, prélever un tube de sang pour faire le dosage plasmatique du paracétamol,

- le traitement du surdosage comprend l'administration aussi précoce que possible de l'antidote N-acétylcystéine par voie IV ou voie orale, si possible avant la dixième heure.

EFFETS INDESIRABLES

Paracétamol : Les réactions exceptionnelles d'allergies au paracétamol se manifestant par de simples rashes cutanés avec érythème ou urticaire commandent le simple arrêt du traitement.

Exceptionnellement, thrombopénie

Caféine : possibilité d'excitation, d'insomnies et de palpitations.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Novembre 2018



Zone Industrielle, Ouest Aïn Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Aïn Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc

ALGIK®

Paracétamol + Caféine Comprimés

COMPOSITION

- Paracétamol (DCI)
- Caféine

par comprimé
500 mg
50 mg

par étui
8,0 g
0,8 g

Excipients

FORME ET Comprimé

CLASSE P

- Paracétamol
- Caféine :

NOM ET AD

Laboratoire

Zone Industri

Route Régional

Km 12.400 -

INDICATION

Traitement

- affections
- postopérati
- états fébr

CONTRE

Ce médic

- Hypertensi
- Insuffisanc

En cas de

MISES EN C

L'attention des

une réaction positiv

Cependant, la dose de caféine reconnue comme dopante de 12 µg/ml d'urine, ne peut être atteinte par la prise

d'ALGIK 500 mg aux posologies recommandées.

Seule, l'absorption simultanée de médicaments ou de boissons (café, thé, en quantités relativement importantes)

contenant également de la caféine, pourrait induire un test positif.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :

- Insuffisance hépatique légère, d'alcoolisme chronique.
- Administration concomitante de médicaments hépatotoxiques.
- Atteinte rénale sévère (risques d'effets secondaires rénaux lors de l'usage chronique de doses élevées).

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Lié au paracétamol

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode de l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose-oxydase-peroxydase.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

• Grossesse :

Chez l'animal : Il n'existe pas d'étude de tératogénèse.

- Chez la femme :

- premier trimestre : une étude épidémiologique prospective, portant sur quelques centaines de femmes n'a pas mis en évidence d'effet tératogène.

ALGIK® 500 mg + 50 mg

16 comprimés



6 118000 070016

08/13

08/13

rs dentaires, névralgies, douleurs musculaires, douleurs

ivants :

avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

spécialité contient un principe actif (Caféine) pouvant induire



Laboratoire Chahdia d'Analyses Médicales

مختبر الشهدية للتحليلات الطبية

Dr J.L.KHALLOUK / Médecin Biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca, Ex Médecin Interne au CHU Ibn Rochd - Casablanca

Dossier ouvert le : 05/10/23

Prélèvement effectué à 08:29

Edition du : 05/10/23

Madame ACHTOUK FATIMA

Date de naissance : 1961

Réf. : 23J174

Page : 1/3

Compte Rendu d'Analyses

HEMATOLOGIE

(Sysmex)

NUMERATION FORMULE SANGUINE

GLOBULES ROUGES

Hématies -----	4,35	M/mm ³	4,2 - 5,2
Hémoglobine -----	12,7	g/100 ml	12 - 16
Hématocrite -----	38	%	35 - 45
- V.G.M. -----	85	μ ³	85 - 95
- T.C.M.H. -----	28	pg	28 - 32
- C.C.M.H. -----	33	g/100 ml	30 - 35

GLOBULES BLANCS

Numération des leucocytes -----	10 700	* /mm ³	4000 - 10000
---------------------------------	--------	--------------------	--------------

Formule leucocytaire

Polynucléaires Neutrophiles -----	56,4	%	50 - 70
Soit :	6 035	/mm ³	2000 - 7500
Polynucléaires Eosinophiles -----	3,0	%	1 - 3
Soit :	321	/mm ³	40 - 300
Polynucléaires Basophiles -----	0,0	%	< 1
Soit :	0	/mm ³	< 100
Lymphocytes -----	38,3	%	20 - 40
Soit :	4 098	/mm ³	1500 - 4000
Monocytes -----	2,3	%	1 - 8
Soit :	246	/mm ³	40 - 800

PLAQUETTES

Résultat -----	400 000	/mm ³	150000 - 400000
----------------	---------	------------------	-----------------

LABORATOIRE CHAHDIA
D'ANALYSES MÉDICALES
Dr. J.L. KHALLOUK
Médecin Biologiste
349, Bd. Oued Daoura, 1er Etage, Lot. Chahdia
Oulfa - Casablanca - Tél. 05 22 93 33 44



Laboratoire Chahdia d'Analyses Médicales

مختبر الشهدية للتحليلات الطبية

Dr J.L.KHALLOUK / Médecin Biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca, Ex Médecin Interne au CHU Ibn Rochd - Casablanca

Dossier ouvert le : 05/10/23

Prélèvement effectué à 08:29

Edition du : 05/10/23

Madame ACHTOUK FATIMA

Date de naissance : 1961

Réf. : 23J174

Page : 2/3

Compte Rendu d'Analyses

BIOCHIMIE

(Roche Integra 400+)

			Normales
Glycémie à jeun -----:	0,99	g/l	0,7 - 1,1
Soit :	5,5	mmol/l	3,88 - 6,11
(Hexokinase G6PD-H- Roche Diagnostics Cobas)			
Hémoglobine glycosylée par HPLC -----:	6,0	%	4 - 6
(Tosoh Biosciences GX-HPLC)			
Urée -----:	0,27	g/l	< 0,5
Soit :	4,5	mmol/l	< 8,34
(Dosage enzymatique- Roche Diagnostics Cobas)			
Créatinine sanguine -----:	8,8	mg/l	4 - 13
(Dosage cinétique- Roche Diagnostics Cobas)			
Acide urique -----:	52,4	mg/l	20 - 65
Soit :	312	μmol/l	119 - 387
(Dosage enzymatique- Roche Diagnostics Cobas)			
Cholestérol Total -----:	2,19	g/l	1,4 - 2,6
Soit :	5,64	mmol/l	3,61 - 6,7
(Dosage enzymatique - Roche diagnostics Cobas)			
Cholestérol HDL -----:	0,53	g/l	0,4 - 0,7
Soit :	1,37	mmol/l	1,03 - 1,8
(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)			
Cholestérol LDL -----:	1,35	g/l	< 1,7
Soit :	3,48	mmol/l	< 4,38
(Dosage enzymatique- Roche Diagnostics Cobas)			
Triglycérides -----:	1,53	g/l	0,4 - 1,6
Soit :	1,75	mmol/l	0,46 - 1,83
(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)			



Laboratoire Chahdia d'Analyses Médicales مختبر الشهدية لتحليلات الطبية

Dr J.L.KHALLOUK / Médecin Biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca, Ex Médecin Interne au CHU Ibn Rochd - Casablanca

Dossier ouvert le : 05/10/23

Prélèvement effectué à 08:29

Edition du : 05/10/23

Madame ACHTOUK FATIMA

Date de naissance : 1961

Réf. : 23J174

Page : 3/3

Compte Rendu d'Analyses

			Normales
Transaminases - SGOT / ASAT ----- :	14,8	UI/l	< 40
(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)			
Transaminases - SGPT / ALAT ----- :	13,7	UI/l	< 45
(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)			

MARQUEURS

Ferritine ----- : 33,8 ng/ml
(Méthode ELFA - Vidas Biomérieux)

Hommes	:	20 à 350	ng/ml
Femmes cycliques	:	15 à 150	ng/ml
Femmes ménopausées	:	25 à 280	ng/ml
Enfants : A la naissance	:	100 à 300	ng/ml
< à 1 an	:	20 à 100	ng/ml
> à 4 ans	:	Idem adultes	

LABORATOIRE CHAHDIA
D'ANALYSES MÉDICALES
Dr. J.L. KHALLOUK
Médecin Biologiste
349, Bd. Oued Daoura - 1er Etage, Lot. Chahdia
Oulfa - Casablanca - Tél. 05 22 93 33 44

Docteur Fatiha LASRI
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité – Nancy II
- Ex Médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam

Dr Bouchaïb EL MDARI
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité – Nancy II
- Ex-Médecin attaché au CHU Ibn Rochd

- Scanner Spirale Corps Entier
- Dentascanner – Panoramique Dentaire
- Echographie Générale

- Echographie-Doppler Couleur
- Echographie Ostéo Artculaire
- Radiologie Numérisée

- Ostéodensitométrie
- Mammographie Numérisée
- Radiographie Rachis Entier
- Radio - Photo

Casablanca , le 04/10/2023

PATIENT : **ACHTOUK FATIMA**
MEDECIN TRAITANT : **DR. LAKLALECH Ahmed**
EXAMEN(S) REALISE(S) : **TDM LOMBO-SACRE**

TECHNIQUE :

Examen scanographique réalisé en acquisition volumique de 2.5mm reconstruite en 1.25mm sans injection de produit de contraste.

RESULTAT :

- Déminéralisation osseuse modérée.
- Becs ostéophytiques somatiques antérieurs et postérieurs témoignant d'une arthrose modérée.
- Arthrose zygapophysaire débutante.
- Présence d'un bombement discal global d'allure conflictuel au niveau des étages L4-L5 et L5-S1.
- Absence de hernie discale nettement décelable sur cet examen.
- Pincement discal au niveau de l'étage L3-L4 et L5-S1.
- Canal lombaire osseux de dimensions normale secondairement rétrécie par l'hypertrophie ligamentaire .
 - L3 = 16.4mm
 - L4 = 16 mm
 - L5 = 16 mm
- Parties molles péri vertébrales normales.
- Discrète remaniement arthrosiques des articulations sacro iliaques.
- A noter une lithiase rénale du groupe caliciel moyen droit mesurant 6x5 mm avec une densité à 1200 UH.
- Microlithiase du groupe caliciel moyen gauche.

CONCLUSION :

- Déminéralisation osseuse modérée.
- Arthrose somatique modérée et zygapophysaire débutante.
- Bombement discal global au niveau des étages L4-L5 et L5-S1 d'allure conflictuelle.
- Absence de saillie discale focale nettement décelable sur cet examen.
- Discret remaniement arthrosique des articulations sacro iliaques.

Confraternellement

DR. ELMARI BOUCHAIB

I.S**

Dr Bouchaïb EL MDARI
Médecin Radiologue
Centre de Radiologie El Oulfa

Centre de Radiologie El Oulfa
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2
Casablanca - 20220
Tél : 05 22 93 04 93

* ~~RAPPORT~~ D'ANALYSE *

LABO CHAHDIA

2023/10/05 08:52

TOSOH

V01.20

N0: 0008 TB 0001 - 08

ID: HE23J174

CAL(N) = 1.1944X + 0.5321

NOM	%	TEMPS	AIRE
FP	0.0	0.00	0.00
A1A	0.7	0.22	11.07
A1B	1.0	0.33	16.58
F	0.3	0.46	4.98
LA1C+	1.8	0.55	28.27
SA1C	6.0	0.67	73.30
AO	91.5	1.04	1453.04
AIRE TOTALE			1587.24

HbA1c 6.0%

HbA1 7.8 % HbF 0.3 %
0% 15%

