

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M21- 0037747

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3216

Société : RAM

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : ABD LM810 TAYAB

Date de naissance : 09-04-1953

Adresse : Derb Foukara RUE 5 N°104 Casa

Tél : 0661361373

Total des frais engagés : 1259,00

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 13/11/2023

Nom et prénom du malade : TAYAB SAID

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

Age :

☐ Enfant

Nature de la maladie : Asclérose

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/11/23		1	15000	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	13/11/23	459,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	20/11/2023		650,00

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS														
			DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. issam ZATNI

Médecin Biologiste

الدكتور عصام زاتني
طبيب إحيائي

231120043 – M. Said TAYAB

PARASITOLOGIE

EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES(1)

Recueil des selles :

* EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect des selles :

Consistance:

Couleur :

Sang:

Glaire:

Formes Parasitaires :

selles : apportées au labo

Selles pateuses.

Pateuses

Brune

Absence

Absence

Absence

* EXAMEN MICROSCOPIQUE

Hématies:

Leucocytes:

Cellules épithéliales:

Levures:

Filaments mycéliens:

Cristaux de Charcot-Leyden :

Rares

Rares

Quelques

Absence

Absence

Absence

* EXAMEN PARASITOLOGIQUE

Kyste

Oeufs

Parasites

Absence

Absence

Absence

Validé par : Dr. ZATNI ISSAM

L.A.M.A.

LABORATOIRE AZZAITOUNA
D'Analyses Médicales
Dr. Issam ZATNI
Tissir 1 N°92 Bd Hassan II Berrechid
Tél: 06 67 05 14 67



مختبر التحليلات الطبية الزيتونة

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES AZZAITOUNA

*BIOCHIMIE *IMMUNOLOGIE *HEMATOLOGIE *BACTERIOLOGIE *VIROLOGIE *PARASITOLOGIE *MYCOLOGIE *SPERMILOGIE *HORMONOLOGIE

Dr. issam ZATNI
Médecin Biologiste

الدكتور عصام زاتني
طبيب إحيائي

Date du prélèvement : 20-11-2023 à 10:03
Code patient : 230320079
Né(e) le : 25-10-1992 (31 ans)

M. TAYAB Said
Dossier N° : 231120043
Prescripteur : Dr RACHIDI JAMILA



HEMATOCYTOLOGIE

(Sysmex XN 550)

HEMOGRAMME

(Fluorescence en Cytométrie de Flux sur SYSMEX-XN 550)

Lignée érythrocytaire

Hématies :	3.75	10 ⁶ /mm ³	(4.50-5.80)	3.01
Hémoglobine :	7.5	g/dL	(13.5-17.5)	4.5
Hématocrite :	25.0	%	(37.0-49.0)	18.3
VGM :	67		(82-98)	61
TCMH :	20.0	pg	(28.0-32.0)	15.0
CCMH :	30.0	%	(32.0-36.0)	24.6
RDW :	15.4	%	(12.0-16.0)	17.2

Lignée leucocytaire

Leucocytes :	5 500	/mm ³	(4 000-10 000)	4 610
Poly. Neutrophiles :	49.5	% soit 2 723	/mm ³ (1 800-7 500)	2 729
Poly. Eosinophiles :	12.2	% soit 671	/mm ³ (100-400)	290
Poly. Basophiles :	2.0	% soit 110	/mm ³ (<200)	60
Lymphocytes :	30.5	% soit 1 678	/mm ³ (1 000-4 000)	1 189
Monocytes :	5.8	% soit 319	/mm ³ (200-1 000)	341

Plaquettes	474 000	/mm ³	(150 000-400 000)	581 000
------------	---------	------------------	-------------------	---------

VITESSE DE SEDIMENTATION

1ère Heure 45 mm (<12)

2ème Heure 90 mm (<20)

LABORATOIRE AZZAITOUNA
D'Analyses Médicales
Dr. Issam ZATNI
Tissir 1 N° 92-94 Bd Hassan II Hay Tissir 1 - Berrechid
Tél: 06 67 05 14 67

Tél : Fax : 05.22.03.35.55 Gsm : 06.67.05.14.67 Email : labo.azzaitouna@gmail.com

ICE:002652320000035 -- IF : 47253041 - RC: 14169 - IP : 43100731

Adresse : N° 92-94 Bd Hassan II Hay Tissir 1 - Berrechid



مختبر التحليلات الطبية الزيتونة

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES AZZAITOUNA

*BIOCHIMIE *IMMUNOLOGIE *HEMATOLOGIE *BACTERIOLOGIE *VIROLOGIE *PARASITOLOGIE *MYCOLOGIE *SPERMIOLOGIE *HORMONOLOGIE

Dr. issam ZATNI

Médecin Biologiste

الدكتور عصام زاتني
طبيب إحيائي

231120043 – M. Said TAYAB

20-03-2023

10.61

FERRITINE

(Méthode Immuno-turbidimétrique)


8.25 µg/l

Valeurs normales:

Homme : 20 – 250 µg/L

Femme : 10 – 120 µg/L

Enfants : 6 – 300 µg/L



L.A.M.A.

PRÉLEVEMENT À DOMICILE

Page 3 / 4

Tél : Fax : 05.22.03.35.55 Gsm : 06.67.05.14.67 Email : labo.azzaitouna@gmail.com

ICE:002652320000035 -- IF : 47253041 - RC: 14169 - IP : 43100731

Adresse : N° 92-94 Bd Hassan II Hay Tissir 1 - Berrechid



مختبر التحليلات الطبية الزيتونة

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES AZZAITOUNA

*BIOCHIMIE *IMMUNOLOGIE *HEMATOLOGIE *BACTERIOLOGIE *VIROLOGIE *PARASITOLOGIE *MYCOLOGIE *SPERMIOLOGIE *HORMONOLOGIE

Dr. issam ZATNI

Médecin Biologiste

الدكتور عصام زاتني
طبيب إحيائي

231120043 - M. Said TAYAB

BIOCHIMIE SANGUINE

(Beckman Coulter AU 480)

20-03-2023

UREE

(Méthode Uréase-GLDH Beckman Coulter)

0.15 g/L

(0.17-0.43)

0.18

2.50 mmol/L

(2.83-7.16)

20-03-2023

CREATININE SANGUINE

(Méthode Enzymatique Beckman Coulter)

6.4 mg/L

(7.1-13.2)

7.1

56.6 µmol/L

(62.8-116.8)

GLYCEMIE A JEUN

(Méthode Héxokinase-G6PDH)

0.99 g/L

(0.70-1.10)

5.49 mmol/L

(3.89-6.11)

CHOLESTEROL TOTAL

(Méthode CHOD-PAP Beckman Coulter)

1.31 g/L

(<2.00)

3.39 mmol/L

(<5.17)

HDL - CHOLESTEROL

(Méthode Enzymatique Beckman Coulter)

0.40 g/L

(>0.40)

1.03 mmol/L

(>1.03)

CHOLESTEROL LDL

(Méthode CHO-PAP Beckman Coulter)

0.89 g/L

2.30 mmol/L

Niveau de risque cardiovasculaire (NCEP ATPIII):

LDL-CHOLESTEROL

< 1.0 g/L	:	Désirable / normal
Entre 1 et 1.29 g/L	:	Légèrement au-dessus / optimum
Entre 1.3 et 1.59 g/L	:	Limite / élevé
Entre 1.6 et 1.89 g/L	:	Elevé
> 1.9 g/L	:	Très élevé

Facteurs de risque possibles : Age, tabagisme, HTA, diabète type II, antécédents coronariens

20-03-2023

ASAT (TGO)

(Méthode IFCC Beckman Coulter)

19.0 UI/L

(<50.0)

17.0

20-03-2023

ALAT (GPT)

(Méthode IFCC Beckman Coulter)

20.4 UI/L

(<45.0)

18.2

IMMUNOLOGIE - SEROLOGIE SANGUINE

LABORATOIRE AZZAITOUNA
D'Analyses Médicales
Dr. Issam ZATNI
Tissir 1 N°92 Bd Hassan II - Berrechid
Tél: 06 67 05 14 67

Page 2 / 4

Tél : Fax : 05.22.03.35.55 Gsm : 06.67.05.14.67 Email : labo.azzaitouna@gmail.com

ICE:002652320000035 -- IF : 47253041 - RC: 14169 - IP : 43100731

Adresse : N° 92-94 Bd Hassan II Hay Tissir 1 - Berrechid

PRÉLEVEMENT À DOMICILE

Dr Rachidi Jamila

Médecine générale



الدكتورة رشيدى جميلة

الطب العام

Casablanca le :

13/11/2023

TAYAB, SAID :

LABORATOIRE AZAITOUNA
D'Analyses Médicales
Dr. Issam ZATNI
Tissir 1 N°92 Bd Hassan II - Berrechid
Tél: 06 67 05 14 67

- 7 NFS
- 7 Feriti
- 7 transaminase
- 7 urée, creat
- 7 Cholestérol
LDL
HDL
- 7 glycémie
- 7 examen Sestelle



درب بوشنتوف زنقة 19 رقم 5 شارع بني امكيد الطابع الأول الدار البيضاء

Derb Bouchentouf Rue 19 N° 5 1er étage Bd. Beni M'Guild Casablanca

Tél: 05.22.80.42.83

LABORATOIRE D'ANALYSE MEDICALES AZZAITOUNA

N°92 -94 Bd Hassan II Hay Tissir 1 Berrechid
Tél/Fax : 05.22.03.35.55 – Mail : labo.azzaitouna@gmail.com

FACTURE N° : 231100314

INPE : 063064950



Berrechid le 20-11-2023

M. TAYAB Said

Récapitulatif des analyses	
Analyse	Clé
Numération Formule Sanguine	B70
LDL mesuré	B40
Cholestérol HDL	B40
FERRITINE	B200
Urée	B30
Glycémie	B30
Parasitologie (Examen direct + enrichissement)	B40
Cholestérol total	B30
Créatinine	B30
Transaminases O (TGO)	B50
Transaminases P (TGP)	B50
Vitesse de sédimentation	B40

Total des B : 650

TOTAL DOSSIER : 650.00 DH Payé par Espèces

Arrêtée la présente facture à la somme de :
six cent cinquante dirhams .

ICE : 002652320000035 IF : 47253041

LABORATOIRE AZZAITOUNA
D'Analyses Médicales
Dr. Tayeb ZATNI
Tissir 1/92-94 Hassan II - Berrechid
Tél: 05 22 03 35 55 05 14 67

Dr Rachidi Jamila

Médecine générale



الدكتورة رشدي جميلة

الطب العام

Casablanca le :

31/11/2023

PHARMACIE PITCHOUI
Derb Foukara Rue 10
Casablanca Tél: 05 22 28 72 71
ICE 002942585000050
AYAB SAID

669,00

Super.

Dose 1 x 2 mois

S4

99,00

2) doses 20

Appl.

S7

459,00

PHARMACIE PITCHOUI
Derb Foukara Rue 10
Casablanca Tél: 05 22 28 72 71
ICE 002942585000050



شارع بني امكيد الطابع الأول الدار البيضاء رقم 5

Derb Bouchentouf Rue 19 N° 5 1er étage Bd. Beni M'Guild Casablanca

Tél: 05.22.80.42.83

OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules,
boîtes de 7, 14, 28 et 56
(Oméprazole)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes sur son utilisation.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical.
- Si vous ressentez des effets indésirables, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Rubrique 4.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que l'OEDES 20 mg ?
2. Quelles sont les indications ?
3. Comment prendre l'OEDES 20 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver l'OEDES 20 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE OEDES® 20 mg EST-IL UTILISÉ ?

La classe pharmaco-thérapeutique OEDES 20 mg contient la substance active, le microgranule gastro-résistant, qui diminue la quantité d'acide produite dans l'estomac.

Indications thérapeutiques :
OEDES 20 mg est utilisé pour traiter :

- Chez les adultes :
 - le reflux gastro-œsophagien (RGO) ;
 - le reflux gastro-œsophagien (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures ;
 - les ulcères de la partie haute de votre estomac (ulcère gastrique) ;
 - les ulcères infectés par une bactérie.

En cas de reflux gastro-œsophagien, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : OEDES 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• un excès d'acidité dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO) ; l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures ;
- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OEDES 20 mg, gélules gastro-résistantes ?

Contre-indications :

Ne prenez jamais OEDES 20 mg, gélule :

- si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OEDES 20 mg.

l'arrêt de l'administration de OEDES 20 mg ;

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti-vitamines K : une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES 20 mg ;
- Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) ;
- Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) ;
- Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) ;
- Mollipertus (*Hypericum perforatum*) (utilisé dans le traitement de la dépression) ;

LOT 221879
EXP 08/2025
PPV 99.00DH

Grossesse, Allaitement et Fertilité :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. L'acide dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il passe dans le sang de l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Effets indésirables et utilisation des machines :

Le traitement par OEDES 20 mg peut entraîner des effets sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines. Des effets indésirables sont possibles, tels que des troubles visuels (effets indésirables). Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

Aux excipients à effet notoire :

Ce médicament contient du saccharose. Si votre médecin vous a prescrit ce médicament, contactez-le, avant de prendre ce médicament.

OEDES 20 mg, gélule contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par gélule, c'est-à-dire qu'il est essentiellement "sans sodium".

3. COMMENT PRENDRE OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante ?

Prenez OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous :

Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.
- La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère gastrique) :

Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre OEDES 20 mg :

N'arrêtez pas de prendre OEDES 20 mg sans avis du médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) ou très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves/rare).
- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique (très rare).

• Eruption cutanée généralisée, température corporelle élevée et ganglions lymphatiques hypertrophiés (syndrome DRESS ou syndrome d'hypersensibilité aux médicaments) (rare).

• Une éruption cutanée rouge, squameuse et généralisée avec des vésicules sous la peau et des cloques, accompagnée de fièvre. Les symptômes apparaissent généralement au début du traitement (pustulose exanthématique aiguë généralisée) (rare).

• Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie (rare).

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- Maux de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulences.
- Nausées ou vomissements.
- Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissements, fourmillements, somnolence.
- Vertiges.

• Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

• Eruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

• Maltresse générale, manque d'énergie.

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

- Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une glaucosité, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.
- Diminution du taux de sodium dans le sang. Ceci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

• Agitation, confusion ou dépression.

• Troubles du goût.

• Troubles de la vue, tels que vision trouble.

• Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).

• Sécheresse buccale.

• Inflammation de l'intérieur de la bouche.

• Infection appelée « muguet » qui peut affecter l'intestin et est causée par un champignon.

• Perte de cheveux (alopécie).

• Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.

• Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

• Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).

• Augmentation de la transpiration.

قد يسبب السوربيتول اضطراباً
يحتوي هذا الدواء على 1
ما يعادل 4 ملغ/مل إذا
طبيبك أو الصيدلي، خاصةً
على البروبيلين غليكول أو الـ
يحتوي هذا الدواء على 4
المائدة/ملع الطعام، في كل 4
الموصى به يومياً من السوربي
قد يسبب فيريكس رنود فعل
ملح الصوديوم من مادة البروبي
السوربيوم ميتيل باراهيدروكسي

الصيدلاني.
المعوي وبالتالي من
تدخل العظم مثل
تهاب المفاصل.
الغدة الدرقية قليلة
الرعاشي
زرق الأعضاء أو



إن البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.
إات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.
أثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تقافم
راض الجانبية أخير طبيبك أو الصيدلاني.

تخزين فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
يـه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، يتعين
بعيداً عن متناول وانظار الأطفال.
تتعمال فيريكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء
المين على العبوة.
م انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
م طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. أطلب من
أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من
شان هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :
مكونات فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
المادة الفعالة هي بروتين سينسيلات الحديد (يحتوي على بروتينات
الحليب) :
كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي 800 ملغ من بروتين
سينسيلات الحديد، ما يعادل 4 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :
سيرينيول (E-420)، بروبيلان كليكول، ميتيل باراهيدروكسينيزوات
الصوديوم (E-219)، بروبيل باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم (E-217)،
سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، أملاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العبوة :
فيريكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لون بني مع رائحة مميزة.
علية من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :
إيتالغوفماكو S.A.
28108 الكوينداس، مدريد.
إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :



المختبر الصيدلي فيرساليا
المنطقة الصناعية حد السوالم، تجرئة 149.
إقليم برشيد، المغرب.

3. كيفية تناول فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
اتبع بالضبط التعليمات الوصفية من قبل طبيبك أو الصيدلاني. إذا كان
لكيك استشر طبيبك لاتنس أن تأخذ دوايك.
طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة
المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.
محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.
الجرعات الغذائية هي :
الكبار : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل
40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.
الأطفال : 15 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في
جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.
مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر
العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.
أخير طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.

**إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيريكس 40 ملغ محلول
لشرب مالملي يجب عمله :**
استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو إتصل بمركز مكافحة التسمم
والليقصة الدوائية الهاتف : 00212.537.68.64.64

إذا نسيت أن تأخذ فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.
إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل
وقت العلاج المعتاد.
إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو
الصيدلاني.

4. التآثيرات الغير مرغوب فيها :
شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيريكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن
تكون له تآثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص
يعانون منها.
التآثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدد في (ترددات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : آلام في المعدة، غثيان، إمساك أو إسهال
الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيض الجرعة أو عند الضرورة أو عند
مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد و التئسج تحت الجلد :
تفاعل أرجي.

سدية والمشروبات :
ي تخفض امتصاص
4 ملغ عن مدة لا تقل
من هذه الأخيرة يجب
عصير الحمضيات
نقص الحديد، ليس

للشرب :
كل قارورة،
أو (طفلك) تعاني من
صابتك بعدم حمل
خلل فيها، الفركتوز،

بالأسود نتيجة حذف الحديد.
مرغوب فيها غير مؤذية.
بينة غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تقاوم
أنتية أخير طبيبك أو الصيدلاني.

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
يجب حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، يتعين
أن تناول وأطوار الأطفال.
فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء
العلبة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
يجب ألا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. اطلب من
الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من
شان هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :

مكونات فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
المادة الفعالة هي بروتين سيسيملات الحديد (يحتوي على بروتينات
الحليب) :

كل قارورة من 15 ملل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين
سيسيملات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :

سيريستول (E-420)، بروبيلان، كليكول، ميتيل باراهيدروكسيبنزوات
الصوديوم (E-219)، بروبيل باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم (E-217)،
سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، أملاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العلبة :

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف نولون بني مع رائحة مميزة.
علبة من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :

إنتالفرماكو S.A.
28108 الكونيناس. مدريد.
إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :

Versalya
La femme et son enfant

المختبر الصيدلي فيرساليا

المنطقة الصناعية حد السوالم، تجزئة 149.
إقليم برشيد، المغرب.



قد يصيب السوريستول اضطرابات
يحتوي هذا الدواء على 61.1 ملغ من
ما يعادل 4.1 ملغ ملل. إذا كان عمر
طبيبك أو الصيدلي، خاصة إذا كان
على البروبيلين غليكول أو الكحول.
يحتوي هذا الدواء على 38.4 ملغ
الماتة/ملع الطعام في كل قنينة. وهو
الحوصي به يومياً من الصوديوم البالغ
قد يصيب فيريلاكس ردود فعل تحسسية
ملح الصوديوم من مادة البروبيل باراهم
الصوديوم ميتيل باراهيدروكسيبنزوات

الغشائي
زرق الأعضاء أو
فيريلاكس 40 ملغ
ناه، لابد من الفصل
الية مدة لا تقل عن
الذين يعانون من
يعانون من فرط
مثل أو ميمبرازول،
تحت عن الدم الخفي

3. كيفية تناول فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

اتبع بالضبط التعليمات الوصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني، إذا كان
لديك شك، استشر طبيبك. لاتنس أن تأخذ دواذك
طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة
المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.
محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.
الجرعات المعتادة هي :

الكبار : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل
40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.
الأطفال : 1.5 إلى 4 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في
جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.

مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر
العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.
أخبر طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريلاكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.

إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيريلاكس 40 ملغ محلول
لشرب والذي يجب عمله :

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو إتصل بمركز مكافحة التسمم
واليقظة الدوائية الهاتف : 00212-537.68.64.64

إذا نسيت أن تأخذ فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.
إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل
وقت العلاج المعتاد.
إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو
الصيدلاني.

4. التآثيرات الغير مرغوب فيها :

شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن
تكون له تآثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص
يعانون منها.

التآثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدث في (ترددات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : آلام في المعدة، غثيان، إسهال أو إسهال
الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيف الجرعة أو عند الضرورة أو عند
مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد والتسبج تحت الجلد :

تفاعلات أرجي.

دية والمشروبات :
يخفض امتصاص
4 ملغ عن مدة لا تقل
هذه الأخيرة يجب
عصير الحمضيات
نقص الحديد، ليس

لشرب :
ل قارورة.
أو (طفلك) تعاني من
صابتك بعدم تحمل
مثل فيها الفركتوز.

بالأسود نتيجة حذف الحديد.
مرغوب فيها غير مؤذية.
بينة غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تقاوم
أنتية أخير طبيبك أو الصيدلاني.

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
يجب حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، يتعين
أن تناول وأطفال الأطفال.
فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء
العلبة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
يجب ألا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. اطلب من
الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من
شان هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :

مكونات فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
المادة الفعالة هي بروتين سيسيملات الحديد (يحتوي على بروتينات
الحليب) :

كل قارورة من 15 ملل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين
سيسيملات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :

سيريول (E-420)، برويلان، كليكول، ميتيل باراهيدروكسينزوات
الصوديوم (E-219)، برويل باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم (E-217)،
سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، أملاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العلبة :

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف نولون بني مع رائحة مميزة.
علبة من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :

إنتالفرماكو S.A.
28108 الكونيناس. مدريد.
إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :

Versalya
La femme et son enfant

المختبر الصيدلي فيرساليا

المنطقة الصناعية حد السوالم، تجزئة 149.
إقليم برشيد، المغرب.



قد يصيب السوريول اضطرابات
يحتوي هذا الدواء على 61.1 ملغ من
ما يعادل 4.1 ملغ ملل. إذا كان عمر
طبيبك أو الصيدلي، خاصة إذا كان
على البروبيوليك غليكول أو الكحول.
يحتوي هذا الدواء على 38.4 ملغ
الماتة/ملع الطعام في كل قنينة. وهو
الحوصي به يومياً من الصوديوم البالغ
قد يصيب فيريلاكس ردود فعل تحسسية
ملح الصوديوم من مادة البروبيول باراهم
الصوديوم ميتيل باراهيدروكسينزوات

الصيدلاني.
المعوي وبالتالي من
تدخل العظم مثل
تهاب المفاصل.
الغدة الدرقية قليلة
الرعاشي
زرق الأعضاء أو

3. كيفية تناول فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

اتبع بالضبط التعليمات الوصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني، إذا كان
لديك شك، استشر طبيبك. لاتنس أن تأخذ دواك.
طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة
المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.
محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.
الجرعات المعتادة هي :

الكبار : 1 إلى 2 قارورة في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل
40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.
الأطفال : 1.5 إلى 4 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في
جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.

مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر
العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.
أخبر طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريلاكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.

ية فيريلاكس 40 ملغ
ناه، لابد من الفصل
الية مدة لا تقل عن
الذين يعانون من
يعانون من فرط
مثل أو ميمبرازول،
حت من الدم الخفي

إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيريلاكس 40 ملغ محلول
لشرب والذي يجب عمله :

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو إتصل بمركز مكافحة التسمم
واليقظة الدوائية الهاتف : 00212-537.68.64.64

إذا نسيت أن تأخذ فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.
إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل
وقت العلاج المعتاد.
إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو
الصيدلاني.

دية والمشروبات :
ي تخفض امتصاص
4 ملغ عن مدة لا تقل
هذه الأخيرة يجب
عصير الحمضيات
نقص الحديد، ليس

4. التآثيرات الغير مرغوب فيها :

شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن
تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص
يعانون منها.

التآثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدث في (ترددات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : الام في المعدة، غثيان، إسهال أو إسهال
الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيف الجرعة أو عند الضرورة أو عند
مقاطعة العلاج.

لشرب :
ل قارورة.
أو (طفلك) تعاني من
صابتك بعدم تحمل
مثل فيها الفركتوز،

اضطرابات الجلد والتسبج تحت الجلد :

تفاعلات أرجي.

قد يسبب السوربيتول اضطراب
يحتوي هذا الدواء على 1
ما يعادل 4هـ ملغ/مل إذا
طبيبك أو الصيدلي، خاصة
على البروبيلين غليكول أو ال
يحتوي هذا الدواء على 4
الماندات/ملع الطعام، في كل 4
الموصى به يومياً من السوربي
قد يسبب فيريكس رنود فعل
ملح الصوديوم من مادة البروبي
الصوديوم ميتيل باراهيدروكسي

الصيدلاني.
المعوي وبالتالي من
تدخل العظم مثل
تهاب المفاصل.
الغدة الدرقية قليلة
الرعاشي
زرق الأعضاء أو

FERPLEX® 40 mg
Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

إن البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.
إات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.
أثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تقافم
راض الجانبية أخير طبيبك أو الصيدلاني.

تخزين فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
به عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، يتعين
بعيدا عن متناول وانظار الأطفال.
تتعال فيريكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء
المين على العبوة.
م انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
م طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. اطلب من
أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من
شان هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :
مكونات فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
المادة الفعالة هي بروتين سينسيلات الحديد (يحتوي على بروتينات
الحليب) :
كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي 800 ملغ من بروتين
سينسيلات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :
سيرينيول (E-420)، بروبيلان كليكول، ميتيل باراهيدروكسينيزوات
الصوديوم (E-219)، بروبيل باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم (E-217)،
سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، أملاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العبوة :
فيريكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لون بني مع رائحة مميزة.
علية من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :
إيتالفرماكو S.A.
28108 الكوينداس، مدريد.
إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :



المختبر الصيدلي فيرساليا

المنطقة الصناعية حد السوالم، تجرئة 149.
إقليم برشيد، المغرب.

3. كيفية تناول فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
اتبع بالضبط التعليمات الوصفية من قبل طبيبك أو الصيدلاني. إذا كان
لكيك استشر طبيبك لاتنس أن تأخذ دوايك.
طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة
المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء، قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.
محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.
الجرعات الغذائية هي :
الكبار : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل
40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.
الأطفال : 15 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في
جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.
مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر
العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.
أخير طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريكس جيدة جدا أو ضعيفة جدا.

**إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيريكس 40 ملغ محلول
لشرب مالملي يجب عمله :**
استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو إتصل بمركز مكافحة التسمم
والليقصة الدوائية الهاتف : 00212.537.68.64.64

إذا نسيت أن تأخذ فيريكس 40 ملغ محلول لشرب :
لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.
إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل
وقت العلاج المعتاد.
إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو
الصيدلاني.

4. التآثيرات الغير مرغوب فيها :
شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيريكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن
تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص
يعانون منها.
التآثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدد في (تكررات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : آلام في المعدة، غثيان، إمساك أو إسهال
الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيض الجرعة أو عند الضرورة أو عند
مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد و التئسج تحت الجلد :
تفاعل أرجي.

سدية والمشروبات :
يخفض امتصاص
40 ملغ من مدة لا تقل
هذه الأخيرة يجب
عصير الحمضيات
نقص الحديد، ليس

للشرب :
كل قارورة،
أو (طفلك) تعاني من
صابتك بعدم حمل
خلل فيها، الفركتوز،

بالأسود نتيجة حذف الحديد.
مرغوب فيها غير مؤذية.
بينة غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تقاوم
أنتية أخير طبيبك أو الصيدلاني.

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
يجب حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، يتعين
أن تناول وأطوار الأطفال.
فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء
العلبة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
يجب ألا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. اطلب من
الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من
شان هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :

مكونات فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
المادة الفعالة هي بروتين سيسيملات الحديد (يحتوي على بروتينات
الحليب) :

كل قارورة من 15 ملل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين
سيسيملات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :

سيريول (E-420)، برويلان، كليكول، ميتيل باراهيدروكسينزوات
الصوديوم (E-219)، برويل باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم (E-217)،
سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، أملاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العلبة :

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف نولون بني مع رائحة مميزة.
علبة من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :

إنتالفرماكو S.A.
28108 الكونيناس. مدريد.
إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :

Versalya
La femme et son enfant

المختبر الصيدلي فيرساليا

المنطقة الصناعية حد السوالم، تجزئة 149.
إقليم برشيد، المغرب.



قد يصيب السوريول اضطرابات
يحتوي هذا الدواء على 61.1 ملغ من
ما يعادل 4.1 ملغ ملل. إذا كان عمر
طبيبك أو الصيدلي، خاصة إذا كان
على البروبيوليك غليكول أو الكحول.
يحتوي هذا الدواء على 38.4 ملغ
الماتة/ملع الطعام في كل قنينة. وهو
الحوصي به يومياً من الصوديوم البالغ
قد يصيب فيريلاكس ردود فعل تحسسية
ملح الصوديوم من مادة البروبيول باراهم
الصوديوم ميتيل باراهيدروكسينزوات

الصيدلاني.
المعوي وبالتالي من
تدخل العظم مثل
تهاب المفاصل.
الغدة الدرقية قليلة
الرعاشي
زرق الأعضاء أو

3. كيفية تناول فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

اتبع بالضبط التعليمات الوصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني، إذا كان
لديك شك، استشر طبيبك. لاتنس أن تأخذ دواذك
طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة
المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.
محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.
الجرعات المعتادة هي :

الكبار : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل
40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.
الأطفال : 1.5 إلى 4 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في
جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.

مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر
العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.
أخبر طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريلاكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.

ية فيريلاكس 40 ملغ
ناه، لابد من الفصل
الية مدة لا تقل عن
الذين يعانون من
يعانون من فرط
مثل أو ميبرازول،
حت من الدم الخفي

إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيريلاكس 40 ملغ محلول
لشرب والذي يجب عمله :

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو إتصل بمركز مكافحة التسمم
واليقظة الدوائية الهاتف : 00212-537.68.64.64

إذا نسيت أن تأخذ فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.
إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل
وقت العلاج المعتاد.
إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو
الصيدلاني.

دية والمشروبات :
ي تخفض امتصاص
4 ملغ عن مدة لا تقل
هذه الأخيرة يجب
عصير الحمضيات
نقص الحديد، ليس

4. التآثيرات الغير مرغوب فيها :

شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن
تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص
يعانون منها.

التآثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدث في (ترددات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : الام في المعدة، غثيان، إسهال أو إسهال
الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيف الجرعة أو عند الضرورة أو عند
مقاطعة العلاج.

لشرب :
ل قارورة.
أو (طفلك) تعاني من
صابتك بعدم تحمل
مثل فيها الفركتوز.

اضطرابات الجلد والتسبج تحت الجلد :
تفاعلات أرجي.

بالأسود نتيجة حذف الحديد.
مرغوب فيها غير مؤذية.
بينة غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تقاوم
أنتية أخير طبيبك أو الصيدلاني.

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
يجب حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، يتعين
أن تناول وأطوار الأطفال.
فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء
العلبة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
يجب ألا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. اطلب من
الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من
شان هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :

مكونات فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :
المادة الفعالة هي بروتين سيسيملات الحديد (يحتوي على بروتينات
الحليب) :

كل قارورة من 15 ملل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين
سيسيملات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :

سيريول (E-420)، برويلان، كليكول، ميتيل باراهيدروكسينزوات
الصوديوم (E-219)، برويل باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم (E-217)،
سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، أملاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العلبة :

فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف نولون بني مع رائحة مميزة.
علبة من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :

إنتالفرماكو S.A.
28108 الكونيناس. مدريد.
إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :

Versalya
La femme et son enfant

المختبر الصيدلي فيرساليا

المنطقة الصناعية حد السوالم، تجزئة 149.
إقليم برشيد، المغرب.



قد يصيب السوريول اضطرابات
يحتوي هذا الدواء على 61.1 ملغ من
ما يعادل 4.1 ملغ ملل. إذا كان عمر
طبيبك أو الصيدلي، خاصة إذا كان
على البروبيوليك غليكول أو الكحول.
يحتوي هذا الدواء على 38.4 ملغ
الماتة/ملع الطعام في كل قنينة. وهو
الحوصي به يومياً من الصوديوم البالغ
قد يصيب فيريلاكس ردود فعل تحسسية
ملح الصوديوم من مادة البروبيول باراهم
الصوديوم ميتيل باراهيدروكسينزوات

الصيدلاني.
المعوي وبالتالي من
تدخل العظم مثل
تهاب المفاصل.
الغدة الدرقية قليلة
الرعاشي
زرق الأعضاء أو

3. كيفية تناول فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

اتبع بالضبط التعليمات الوصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني، إذا كان
لديك شك، استشر طبيبك. لاتنس أن تأخذ دواك.
طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة
المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.
محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.
الجرعات المعتادة هي :

الكبار : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل
40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.
الأطفال : 1.5 إلى 4 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في
جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.

مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر
العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.
أخبر طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريلاكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.

ية فيريلاكس 40 ملغ
ناه، لابد من الفصل
الية مدة لا تقل عن
الذين يعانون من
يعانون من فرط
مثل أو ميمبرازول،
حت من الدم الخفي

إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيريلاكس 40 ملغ محلول
لشرب والذي يجب عمله :

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو إتصل بمركز مكافحة التسمم
واليقظة الدوائية الهاتف : 00212-537.68.64.64

إذا نسيت أن تأخذ فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب :

لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.
إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل
وقت العلاج المعتاد.
إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو
الصيدلاني.

دية والمشروبات :
ي تخفض امتصاص
4 ملغ عن مدة لا تقل
هذه الأخيرة يجب
عصير الحمضيات
نقص الحديد، ليس

4. التآثيرات الغير مرغوب فيها :

شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيريلاكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن
تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص
يعانون منها.

التآثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدث في (ترددات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : الام في المعدة، غثيان، إسهال أو إسهال
الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيف الجرعة أو عند الضرورة أو عند
مقاطعة العلاج.

لشرب :
ل قارورة.
أو (طفلك) تعاني من
صابتك بعدم تحمل
مثل فيها الفركتوز،
تفاعل أرجي.

اضطرابات الجلد والتسبج تحت الجلد :