

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0008962

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 07539 Société : Royal Air Maroc
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : Veuve
Nom & Prénom : Abbada Zahra
Date de naissance : 12/07/1974
Adresse : Lot n°37 n° 737 Nhamid Nnamkesh
Tél. 0666076349 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 12/09/2023
Nom et prénom du malade : ABBADA Zahra
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : AVC / RN / ALC
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/09/2023	Cs, ECG	1	300,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

12/09/2023 335,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

D'Analyses Médicales 12/09/23 B40 50,00 DH

Dr. KACHACH El Moustafa
Lot. Maatallah N° 1263 Mhamid
Marrakech - Tél: 05 24 37 36 25

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre Montant détaillé des Honoraires



AM PC IM IV

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCOEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX	
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS															
			DATE DU DEVIS															
		DATE DE L'EXECUTION																

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. BAJI Khalid

Spécialiste des Maladies du Cœur et des Vaisseaux
Diplômé de la Faculté de Médecine de Nice

ICE : 0016701980051



الدكتور الباجي خالد

اختصاصي في أمراض القلب و الشرايين
خريج كلية الطب بنيس بفرنسا

IP : 071017347

Marrakech, le 12/09/23 في مراكش،

Mr ABBAIDA ZAHRA

TP INR

Dr. BAJI Khalid
Cardiologue
183 Av. Mohamed V - Gueliz
Marrakech - Tel: 05 24 43 88 18

LABORATOIRE AL FARABI
D'Analyses Médicales
Dr. KACHACH El Mostafa
Lot Maatallah N° 1263 Mhamid
Marrakech - Tel: 05 24 37 36 25

Dr. BAJI Khalid

Spécialiste des Maladies du Cœur et des Vaisseaux
Diplômé de la Faculté de Médecine de Nice

ICE : 0016701980051



الدكتور الباجي خالد

اختصاصي في أمراض القلب و الشرايين
خريج كلية الطب بنيس بفرنسا

IP : 071017347

Marrakech, le في مراكش,

12 SEPTEMBRE 2023

Mme ABBADA ZAHRA

1 - ALDACTONE 50

1/2 cp matin

2 - DIGOXINE

1/4 cp le matin

3 - SINTROM

3/4 cp à 18 H - 1cp lundi -

QSP TROIS MOIS

Dr. NACHID IDRISSI Souad
PHARMACIE RAJA
1242 Lot. Maataillah M'hamid
Tél: 0524 37 28 29.

Dr. NACHID IDRISSI Souad
PHARMACIE RAJA
1242 Lot. Maataillah M'hamid
Tél: 0524 37 28 29.

Dr. BAJI Khalid
Cardiologue
183 Av. Mohamed V - Gueliz
Marrakech - Tel : 05 24 43 88 18

183, Av. Mohamed V - Guéliz - Marrakech شارع محمد الخامس جليلز مراكش

الهاتف : 05 24 43 88 18

36.8003
25 -
20 - 27



335.40

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?
3. Comment prendre DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - GLUCOSIDE CARDIOTONIQUE

code ATC : C01AA05

Ce médicament est un tonicardiaque, il augmente la force de contraction du muscle cardiaque. Il possède également des propriétés antiarythmiques (il régularise le rythme cardiaque).

Ce médicament est préconisé dans:

- le traitement de l'insuffisance cardiaque,
- certains troubles du rythme cardiaque.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé :

- si vous êtes allergique à la digoxine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés



- et vous êtes allergique à la digoxine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous avez certaines maladies cardiaques ,
 - si vous êtes en traitement par sultopride, ou par calcium intraveineux, ou par du millepertuis (voir Autres médicaments et DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé) ,
 - existence de troubles particuliers du rythme cardiaque ,
 - hypokaliémie non corrigée.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé.

Mises en garde

Dans certains troubles du rythme cardiaque (hyperexcitabilité ventriculaire), le médicament doit être arrêté.

Avant un choc électrique (avec un défibrillateur), l'arrêt du médicament est conseillé.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de traitement associé avec la midodrine (voir « Autres médicaments et DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé »).

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé

Digoxine



DIGOXINE 0,25 mg
(Digoxine)
30 comprimés

ppv: 25 DH 00

BOTTU S.A.

ment cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations s.

Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

à connaître avant de prendre

LOT: B29947
EXP: 05.2024



6200711008119

P.P.V: 56,80 DH

ALDACTONE 50[®] mg



1. QU'EST-CE QUE ALDACTONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :
Diurétiques épargneurs potassiques -
code ATC : C03DA01.

Ce médicament contient un diurétique
(la spironolactone) appartenant à la famille
des diurétiques épargneurs de potassium.
Ce principe actif augmente la quantité

opprime et triméthoprim-

thioxazole.

ALDACTONE, comprimé sécable avec
électrolytes, boissons et de l'alcool

objet.

usage, allaitement et fertilité
icament ne doit pas être utilisé :
is êtes enceinte ou si vous pensez

rette,

- si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
si vous pensez être enceinte ou planifiez
une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre

ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de

machines

Sans objet.

ALDACTONE comprimé sécable

- un mauvais fonctionnement des reins
(insuffisance rénale aiguë).
- un taux anormal de sels minéraux dans
l'organisme tel qu'une augmentation du
potassium dans le sang et une
diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet
indésirable, parlez-en à votre médecin ou
votre pharmacien. Ceci s'applique aussi
à tout effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice. Les

professionnels de santé déclarent tout effet
indésirable suspecté via le système

national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous
contribuez à fournir davantage

d'informations sur la sécurité du

médicament.

☒ valable 3 mois

Le 12/9 /2023.

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE ☒

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

DR BAJI KHALID

Certifie que Mlle, Mme, M. :

ABBAIDA ZAURA

Présente

AVC / RM / ACFA

Nécessitant un traitement d'une durée de :

3 mois

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)

 **Dr. BAJI Khalid**
Cardiologue
183 Av. Mohamed V - Gueliz
Marrakech - Tel 05 24 43 88 18

LABORATOIRE AL FARABI D'ANALYSES MEDICALES

Docteur El Mostafa KACHCHACH
Médecin Biologiste

Lot. Maatallah, Rue Oujda, N° 1263
M'Hamid
Marrakech

Tél. : 0524 37 36 25 / Fax : 0524 37 36 24

ICE : 001653741000033
IF : 40443926

INPE : 073061921

Marrakech le 12 septembre 2023

Mme ABBADA ZAHRA

FACTURE N°	207122
------------	--------

Analyses :

Taux de Prothrombine (TP) -----	B	40	Total : B 40
---------------------------------	---	----	--------------

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER

50,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cinquante Dirhams

LABORATOIRE AL FARABI
D'Analyses Médicales
Dr KACHCHACH El Mostafa
Lot. Maatallah N° 1263 Mhamid
Marrakech : 0524 37 36 25



مختبر الفارابي للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AL FARABI D'ANALYSES MEDICALES

Dr. Elmostapha KACHCHACH : Médecin Biologiste

Biochimie - Immunologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie - Hématologie

Prélèvement du : 11/09/23

Edition du : 11/09/23

Mme ABBADA ZAHRA

Dossier : 23I540

Prescripteur :

Page : 1/1

HEMOSTASE

		Normales	Antériorités
Taux de prothrombine -----:	35,80 * %	70 - 100	<u>22/05/23</u> 24,40
I.N.R. -----:	2,35		

Zone d'efficacité thérapeutique pour un patient traité par un anti-vitamine K

Prévention de thrombose veineuse	: 2 - 3
Prophylaxie opératoire	: 2 - 3
Phlébite ou embolie pulmonaire	: 2 - 4
Prévention de thrombose récidivante	: 2 - 4
Patient avec prothèse cardiaque valvulaire	: 3 - 4,5
Prévention de thrombose artérielles	: 3 - 4,5

LABORATOIRE AL FARABI

D'Analyses Médicales

Dr. KACHCHACH El Moustafa

Lot. Maatallah N° 1263 Mhamid

Marrakech - Tél: 05 24 37 36 25

à connaître avant de prendre

LOT: B29947
EXP: 05.2024



6200711008119

P.P.V: 56,80 DH

ALDACTONE 50[®] mg



1. QU'EST-CE QUE ALDACTONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :
Diurétiques épargneurs potassiques -
code ATC : C03DA01.

Ce médicament contient un diurétique
(la spironolactone) appartenant à la famille
des diurétiques épargneurs de potassium.
Ce principe actif augmente la quantité

opprime et triméthoprim-

thioxazole.

**ALDACTONE, comprimé sécable avec
sels, boissons et de l'alcool**

objet.

se, allaitement et fertilité

icament ne doit pas être utilisé :

is êtes enceinte ou si vous pensez

rette,

- si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
si vous pensez être enceinte ou planifiez
une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre

ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de

machines

Sans objet.

ALDACTONE comprimé sécable

- un taux anormal de sels minéraux dans
l'organisme tel qu'une augmentation du
potassium dans le sang et une

diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet
indésirable, parlez-en à votre médecin ou

votre pharmacien. Ceci s'applique aussi

à tout effet indésirable qui ne serait pas

mentionné dans cette notice. Les

professionnels de santé déclarent tout effet

indésirable suspecté via le système

national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous

contribuez à fournir davantage

d'informations sur la sécurité du

médicament.

à connaître avant de prendre

LOT: B29947
EXP: 05.2024



6200711008119

P.P.V: 56,80 DH

ALDACTONE 50[®] mg



1. QU'EST-CE QUE ALDACTONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :
Diurétiques épargneurs potassiques -
code ATC : C03DA01.

Ce médicament contient un diurétique
(la spironolactone) appartenant à la famille
des diurétiques épargneurs de potassium.
Ce principe actif augmente la quantité

opprime et triméthoprim-

thioxazole.

**ALDACTONE, comprimé sécable avec
sucres, boissons et de l'alcool**

objet.

se, allaitement et fertilité
icament ne doit pas être utilisé :
is êtes enceinte ou si vous pensez

rette,

- si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
si vous pensez être enceinte ou planifiez
une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre

ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de

machines

Sans objet.

ALDACTONE comprimé sécable

- un mauvais fonctionnement des reins
(insuffisance rénale aiguë).
- un taux anormal de sels minéraux dans
l'organisme tel qu'une augmentation du
potassium dans le sang et une
diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet
indésirable, parlez-en à votre médecin ou
votre pharmacien. Ceci s'applique aussi
à tout effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice. Les

professionnels de santé déclarent tout effet
indésirable suspecté via le système
national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous
contribuez à fournir davantage
d'informations sur la sécurité du

médicament.

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

... à fortes doses.

4 ملغ
سنتروم 4
سينوكوما رول

... de mycoses (infections à

Sintrom® 4 mg
Acétylsalicylate
10 comprimés

6 118000 181187

PPV :
 Exp :
 N° Lot :

20100

saignement éventuel. Ainsi, signalez-tout de suite tout saignement, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

...ion et durée du traitement :
 Posologie
 Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».
 A titre indicatif :
 La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour équilibrer votre traitement.
 Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.
 Mode d'administration
VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.
 Fréquence d'administration
 La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.
 Une prise par jour. Il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.
 Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.
 Durée du traitement
 Selon prescription médicale.
 Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
 Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
 Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
 Un surdosage peut se manifester par :
 • l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;
 • un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.
 Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.
Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
 Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
 La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.
 Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
 Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

... à fortes doses.

4 ملغ
سنتروم 4
سينوكوما رول

... de mycoses (infections à

Sintrom® 4 mg
Acétylsalicylate
10 comprimés

6 118000 181187

PPV :
 Exp :
 N° Lot :

20100

saignement éventuel. Ainsi, signalez-tout de suite tout saignement, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

...ion et durée du traitement :
 Posologie
 Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».
 A titre indicatif :
 La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour équilibrer votre traitement.
 Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.
 Mode d'administration
VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.
 Fréquence d'administration
 La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.
 Une prise par jour. Il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.
 Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.
 Durée du traitement
 Selon prescription médicale.
 Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
 Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
 Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
 Un surdosage peut se manifester par :
 • l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;
 • un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.
 Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.
Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
 Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
 La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.
 Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
 Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

... à fortes doses.

4 ملغ
سنتروم 4
سينوكوما رول

... de mycoses (infections à

Sintrom® 4 mg
Acétylsalicylate
10 comprimés

6 118000 181187

PPV :
 Exp :
 N° Lot :

20100

saignement éventuel. Ainsi, signalez-tout de suite tout saignement, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

...ion et durée du traitement :
 Posologie
 Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».
 A titre indicatif :
 La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour équilibrer votre traitement.
 Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.
 Mode d'administration
VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.
 Fréquence d'administration
 La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.
 Une prise par jour. Il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.
 Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.
 Durée du traitement
 Selon prescription médicale.
 Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
 Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
 Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
 Un surdosage peut se manifester par :
 • l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;
 • un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.
 Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.
Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
 Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
 La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.
 Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
 Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

... à fortes doses.

4 ملغ
سنتروم 4
سينوكوما رول

... de mycoses (infections à

Sintrom® 4 mg
Acétylsalicylate
10 comprimés

6 118000 181187

PPV :
 Exp :
 N° Lot :

20100

saignement éventuel. Ainsi, signalez-tout de suite tout saignement, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

...ion et durée du traitement :
 Posologie
 Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».
 A titre indicatif :
 La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour équilibrer votre traitement.
 Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.
 Mode d'administration
VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.
 Fréquence d'administration
 La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.
 Une prise par jour. Il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.
 Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.
 Durée du traitement
 Selon prescription médicale.
 Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
 Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
 Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
 Un surdosage peut se manifester par :
 • l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;
 • un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.
 Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.
Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
 Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
 La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.
 Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
 Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons);
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

... à fortes doses.

4 ملغ
سنتروم 4
سينوكوما رول

... de mycoses (infections à

Sintrom® 4 mg
Acétylsalicylate
10 comprimés

6 118000 181187

PPV :
Exp :
N° Lot :

20100

saignement éventuel. Ainsi, signalez tout si vous avez ou avez eu :
notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

Posologie
Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».
A titre indicatif :
La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour équilibrer votre traitement.
Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.
Mode d'administration
VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.
Fréquence d'administration
La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.
Une prise par jour, il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.
Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.
Durée du traitement
Selon prescription médicale.
Le comprimé peut être divisé en dose égale.
Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Un surdosage peut se manifester par :
• l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;
• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.
Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.
Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.
Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.
Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.
Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons);
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

... à fortes doses.

4 ملغ
سنتروم 4
سينوكوما رول

... de mycoses (infections à

Sintrom® 4 mg
Acétylsalicylate
10 comprimés

6 118000 181187

PPV :
Exp :
N° Lot :

20100

saignement éventuel. Ainsi, signalez tout si vous avez ou avez eu :
notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

Posologie
Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».
A titre indicatif :
La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour équilibrer votre traitement.
Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.
Mode d'administration
VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.
Fréquence d'administration
La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.
Une prise par jour, il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.
Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.
Durée du traitement
Selon prescription médicale.
Le comprimé peut être divisé en dose égale.
Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Un surdosage peut se manifester par :
• l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;
• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.
Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.
Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.
Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.
Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.
Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre