

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed V Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax :



Déclaration de Maladie

N° M21- 068291

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :	831	Société :	RAM
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	RYARALI 4/SDALLAY
Nom & Prénom :		A. RYARALI 4/SDALLAY	
Date de naissance :		21/08/85	
Adresse :		SETTAT	
Tél. :		05 22 20 45 45 / 05 22 20 45 45 Total des frais engagés :	

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :	DR HABIB AHMED SETTAT		
Date de consultation :	2 NOV. 2023		
Nom et prénom du malade :	Rabiah Abdellah		
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	Age: 58
Nature de la maladie :	Insomnie Mohammedia		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : SETTAT Signature de l'adhérent(e) :
Le : 20/11/2023



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/12/20	C	150,00		220,00 Dr. Abdellatif ADDA 71, Rue Haoudi Congo PAM Tél: 06.23.72.39.05 - SETTAT

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ROUHADA Dr. Abdellatif ADDA 71, Rue Haoudi Congo PAM Tél: 06.23.72.39.05 - SETTAT	20.12.23	210,00

062062534

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

ODF PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H 25533412 00000000	G 21433552 00000000
D 00000000 35533411	B 00000000 11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr El Hadj HABIB Ahmed

الدكتور الحاج حبيب أحمد

MEDECINE GENERALE
Ancien Médecin Chef SIAAP
13, Boulevard Abderrahman Skirji

الطب العام

13، شارع عبد الرحمن اسكيرج سطات

سلطات

Tél.: 05.23.40.12.12

الهاتف : 05.23.40.12.12

Settat, le

P 20 Nov (23)

سلطات، في

PHARMACIE BOUHADDA
Dr. Abdelhak BOUHADDA
71, Rue Haoud El Cong, SETTAT
Tél: 05.23.72.39 05 - SETTAT



Gélule
Voie orale

Relaxiur

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....	260 mg
équivalent en Magnésium	150 mg
Vitamine B6	1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....	650 mg
équivalent en Magnésium.....	300 mg
Vitamine B6	2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....	650 mg
équivalent en Magnésium.....	375 mg
Vitamine B6	2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRÉSENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIÉTÉS

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6. Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son action peut être modifiée par l'absence de magnésium.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

À conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAVI
Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAVI
Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAVI



146-147 2^e Tl Mellil - Casablanca

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J. OUAIDI Pharmacien Responsable

LOT : 220749
DLUO : 10/2025
87,00DH

1. اسم الدواء :

د-كير 25000 وحدة دولية، محلول للشرب، علبة من 4 أمبولات.

المادة الفعالة : كوليوكالسيفيرول

PPV:
LOT: 5630 DH
EXP: 06/05/B
06/2021

D-CURE® AMPULE
6 18001320080

- إقرأوا النشرة جيدا قبل استعمال هذا الدواء.
- استغلووا بهذه النشرة قد تتحاجنون لفرايتها أخرى.
- إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى لا تترددوا في أن تساؤلوا عنها الطبيب أو الصيدلي.
- لقد تم وصف هذا الدواء خصيصا لك لتعطوه لشخص آخر حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض لأن ذلك قد يضر به.
- إذا لاحظتم أيّة أعراض جانبية أو ظهرت أعراض أخرى لا توجد في هذه النشرة، أخبروا الطبيب أو الصيدلي (راجعوا الفقرة 7).
- استشروا الطبيب إذ لم تنتفعوا بما يجيئكم من تحسن عند استعمال هذا الدواء.

2. المكونات :

المادة الفعالة : كوليوكالسيفيرول.

السواغات والنكبات الأخرى :

أسيتات أاما توكسيفiro - خلاصة قشر البرتقال الملو - بولي كلسيبريل أوليات (E475) - زيت الزيتون المصقى لـ 1 ملتر (= أمبولة واحدة).

3. الفتاوى الصيدلانية والعلاجية :
الفيتامينات.

4. دواعي الاستعمال :

يستعمل د-كير في الحالات التالية :

نقص الفيتامين (د) : الكساح وأين العظام.

الوقاية من مرض هشاشة العظام.

عدم كفاية مصدر الفيتامين (د) : عند كبار السن (الملازمين للفراش أو قليلي الخروج)، في حالة انسداد الموارد، تليف الكبد، إزالة جزئية أو كلية للمعدة، وارتفاع نسبة الدهون في الوران.

علاج / أو الوقاية من نقص الفيتامين (د) : لواكية النمو والحمل والرضاعة، واستخدام مضادات التشنج.

الحالات المرضية الناجمة عن خلل في إفراز القدر الجبneh مجهولة المصدر أو الناتجة عن إجراء عملية أو في الحالات ذات المآلية من الإناث.

ملحنة : إن اتباع نظام غذائي متعدد ومتوافق يلطف دورا هاما في الوقاية من نقص الفيتامين (د).

5. الجرعتان :

كيفية طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم.

تؤخذ الجبneh بمقدارها أو ممزوجة مع بعض السوائل، كالحليب، أو عصير، أو حساء أو غيرها من الأطعمة.

مدة العلاج :

سواء كانت الوقاية أو العلاج فإن كل حالة من حالات نوعي الاستعمال مرتبطة بجرعة معينة.

على هذا الأساس، تم اختيار المخطط العلاجي التالي :

الجرعات الموصى بها : (أمبولة واحدة من د-كير 25000 وحدة دولية في الشهر).

الوقاية من هشاشة العظام، أمبولة واحدة في كل شهر أو شهرين، مع شمام كافية من الكالسيوم خلال هذه الفترة.

عند النساء خلال فترة الحمل والرضاعة، أمبولة واحدة كل شهرين.

الجرعات المتوضطة : (أمبولة واحدة من د-كير 25000 وحدة دولية في الأسبوع).

* الأشخاص الذين يستعملون مضادات التشنج، الفيتامينات والفيتامين والذين ظهرت لديهم التحاليل البيولوجية الحاجة لتلقي العلاج بالفيتامين (د).

* ثالث العظام الذي.

* حالات زيادة الدهون في الوران.

الجرعات القوية : (3) أمبولات من د-كير 25000 وحدة دولية في اليوم لمدة شهر إلى شهرين).

كساح الأطفال أو ثالث العظام الناتج عن سوء امتصاص الفيتامين (د).

* الحالات الناجمة عن خلل في إفراز القدر الجبneh مجهولة المصدرنا أو الناتجة عن المراجعة، أو عند الحالات ذات المآلية من الإناث. يجب أن يكون العلاج ملائما و

فرديا وفقا لعادات الكالسيوم في الماء والبول.

يجب شمام كفيات كافية من الكالسيوم خلال العلاج الأولي للكساح وثالث العظام و في حالة وجود خلل في إفراز القدرة الجبneh برقية.

ة الاستعمال :

تحس في هذه النشرة أو حسب إرشادات الطبيب. إذا لم تكونوا متاكدين استشروا الطبيب أو الصيدلي.

Dénomination du médicament :

Voltarène 25 et 50 mg, co...
Voltarène 12,5, 25 et 100 mg
Voltarène LP 100, comp...
Voltarène SR 75, comp...
Voltarène 75 mg/3 ml, Sol...

LOT : M0135
EXP : FEV 2022
PPV : 66,80 DH

0 ;



Voltarène®
30 comprimés enrobés
50 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur faire du mal, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables démontre grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que Voltarène et dans quel cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre /d'utiliser Voltarène ?

4. Comment prendre /utiliser Voltarène ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver Voltarène ?

• Qu'est-ce que Voltarène et dans quel cas est-il utilisé ?

Voltarène est un antirhumatismal non stéroïden ayant des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques.

L'utilisation de Voltarène soulage les symptômes de l'inflammation, comme la douleur et l'enflure, en bloquant la synthèse des molécules (prostaglandines) qui sont responsables de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre. Mais il ne peut pas éliminer les causes.

Voltarène peut être utilisé pour la prescription médicale dans les affections rhumatismales, par exemple arthroses, les inflammations et douleurs lors de crises de goutte, les orteils douloureux du dos et de la colonne cervicale, les rhumatismes des tissus mous, les inflammations et douleurs après une blessure (p.ex. entorse, élongation), les inflammations et douleurs après une intervention chirurgicale orthopédique ou dentaire, les douleurs et inflammations en gynécologie, les crises de migraine (suppositoires seulement), traitement complémentaire lors de diverses infections aiguës et douloureuses, en particulier au niveau des oreilles, et pour la gonorrhée.

Il ne faut pas employer Voltarène uniquement pour faire baisser la fièvre. Vous souffrez d'une maladie cardiaque ou avez des risques importants de maladie cardiaque, votre médecin réévaluera à intervalles réguliers la poursuite du traitement par Voltarène, en particulier si votre traitement dure plus de 4 semaines.

• Quelles sont les informations à connaître avant de prendre/d'utiliser Voltarène ?

Voltarène ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique à l'un de ses composants ou si vous avez déjà développé une détresse respiratoire ou des réactions de la peau de type allergique après la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments antirhumatismaux ou anti-douleurs, qu'on appelle aussi anti-inflammatoires non stéroïdiens; durant le dernier trimestre de la grossesse; en cas d'ulcères actifs de l'estomac ou de l'intestin grêle (ulcères duodénium), de saignements ou de perforations de l'estomac ou de l'intestin grêle ou encore de symptômes tels que sang dans les selles ou selles noires; en cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie de Crohn, coïte ulcéreuse et/ou maladie d'ulcération sévère de la fonction hépatique ou rénale; en cas de diminution sévère du débit cardiaque; lors du traitement des douleurs suivant une opération de by-pass cardiaque (utilisation de la circulation extracorporelle). Les suppositoires ne doivent pas être utilisés en cas de rectite (inflammation de l'extrémité distale de l'intestin) (avec saignements et écoulements).

Si l'une de ces situations s'applique à votre cas, veuillez le signaler à votre médecin et ne prenez pas Voltarène. Votre médecin décidera si ce médicament vous convient.

En raison de leur teneur élevée en principe actif, les comprimés à 50 mg et les suppositoires à 100 mg ne conviennent pas aux enfants de moins de 4 ans.

Si vous pensez être éventuellement allergique, demandez conseil à votre médecin.

le "moyen de l'insuline", excepté l'insuline, (anti-cancer), clospiprone ou taurochomos d'organe), triméthoprime (un médicament d'infections des voies urinaires), antibiotiques (un médicament utilisé pour le traitement d'infections fongiques) ou phénytoïne (un médicament utilisé pour le traitement des crises épileptiques).

Voltarène peut atténuer les signes d'une infection (par ex. les céphalées ou la température corporelle élevée) et compliquer ainsi la mise en évidence et le traitement convenable de l'infection.

Dans de très rares cas, Voltarène peut provoquer de graves réactions allergiques (par ex. une éruption) comme d'autres médicaments anti-inflammatoires. Informez donc immédiatement votre médecin si une telle réaction apparaît chez vous.

En cas de traitement prolongé par Voltarène (plus de 2-3 semaines), il est important de respecter les contrôles prévus par votre médecin. La prudence s'impose chez les patients âgés susceptibles de réagir de manière plus sensible aux effets de Voltarène et qui ne devront donc prendre, par mesure de précaution, que la dose minimale efficace.

Grossesse :
Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse, vous ne pouvez prendre du diclofénac qu'après en avoir discuté avec votre médecin. Voltarène ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Allaitement :
Voltarène ne doit pas être pris pendant la période d'allaitement sauf en cas d'autorisation explicite par votre médecin.

Comment prendre/utiliser Voltarène ?
C'est le médecin qui fixe individuellement la posologie et le mode d'administration en fonction de l'indication, de l'âge et de la gravité des troubles. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions du médecin. Ne dépassez pas la dose journalière recommandée ou la dose quotidienne prescrite par votre médecin.

Si vous utilisez Voltarène pendant plus de quelques semaines, vous devez consulter régulièrement votre médecin pour vérifier que vous ne présentez pas d'effets secondaires dont vous n'auriez pas remarqués.

Adultes : la dose journalière en comprimés ou en suppositoires est généralement de 100-150 mg. Si l'atteinte est moins grave ou lors de traitement prolongé, habituellement, répartie en 2-3 prises. Ne dépassez pas une dose maximale de 150 mg par jour.

Pour éviter les douleurs nocturnes et/ou la raidesse matinale, on peut aussi prendre 1 suppositoire à 100 mg pour la nuit et prendre 2 drages à 25 mg ou 2 drages à 50 mg pendant la journée.

En cas de rétention d'urine, commencez par une dose unique de 50-100 mg dès les premiers symptômes. Continuez avec 50 mg trois fois par jour au maximum, pendant quelques jours si nécessaire.

Prendre les drages de Voltarène avec beaucoup de liquide ou mâcher les comprimés. Elles ne doivent pas être partagées ou mordues. En cas de migraine, vous pouvez utiliser les suppositoires Voltarène, conformément à la prescription de votre médecin. En règle générale, l'application de suppositoire à 100 mg dès les premiers signes de la crise migraineuse est suffisante.

Vous devrez enlever la feuille et entourer le suppositoire et l'enfoncer ce dernier profondément dans le rectum (après avoir été à la selle). Si la douleur persiste, vous pouvez appliquer un second suppositoire de 50 mg.

Si vous deviez continuer le traitement les jours suivants, vous ne devrez pas dépasser une dose journalière de 150 mg.

Enfants : il n'y a pas de recommandation pour les enfants.