

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule : 1543

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : OUSSOUSS BRAHIM

Date de naissance : 1950

Adresse : Bd Abdellah Senhaji, Amal 3, N°1, CASA

Tél : 06 574 63 62 78 Total des frais engagés : 944 Dhs

Cadre réservé au Médecin

*Dr. CHOKAYRI PATRICK
MÉDECINE GÉNÉRALE - ECHOGRAPHIE
NUTRITION DIÉTÉTIQUE GYNECOLOGIE MÉDICALE
102 Bd Abdellah Senhaji Hay Attar
0522 80 33 57 CASA-INP 09104223*

Cachet du médecin :

Date de consultation : 28/11/2013

Nom et prénom du malade : OUSSOUSS BRAHIM Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exhaustivité des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 28 / 11 / 2013

Signature de l'adhérent(e) : Z. BRAHIM



*ND
125256*

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARMACIE DE CASABLANCA 60, Bd El Mahatta - Casablanca Tel: 05 22 80 09 70	28.11.23	744,20

092017300
ANAL

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr KAYRI - ZAOUAK Fatima
MÉDECINE GÉNÉRALE
ECHOGRAPHIE



Diplôme de la Faculté de Médecine
de Montpellier (France)
Nutrition - Diététique
Diabétologie - Gynécologie Médicale
Suivi de Grossesse
001697323000026

28 NOV 2023

الدكتورة شقيري زواق فاطمة
الطب العام
الفحص بالصدى
دبلوم كلية الطب بمونبولي فرنسا
التخصصية الحمية
أمراض السكري - أمراض النساء
متابعة الحمل
INP : 091042200

Oussouss. Bashir.

3A. - Droxol cp^o

1 cp x 3/j
La suite des repas.

94. - Mycoflex



05 22 80 33 37

102، شارع عبد الله الصنهاجي - حي الأمل مقابل المسجد - الدار البيضاء
102, Boulevard Abdellah Senhaji - Hay El Amal - Casablanca

40,80

Sp 2 Smoune

2 cpt + 3 bij u/wr

de repas

159,50 x 3

Lipreteoxy

10 (2,8)

1 cp le cuivre

(S.V)

31,30 x 3

Bifloric 200 g

1 cp le marron

(A'S)

744,20

صيدلية "سراير" تسبخت
PHARMACIE DE CASABLANCA
Bd El Mahatta - Casablanca
60, Bd El Mahatta
Tel: 05 22 80 09 70

Dr. CHOKAYRI FATIMA
MÉDECINE GÉNÉRALE - ECHOGRAPHIE
NUTRITION DIÉTÉTIQUE - CYSTOLOGIE MÉDICALE
102 Bd Abdellah Sennar, Hay Amlal
05 22 80 33 57 CASA-INP 091042200

DUOXOL® 500 mg/2 mg
Comprimé
Boîte de 20
Paracétamol - Thiocolchicoside

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Paracétamol.....	500 mg
Thiocolchicoside.....	2 mg
Excipients : q.s.p.....	1 comprimé

Excipients à effet notable : Amidon de blé, lactose.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgie,
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE MEDICAMENTS, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN AVANT D'EMBÂCHER TOUT AUTRE TRAITEMENT EN CÉDÉ. DUOXOL® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'*Examens paracliniques* :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique ou de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

DUOXOL 500mg/2mg **Joujoud**
Boîte de 20 comprimés

37,00 قرصة 20 ملليلتر

ER
EN.

ion.
age



MYDOFLEX 150 mg

Comprimés pelliculés

Tolpérison HCl

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYDOFLEX 150mg, boîte de 30 comprimés pelliculés

2. Composition du médicament :

Composition :

TOPLERISON (DCI)..... 150mg
Excipients : Acide citrique anhydre, povidone, cellulose microcristalline PH102, eau purifiée, cellulose microcristalline PH112, dioxyde de silicium colloïdale, Crospovidone, stéarate de magnésium, alcool polyvinyle partiellement hydrolysé, dioxyde de titane, polyéthylène de glycol, T...

3. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité

MYDOFLEX est un myorelaxant

4. Indications thérapeutiques

MYDOFLEX contient le principe actif chlorhydrate de tolpérison qui est un décontracturant musculaire. Il est utilisé, sur prescription médicale, dans le traitement des spasmes musculaires de la colonne et des membres, d'origine squelettique aussi bien que myopathique.

GTIN: 06118001260850

LOT: 4049

MFG: 09 2022

EXP.: 09 2025

PPV: 94Dhs00

5. Posologie

Chez l'adulte, une prise quotidienne de 1 comprimé (150 mg) matin et/ou soir.



SPASMOMEN 40 mg comprimés enrobés

Otilonium bromure

Catégorie pharmaco-thérapeutique

Catégorie pharmaco-thérapeutique : Anticholinergiques synthétiques, composés ammoniques quaternaires

Indications thérapeutiques

Colon irritable et manifestations spastico-dououreuses du canal entérique distal.

Contre-indications

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

Précautions d'emploi

A utiliser avec précaution chez les sujets ayant un glaucome, une hypertrophie prostatique, une sténose pylorique.

Interactions

Informez votre médecin ou votre pharmacien si avez pris récemment tout autre médicament. Ceci inclut les médicaments obtenus sans c

Précautions spéciales

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de pre

Bien qu'aucun effet embryotoxique, tératogène ou de mutagenèse n'ait été signalé chez les animaux, comme pour tous les médicaments sur NETTE pendant la grossesse ou pendant

*VIGNETTE

SPASMOMEN® 40mg

30 comprimés

PPV 40,80 DH

V136919/01

بِيرِيٌتِيرَاكِس® أَرْجِينِين 10 ملخ / 2,5 ملغ

حيّات ملبيّة

بِيرِانِدُورِيلِ أَرْجِينِين / إِنِدَابِامِيد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئنافها في حالة استعمالك.
- إذا كانت لديك أسلطة إضافية، فاسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً فلا يجوز إطلاقه على شخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تلحق بهضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني، هنا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المر��ل بها في هذه النشرة (أنظر إلى مقطع «عاهي الآثار الجانبية المحتملة»).

(disopyramide, amiodarone, ibutilide, dofetilide, digitaliques, sotalol, bretylium

رَبِطِيَّةِ

الدواء

دواء

دواء</

بِيرِيٌتِيرَاكِس® أَرْجِينِين 10 ملخ / 2,5 ملغ

حيّات ملبيّة

بِيرِانِدُورِيلِ أَرْجِينِين / إِنِدَابِامِيد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئنافها في حالة استعمالك.
- إذا كانت لديك أسلطة إضافية، فاسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً فلا يجوز إطلاقه على شخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تلحق بهضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني، هنا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المر��ل بها في هذه النشرة (أنظر إلى مقطع «عاهي الآثار الجانبية المحتملة»).

(disopyramide, amiodarone, ibutilide, dofetilide, digitaliques, sotalol, bretylium

رَبِطِيَّةِ

الدواء

دواء

دواء</

بِيرِيٌتِيرَاكِس® أَرْجِينِين 10 ملخ / 2,5 ملغ

حيّات ملبيّة

بِيرِانِدُورِيلِ أَرْجِينِين / إِنِدَابِامِيد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئنافها في حالة استعمالك.
- إذا كانت لديك أسلطة إضافية، فاسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً فلا يجوز إطلاقه على شخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تلحق بهضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني، هنا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المر��ل بها في هذه النشرة (أنظر إلى مقطع «عاهي الآثار الجانبية المحتملة»).

(disopyramide, amiodarone, ibutilide, dofetilide, digitaliques, sotalol, bretylium

رَبِطِيَّةِ

الدواء

دواء

دواء</

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés à libération contrôlée ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS UTILISE ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol qui agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la formation de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

LOT 230747
EXP 02/2027
PPV 31.30



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés à libération contrôlée ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS UTILISE ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol qui agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

LOT 230747
EXP 02/2027
PPV 31.30



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés à libération contrôlée ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS UTILISE ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol qui agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la formation de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

LOT 230747
EXP 02/2027
PPV 31.30

