

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Aéroport - Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

185640

## Déclaration de Maladie : N° S19-0048539

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

#### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 12402 Société : RAN

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : FERTAT ANINA Date de naissance : 10-05-84

Adresse :

Tél. : 0666 26 38 26 Total des frais engagés : ..... Dhs

#### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr. BENNIS Khalid**  
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE  
Avs. Mawrid 4 Année Bd Abdellah Ben  
et El Aïn 10 Casablanca 20  
Tél 05 22 98 41 16

Date de consultation : 18/10/2022

Nom et prénom du malade : Fertat Age: .....

Lien de parenté :

Lui-même  Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Anémie intermittente

Bleu d'Anémie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 06 DEC. 2023

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/10/23	Acte 01	300.00		
	Acte 02	420.00		

DR BENJAMIN KHARLOV  
HOPITAL DE MEDICO - CHIRURGICAL  
ROUTE 1029 Oujda Said - Casablanca  
Tél 05 22 21 60 07  
RC 361421

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE SARL AL Route 1029 Oujda Said - Casablanca Tél 05 22 21 60 07 RC 361421	18/10/23	1446.50

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
MONTANTS DES SOINS				
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES				
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
H	25533412	21433552		
D	00000000	00000000		
B	00000000	00000000		
G	35533411	11433553		
COEFFICIENT DES TRAVAUX				
MONTANTS DES SOINS				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				



[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## **Docteur BENNIS Khalid**

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplôme de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société française de Colo-Proctologie

Membre de la Société française d'Endoscopie Digestive

Casablanca, le ..... 18/10/23.

Facture Armeo

Facture = 400,-

Echos abdominaux  
163,-

*Dr. BENNIS Khalid*  
HEPATOGASTROENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE  
Av. Mawlid 4 Anfa Bd. Abdellatif Ben YOUSSEF  
Casablanca - Maroc  
Tél: 05.22.98.41.16  
Fax: 05.22.98.41.16  
E-mail: drbenniskhalid@yahoo.fr

Résidence " AL Mawlid 4 " Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual  
2ème Etage N° " A 24 " - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16  
Portable Cabinet : 06 65 04 25 69

DOCTEUR BENNIS KHALID

SPECIALISTE en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplômé d'Echographie Abdominale Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale Paris (St Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

## ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

18/10/2023

FERTAT Amina

### Clinique

BILAN DE DISCRETE ANEMIE (HB A 11,7 g) AVEC FERRININE NORMALE ET ABSENCE DE SAIGNEMENT DIGESTIF EXTERIORISE.CONSTIPATION INTERMITTENTE.SEROLOGIE H PYLORI POSITIVE.ATCD DE THYROIDITE HASCHIMOTO ET LICHEN CUIR CHEVELU.

### Examen

Foie de taille normale (FH= 11,5 cm), d'échostructure homogène et de contours réguliers.

Absence de syndrome de masse; absence de dilatation des VBIH.

TP de calibre normal ( 8 mm).VBP fine ( 2 mm).

Vésicule biliaire alithiasique, à paroi fine.

Pancréas normal et homogène dans son ensemble.

Absence d'adénopathies profondes.

Aspect moucheté du cadre colique et dilatation des anses gréliques pelviennes.

Rate homogène, de taille normale (grand axe de 7,5 cm).

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.Vessie et utérus normaux.Liseré pelvien hyperéchogène.

### Conclusion

ENCOMBREMENT STERCORAL COLIQUE ET FECALOME PELVIEN.

ANSES GRELIQUES PELVIENNES DILATEES EN FAVEUR DE GASTRO-ENTERITE.

Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE  
Fès Mawlid 4 Avenue Ed Abderrahman  
et Ed Anoual  
Tél 0524 58 41 16

## Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie  
 Proctologie Médicale et Chirurgicale  
 Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS  
 Diplôme d'Echographie Abdominale - Paris  
 Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris ( Saint Louis)  
 Membre de la Société Française de Colo-Proctologie  
 Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

## الدكتور بنيس خالد

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

خريج كلية الطب بأنجي وباريس


شهادة التشخيص بالمنظار الباطني (باريس)

شهادة التشخيص في أمراض و جراحة المخرج (باريس)

عضو الجمعية الفرنسية في أمراض المخرج والمصارين

عضو الجمعية الفرنسية في الكشف بالموجات فوق الصوتية.

Casablanca, le ..... 18/02/23 .....



إقامة المولد 4 - زاوية شارع عبد المؤمن وشارع أنوال - الطابق الثاني شقة رقم "24" - الدار البيضاء - الهاتف :

Résidence " AL Mawlid 4" Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual 2<sup>e</sup> Etage N° "A 24" - CASABLANCA - Tél.: 05 22 98 41 16

Portable Cabinet : 06 65 04 25 69

**METROZAL®**  
Suspension buvable  
Métronidazole

**ESENTATION :**

able 4 % - flacon de 120 ml avec cuillère mesure de 5 ml.

**suspension buvable**

enzoate ..... 4 g/100 ml

et notoire : Alcool, saccharinate de sodium, saccharose, nipaesters, propylène glycol.

il : 0,6 %

le est un antibiotique dérivé de la famille des nitro-5-imidazolés doué d'une double activité :  
issant sur les bactéries anaérobies strictes.

l'égard de trichomonas vaginalis, giardia intestinalis et entamoeba histolytica.

infections dues aux germes définis comme sensibles :

nitales :

ues :

infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles ;

curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles.

mpre des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

idazolés ou antécédent d'allergie au métronidazole, ou à l'un des autres constituants de METROZAL®.

**D'EMPLOI :**

à la prescription médicale.

Métronidazole 4%  
Suspension buvable 120ml

**METROZAL®**

P.P.V. : 24,50 DH



# METROZAL® 4 %

Suspension buvable, flacon de 120 ml  
Métronidazole benzoate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

6



P.P.V. : 24,50 DH

Métronidazole 4%  
Suspension buvable 120ml

**METROZAL®**



ion buvable et dans quels cas  
onnaître avant de prendre  
sion buvable ?  
els ?  
sion buvable ?  
ations.

## QUELLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

nille des nitro-5-imidazolés - code ATC :  
ertaines infections à germes sensibles

## AVANT DE PRENDRE METROZAL® 4 %

icament de la famille des imidazolés

• Ce médicament contient de faibles quantités d'éthanol (alcool) inférieures à 100 mg par cuillère-mesure.

• Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des symptômes semblables à ceux provoqués par l'alcool.

## 3. COMMENT PRENDRE METROZAL® 4 %, suspension buvable ?

*La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique.*

A titre indicatif, la posologie usuelle est :

- chez l'adulte : de 0,50 g/jour à 1,5 g/jour,
- chez l'enfant : 250 mg/jour à 20-40 mg/kg/jour.

Dans certains cas, votre partenaire doit être impérativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Voie orale.

## Fréquence d'administration :

2 à 3 fois par jour, selon les indications.

## Durée du traitement :

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Cas particuliers : la durée de traitement de la lambliase (infection due à un parasite) est de 5 jours; la durée de traitement de l'amibiase (infection due à un parasite) et de certaines vaginites (infection du vagin) est de 7 jours; celle de la trichomonase (infection due à un parasite) est de 10 jours.

*Si vous avez pris plus de METROZAL® 4 %, suspension buvable que vous n'auriez dû :*

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de vomissements, difficulté à coordonner les mouvements, désorientation, consultez votre médecin. Il peut être amené à vous prescrire un traitement.

*Si vous oubliez de prendre METROZAL® 4 %, suspension buvable :* Sans objet.

*Si vous arrêtez de prendre METROZAL® 4 %, suspension buvable :* Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### Manifestations digestives :

- troubles digestifs non graves : douleurs au niveau de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhée;
- inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, troubles du goût, perte d'appétit;
- pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l'arrêt du traitement.
- décoloration ou modification de l'aspect de la langue (peut être provoquée par le

- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
  - Comment prendre FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
  - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  - Comment conserver FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
  - Contenu de l'emballage et autres informations.
- 1. QU'EST-CE QUE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : LAXATIF OSMOTIQUE - code ATC : A06AD15 (A : appareil digestif et métabolisme).

FORLAX contient la substance active macrogol 4000 et appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques. Il permet d'augmenter la quantité d'eau dans les matières fécales, ce qui aide à résoudre les problèmes liés à un transit intestinal ralenti. FORLAX n'est pas absorbé dans la circulation sanguine et n'est pas modifié dans l'organisme. FORLAX est indiqué pour le traitement de la constipation chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans.

Ce médicament se présente sous forme d'une poudre qu'il faut dissoudre dans un verre d'eau (au minimum 50 ml) et boire. Son effet se manifeste généralement en 24h à 48h.

**prendre Forlax et contactez immédiatement votre médecin.**

Dans la mesure où ce médicament peut quelquefois engendrer une diarrhée, contactez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si

- Vous avez une fonction rénale ou hépatique altérée,
- Vous prenez des diurétiques (médicaments augmentant l'élimination urinaire) ou vous êtes âgé, car vous êtes susceptible d'avoir une diminution de vos taux sanguins de sodium (sel) et de potassium.

En cas de trouble de la déglutition, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FORLAX.

#### **Autres médicaments et FORLAX**

Il est possible que l'absorption d'autres médicaments puisse être transitoirement réduite lors de l'utilisation de FORLAX, en particulier des médicaments ayant un index thérapeutique étroit ou une demi-vie courte comme la digoxine, les antiépileptiques, les coumarines et les immunosuppresseurs, entraînant une diminution de l'efficacité.

Si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse et allaitement**

FORLAX peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet

Macrogol 4000

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

toujours prendre ce médicament en suivant les informations fournies dans cette notice et votre pharmacien.

cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou question.

ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Levez vous adresser à votre médecin si vous n'avez aucune amélioration ou si vous vous sentez mal.

atient cette notice ?

est-ce que FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable acheté et dans quels cas est-il utilisé ?



# forlax<sup>®</sup>

10g  
Macrogol 4000

## Enfant de plus de 8 ans/Adulte

à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FORLAX.

Des cas de réactions allergiques se manifestant par une éruption sur la peau et un gonflement du visage ou de la gorge (angio-oedème) ont été rapportés chez l'adulte après la prise de médicaments contenant du macrogol (polyéthylène glycol). Des cas isolés de manifestations allergiques sévères ayant conduit à des pertes de connaissance, collapsus, ou difficultés respiratoires et sensations de malaise général ont été rapportés.

Si vous présentez un de ces symptômes, arrêtez de prendre ce médicament et contactez immédiatement

# Veca®

Solifénacine Succinate

Comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

En cas d'effets indésirables ou d'interactions avec d'autres médicaments, interrogez votre médecin ou le personnellement prescrit. Ne le sonnes. Il pourrait leur être nocif, même si les sont identiques aux vôtres.

Conque effet indésirable, parlez-en à l'armaciend. Ceci s'applique aussi à tout ce qui n'a pas été mentionné dans cette notice.

LOT : 3946  
PER : 05 - 26  
P.P.V : 108 DH 00

Difficultés  
à la

comprimé pelliculé et dans quels cas est-il

difficulté ?  
ations à connaître avant de prendre

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

**Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.

• Des médicaments tels que le kétoconazole, le ritonavir, le neflnavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.

- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

**Très fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)**

- Sécheresse de la bouche.

**Fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)**

- Vision trouble.

• Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitation, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

**Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)**

- Infestation urinaire, infection de la vessie.
- Somnolence.
- Perturbation du goût (dysgueuse).
- Sécheresse (irritation) des yeux.
- Sécheresse du nez.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Sécheresse de la gorge.
- Sécheresse de la peau.
- Difficultés pour uriner.
- Fatigue.

# Veca®

Solifénacine Succinate

Comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

En cas d'effets indésirables ou d'autre question, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Le personnel prescrit. Ne le sonnes. Il pourrait leur être nocif, même si sont identiques aux vôtres.

Conseil effet indésirable, parlez-en à pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout ce qui n'a pas été mentionné dans cette notice.

LOT : 3946  
PER : 05 - 26  
P.P.V : 108 DH 00

Difficultés à uriner ?

comprimé pelliculé et dans quels cas est-il

difficulté à connaître avant de prendre

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

**Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.

• Des médicaments tels que le kétoconazole, le ritonavir, le neflnavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.

- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

**Très fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)**

- Sécheresse de la bouche.
- Vision trouble.
- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitation, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

**Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)**

- Infection urinaire, infection de la vessie.
- Somnolence.
- Perturbation du goût (dysgueuse).
- Sécheresse (irritation) des yeux.
- Sécheresse du nez.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Sécheresse de la gorge.
- Sécheresse de la peau.
- Difficultés pour uriner.
- Fatigue.

# VeCA®

Solifénacine Succinate

Comprimé pelliculé

LOT : 3946  
PER : 05 - 26  
P.P.V : 108 DH 00

Difficile ?

comprimé pelliculé et dans quels cas est-il  
difficile à connaître avant de prendre

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

le personnellement prescrit. Ne le  
soznes. Il pourrait leur être nocif, même  
siie sont identiques aux vôtres.

conque effet indésirable, parlez-en à  
larmacien. Ceci s'applique aussi à tout  
ce qui n'est pas mentionné dans cette notice.

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

## Autres médicaments et VECA®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre

médecin si vous prenez :

• D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.

• Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de VECA®, comprimé pelliculé.

• Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. VECA®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.

• Des médicaments tels que le kétoconazole, le ritonavir, le nelfinavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.

• Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.

• Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

VECA®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

**Très fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)**

- Sécheresse de la bouche.

**Fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)**

- Vision trouble.

• Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitation, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

**Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)**

- Infection urinaire, infection de la vessie.

- Somnolence.

- Perturbation du goût (dysgueuse).

- Sécheresse (irritation) des yeux.

- Sécheresse du nez.

- Reflux gastro-œsophagien.

- Sécheresse de la gorge.

- Sécheresse de la peau.

- Difficultés pour uriner.

- Fatigue.

