

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 069268

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5169 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : HAMRANE TAIBI

Date de naissance : 11/11/1956

Adresse : BU. LAQUEN ITTISAL N°10 C.D. CISA

Tél. : 0603392662 Total des frais engagés : 1143-0 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Mohamed Soudi
Spécialiste: Hépatologie - Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya Angle Bd Abdelmoumen
Etage, Imm « Fiat - Jeep » - Casablanca - Maroc
Tél : 0522 23 78 83 - Fax : 0522 25 99 8
aoumed.doc@gmail.com

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Double digestif 1 R00

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 17 DEC 2023



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin
11-12-23-06	2		3500	Dr. Mohamed El Moutaouakil Spécialiste en Gastro-Entéro-Proctologie Médico-Chirurgicale ENDOSCOPIE - ECHOGAPHR 32, Rue Soumaya Angle Bd Abdelmou Etage, Imm « Fiat - Jeep » - Casablanca - 0522 23 78 83 - Tél / Fax: 0522 25 laouimed@gmail.com

Cachet et signature du Médecin
 pédiatre, pédiatre des Adoles -
 Proctologie Médico - Gastro - Entérologu
 ENDOSCOPIE - ECHOGRAFIE
 32, Rue Soumaya Angle Bd Abdelmoummer
 Etage, Imm « Fiat - Jeep » - Casablanca - Mar
 0522 23 78 83 - Tél / Fax: 0522 25 00 0
 - laouimed - mail

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Farmaceutique	Date	Montant de la Facture
	11/12/23	793.80

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

PHARMACIE ADIBA
84, Bd. Reda Gdira
Ben M'sik - Casablanca
Tél : 05 22 37 39 36



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
					COEFFICIENT DES TRAVAUX	
					MONTANTS DES SOINS	
					DEBUT D'EXECUTION	
					FIN D'EXECUTION	

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

		H	
	25533412		21433552
	00000000		00000000
D			G
	00000000		00000000
	35533411		11433553
		B	

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

A diagram of a circular arch bridge. The arch is divided into segments, numbered 1 through 8 on both the left and right sides, starting from the top and moving downwards. A vertical axis labeled 'H' is at the top, and a horizontal axis labeled 'D' and 'G' is at the base. The bottom of the arch is labeled 'B'.

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR MOHAMED SLAOU

Spécialiste en Hépatologie - Gastro - Entérologie



الدكتور محمد السلاوي

إختصاصي في أمراض المعدة و الأمعاء و الكبد و البواسير

Casablanca, le

11 DEC. 2023

الدار البيضاء، في

PHARMACIE ADIBA
181, Bd. Reda Gdira
Ben M'sik - Casablanca
Tél : 05 22 37 39 36

32.70
UBIADON 2004



19.50
DISPANSOL 805



12360x6

INDOXIM 404



20/1/2023

793.80

Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste: Hépatologie - Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya Angle Bd Abdelmoumen
2^e Etage, Imm. « Fiat - Jeep » - Casablanca - Maroc
Tél: 0522 23 78 83 - Tél / Fax: 0522 25 99 87
slaouimed.doc@gmail.com

82, rue Soumaya, angle boulevard Abdelmoumen - 2^e étage, imm. « Fiat - Jeep » - quartier Palmiers - Casablanca, Maroc

Tél. : 05 22 23 78 83 | 06 98 97 17 18 • Tel. Fax : 05 22 25 99 87 • Urgence : slaouimed.doc@gmail.com | Clinique Longchamps

Arrêt TRAM : Ligne 1 WAFASALAF محطة طرامواي وفا سلف عبد المومن

OL[®]

inol dihyd
bles et or

avant de
la relire.
un doute

crit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même
être nocif.

vous remarquez un effet indésirable non mentionné
votre pharmacien.

tient 80 mg de substance active, le Phloroglucinol

2,25 mg.

(K90), Crospovidone (Polyplasdone XL 10), Cellulose
um.

hydraté.

S :

és à 80 mg, sous plaquettes thermoformées

et métabolisme :

r ?

es douleurs sp

CAMENT ?

en cas d'allergie au Phloroglucinol.

ment est contre-indiqué en cas de phénylcétonurie

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

IS D'EMPLOI

res, contactez votre médecin avant de prendre ce

les patients présentant une intolérance au galactose,
malabsorption du glucose ou du galactose (maladie

s majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

ES INTERACTIONS

IS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A
MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

au cours de la grossesse que si nécessaire.

chez la femme qui allaite.

macien avant de prendre tout médicament.

ES

Dispainol[®] 80mg
10 comprimés dispersibles





comprimé pelliculé
voie orale

Ubipro

Ciprofloxacin 250mg

LOT: M1091
PER: 07/2025
PPU: 32,70BH

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament

llement prescrit. Ne le donnez jamais à
ômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
e ou si vous remarquez un effet indésirable
n à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ubiprox 250mg
10 Comprimés
Deva Pharmaceutique



6 118000 410218

(250 mg)
(500 mg)
done, Magnésium stéarate, Silice colloïdale

d'activité :
ne - code ATC : J01MA02
urloxacine.

appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

3. Indications thérapeutiques

Chez l'adulte

Ubiprox est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus
- Infections urinaires
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales
- Infections de la peau et des tissus mous
- Infections des os et des articulations
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*
- Exposition à la maladie du charbon, Ubiprox peut être utilisé dans le traitement des patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément d'Ubiprox.

Chez l'enfant et l'adolescent

Ubiprox est utilisé chez l'enfant et l'adolescent sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite)
- Exposition à la maladie du charbon.

Ubiprox peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

4. Posologie

Mode d'administration.

Voie orale uniquement.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité d'Ubiprox vous devez prendre, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Ceci dépendra du type d'infection et de sa sévérité.

Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament à prendre devra éventuellement être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection sévère. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des doutes sur le nombre de comprimés d'Ubiprox à prendre ou la façon de les prendre.

- Avalez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés car ils ont un mauvais goût.
 - Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.
 - Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas. Le calcium présent dans un repas n'a pas d'incidence grave sur l'effet du médicament. Cependant, ne prenez pas les comprimés d'Ubiprox avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou des jus de fruit enrichis (par ex. jus d'orange enrichi en calcium).
- Pensez à boire abondamment pendant le traitement par ce médicament.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais Ubiprox, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique : Interaction)

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- nausées, diarrhée
- douleurs des articulations chez l'enfant.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- surinfections fongiques (dus à des champignons)
- concentration élevée des éosinophiles (une sorte de globules blancs)
- diminution de l'appétit
- hyperactivité, agitation
- maux de tête, étourdissements, troubles du sommeil, troubles du goût
- vomissements, douleurs abdominales, problèmes digestifs tels que des problèmes d'estomac (indigestion/brûlures d'estomac) ou flatulences
- augmentation de la quantité de certaines substances dans le sang (transaminases et/ou bilirubine)
- éruption cutanée, démangeaisons, urticaire

stéaryle sodique, sphères de sucre (saccharose et amidon de maïs), talc, dioxyde de titane (E171), citrate de triéthyle.

- Comment se présente INexium et contenu de l'emballage extérieur

- Nexium 20 mg, comprimé gastro-résistant se présente sous forme de comprimé rose pâle, gravé A/EH sur une face et 20 mg sur l'autre face.
- Nexium 40 mg, comprimé gastro-résistant se présente sous forme de comprimé rose, gravé A/EI sur une face et 40 mg sur l'autre face.
- Vos comprimés seront disponibles en plaquettes thermoformées contenant :
20 mg, 40 mg ; Plaquettes thermoformées dans des boîtes de 1

22 rue zoubair briou al aouam roche
noires casablanca
INEXTUM

Liste II

- N° AMM Inexium 20mg : 640/15 DMP/21/NRC

N° AMM Inexium 40mg : 641/15 DMP/21/NBC

Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché

- AstraZeneca UK Limited

600 Capability Green

- Luton. LU1 3LU

Royaume Uni

- Site de fabrication, de conditionnement et de libération :

AstraZeneca AF

- Gärtunavägen

SF-151 85 Södertälje

- Svédsk

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est décembre 2021

- © AstraZeneca 2021

Nexium est une marque déposée du groupe AstraZeneca

- Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de la santé :

Administration par sonde gastrique

1. Placer le comprimé dans une seringue adaptée, remplir la seringue avec environ 25 ml d'eau et laisser approximativement 5 ml d'air. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire pour disperser le comprimé afin de prévenir l'obstruction de la sonde.
2. Remuer immédiatement la seringue pendant environ 2 minutes pour disperser le comprimé.
3. Maintenir la seringue embout en l'air et vérifier que l'embout n'est pas obstrué par la dispersion.
4. Raccorder la sonde sur la seringue en maintenant la position décrite ci-dessus.
5. Agiter la seringue, puis la positionner embout vers le bas. Injecter immédiatement 5 à 10 ml dans la sonde. Puis repositionner la seringue embout vers le haut après l'injection et l'agiter (la seringue doit être maintenue position embout vers le haut afin d'empêcher l'obstruction de l'embout).
6. Retourner la seringue embout vers le bas et injecter immédiatement à nouveau 5 à 10 ml dans la sonde. Répéter cette opération jusqu'à ce que la seringue soit vide.
7. Remplir de nouveau la seringue avec 25 ml d'eau et 5 ml d'air et répéter l'étape 5, si nécessaire, afin de ne laisser aucun résidu dans la seringue. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est décembre 2021

© AstraZeneca 2021

Inexium est une marque déposée du groupe AstraZeneca

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer).
 Citalopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression).
 Diazepam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire).
 "épilepsie". Si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 à modifier le sang, tel que la warfarine. Une surveillance par votre médecin le début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 tement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque ; par un apport sanguin insuffisant).
 gigestion ou de brûlures d'estomac).
 ables cardiaques).
 ilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) - si e méthotrexate, votre médecin peut interrompre temporairement votre

- iacrimus (transplantation d'organes).
- Riamprine (utilisée dans le traitement de la tuberculose).
- Milipertus (*Hypericum perforatum*) (utilise pour traiter la dépression).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine en association avec l'inezum pour le traitement des ulcères dus à une infection par *Helicobacter pylori*, il est très important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

INexium avec des aliments et boissons
Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou à jeun.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre inénum pendant cette période. On ne sait pas si inénum passe dans le lait maternel. Par conséquent, inénum pendant cette période.

vous ne devez pas prendre Nexium si vous allaitez.

Néanmoins, il n'est pas susceptible de nuire à votre aptitude de conduire des véhicules et d'utiliser des machines. Cependant, des effets indésirables tels que des étourdissements et des troubles de la vision peuvent survenir peu fréquemment ou rarement (voir rubrique 4). Si vous présentez ces symptômes, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser de machines.

l'Inexium contient du saccharose
l'Inexium est constitué de sphères de sucre contenant du saccharose, un type de sucre. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Teneur en sodium
Nexium contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Nexium

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier si vous le prenez depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Le médecin vous indiquera le nombre de comprimés à prendre et la durée du traitement. Cela dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre foie.

- Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Adultes âgés de 18 ans et plus

Traitement des brûlures d'estomac causées par le reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) :

- Fatigue musculaire.
 - Troubles hépatique grave.
 - Gonflement des sens chez l'homme.
- Fréquence indétectable (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)**
- Si vous prenez Nexium pendant plus de trois mois, le taux de magnésium dans votre sang pourrait diminuer. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des étourdissements ou une augmentation de la fréquence cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des analyses de sang régulières pour surveiller votre taux de magnésium.
 - Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées).
 - Eruption cutanée, pouvant être accompagnée de douleurs articulaires.
- Des très rares cas, Nexium peut affecter les globules blancs, entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre associée à un état général **sévérement** affaibli, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale, telle que des douleurs dans le cou, la gorge ou la bouche, ou des difficultés à uriner. Votre médecin pourra vous prescrire une analyse de sang, afin d'exclure un déficit en globules blancs (agranulocytose).
- Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.
- Déclaration des effets secondaires**
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une réaction adverse relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7j/7 via l'URL : <https://contactaazmedical.astrazeneca.com>
- Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre de Pharmacovigilance - Adresse email: capm@capm-sante.ma
- En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentiez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une plainte relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7j/7 via l'URL : <https://contactmedical.astrazeneca.com>

Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :
Centre de Pharmacovigilance : Adresse email: capm@caom-sante.ma

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver INexium

- Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur le flacon après
EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
A conserver dans l'emballage d'origine (plaquette) ou conserver le flacon soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient INEXIUM

- La substance active est l'ésoméprazole. Inexium, comprimés gastro-résistants est disponible en deux dosages contenant 20 mg ou 40 mg d'ésoméprazole (sous forme d'ésoméprazole magnésique trihydraté).
- Les autres composants sont : monostéarate de glycérol (40-55), hydroxypropylcellulose, hypromellose,

oxyde de fer (rouge-brun et jaune pour le 20 mg et rouge-brun pour le 40 mg) (E172), stéarate de magnésium, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion à 30 pour cent),

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer).
 Citalopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression).
 Diazepam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire).
 "épilepsie". Si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 à modifier le sang, tel que la warfarine. Une surveillance par votre médecin le début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 tement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque ; par un apport sanguin insuffisant).
 gigestion ou de brûlures d'estomac).
 ables cardiaques).
 ilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) - si e méthotrexate, votre médecin peut interrompre temporairement votre

- iacrimus (transplantation d'organes).
- Riamprine (utilisée dans le traitement de la tuberculose).
- Milipertus (*Hypericum perforatum*) (utilisé pour traiter la dépression).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine en association avec l'inezum pour le traitement des ulcères dus à une infection par *Helicobacter pylori*, il est très important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

INexium avec des aliments et boissons
Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou à jeun.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre inénum pendant cette période. On ne sait pas si inénum passe dans le lait maternel. Par conséquent, inénum pendant cette période. On ne sait pas si inénum passe dans le lait maternel. Par conséquent,

vous ne devez pas prendre Nexium si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Néanmoins, il n'est pas susceptible de nuire à votre aptitude de conduire des véhicules et d'utiliser des machines. Cependant, des effets indésirables tels que des étourdissements et des troubles de la vision peuvent survenir peu fréquemment ou rarement (voir rubrique 4). Si vous présentez ces symptômes, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser de machines.

l'Inexium contient du saccharose
l'Inexium est constitué de sphères de sucre contenant du saccharose, un type de sucre. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Teneur en sodium
Nexium contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Nexium

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier si vous le prenez depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Le médecin vous indiquera le nombre de comprimés à prendre et la durée du traitement. Cela dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre foie.

- Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Adultes âgés de 18 ans et plus

Traitement des brûlures d'estomac causées par le reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) :

- Fatigue musculaire.
 - Troubles hépatique grave.
 - Gonflement des sens chez l'homme.
- Fréquence indétectable (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)**
- Si vous prenez Nexium pendant plus de trois mois, le taux de magnésium dans votre sang pourrait diminuer. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des étourdissements ou une augmentation de la fréquence cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des analyses de sang régulières pour surveiller votre taux de magnésium.
 - Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées).
 - Eruption cutanée, pouvant être accompagnée de douleurs articulaires.
- De très rares cas, Nexium peut affecter les globules blancs, entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre associée à un état général **sévérement** affaibli, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale, telle que des douleurs dans le cou, la gorge ou la bouche, ou des difficultés à uriner. Votre médecin pourra vous prescrire une analyse de sang, afin d'exclure un déficit en globules blancs (agranulocytose).
- Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.
- Déclaration des effets secondaires**
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une réaction adverse relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7j/7 via l'URL : <https://contactaazmedical.astrazeneca.com>
- Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre de Pharmacovigilance - Adresse email: capm@capm-sante.ma
- En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une plainte relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7/7 via l'URL : <https://contactarmedical.astrazeneca.com>

Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :
Centre de Pharmacovigilance : Adresse email: capm@capm-sante.ma

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver INexium

- Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.
N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur le flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
A conserver dans l'emballage d'origine (plaquette) ou conserver le flacon soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient INexium

- La substance active est l'ésoméprazole. In Nexium, comprimés gastro-résistants est disponible en deux dosages contenant 20 mg ou 40 mg d'ésoméprazole (sous forme d'ésoméprazole magnésique trihydraté).
- Les autres composants sont : monostéarate de glycérol (40-55), hydroxypropylcellulose, hypromellose,

oxyde de fer (rouge-brun et jaune pour le 20 mg et rouge-brun pour le 40 mg) (E172), stéarate de magnésium, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion à 30 pour cent),

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer).
 Citalopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression).
 Diazepam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire).
 "épilepsie". Si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 à modifier le sang, tel que la warfarine. Une surveillance par votre médecin le début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 tement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque ; par un apport sanguin insuffisant).
 gigestion ou de brûlures d'estomac).
 ables cardiaques).
 ilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) - si e méthotrexate, votre médecin peut interrompre temporairement votre

- iacrimus (transplantation d'organes).
- Riamprine (utilisée dans le traitement de la tuberculose).
- Milperitus (*Hypericum perforatum*) (utilisé pour traiter la dépression).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine en association avec l'ineuxum pour le traitement des ulcères dus à une infection par *Helicobacter pylori*, il est très important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

INexium avec des aliments et boissons
Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou à jeun.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre inénum pendant cette période. On ne sait pas si inénum passe dans le lait maternel. Par conséquent, inénum pendant cette période.

vous ne devez pas prendre Nexium si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Néanmoins, il n'est pas susceptible de nuire à votre aptitude de conduire des véhicules et d'utiliser des machines. Cependant, des effets indésirables tels que des étourdissements et des troubles de la vision peuvent survenir peu fréquemment ou rarement (voir rubrique 4). Si vous présentez ces symptômes, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser de machines.

l'Inexium contient du saccharose
l'Inexium est constitué de sphères de sucre contenant du saccharose, un type de sucre. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Teneur en sodium
Nexium contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Nexium

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier si vous le prenez depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Le médecin vous indiquera le nombre de comprimés à prendre et la durée du traitement. Cela dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre foie.

- Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Adultes âgés de 18 ans et plus

Traitement des brûlures d'estomac causées par le reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) :

- Fatigue musculaire.
 - Trouble hépatique grave.
 - Gonflement des sens chez l'homme.
- Fréquence indétectable (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)**
- Si vous prenez Nexium pendant plus de trois mois, le taux de magnésium dans votre sang pourrait diminuer. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des étourdissements ou une augmentation de la fréquence cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des analyses de sang régulières pour surveiller votre taux de magnésium.
 - Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées)
 - Eruption cutanée, pouvant être accompagnée de douleurs articulaires.
- De très rares cas, Nexium peut affecter les globules blancs : entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre associée à un état général **sévérement** affaibli, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale, telle que des douleurs dans le cou, la gorge ou la bouche, ou des difficultés à uriner. Votre médecin pourra vous prescrire une analyse de sang, afin d'exclure un déficit en globules blancs (agranulocytose).
- Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.
- Déclaration des effets secondaires**
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une réaction adverse relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7/7 via l'URL : <https://contactmedical.astrazeneca.com>
- Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre de Pharmacovigilance - Adresse email : capm@capm-sante.ma
- En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentiez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une plainte relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7j/7 via l'URL : <https://contactadmedical.astrazeneca.com>

Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :
Centre de Pharmacovigilance : Adresse email: capm@caqm-sante.ma

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver INexium

- Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur le flacon après
EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
A conserver dans l'emballage d'origine (plaquette) ou conserver le flacon soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient INEXIUM

- La substance active est l'ésoméprazole. Inexium, comprimés gastro-résistants en deux dosages contenant 20 mg ou 40 mg d'ésoméprazole (sous forme d'ésoméprazole magnésique trihydraté).
- Les autres composants sont : monostéarate de glycérol (40-55), hydroxypropylcellulose, hypromellose,

oxyde de fer (rouge-brun et jaune pour le 20 mg et rouge-brun pour le 40 mg) (E172), stéarate de magnésium, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion à 30 pour cent),

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer).
 Citalopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression).
 Diazepam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire).
 "épilepsie". Si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 à modifier le sang, tel que la warfarine. Une surveillance par votre médecin le début et à l'arrêt du traitement par Nexium.
 tement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque ; par un apport sanguin insuffisant).
 gigestion ou de brûlures d'estomac).
 ables cardiaques).
 ilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) - si e méthotrexate, votre médecin peut interrompre temporairement votre

- iacromus (transplantation d'organes).
- Riamprine (utilisée dans le traitement de la tuberculose).
- Milipertus (*Hypericum perforatum*) (utilisé pour traiter la dépression).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine en association avec l'ineuxum pour le traitement des ulcères dus à une infection par *Helicobacter pylori*, il est très important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

INexium avec des aliments et boissons
Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou à jeun.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre inénum pendant cette période. On ne sait pas si inénum passe dans le lait maternel. Par conséquent, inénum pendant cette période.

vous ne devez pas prendre Nexium si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Néanmoins, il n'est pas susceptible de nuire à votre aptitude de conduire des véhicules et d'utiliser des machines. Cependant, des effets indésirables tels que des étourdissements et des troubles de la vision peuvent survenir peu fréquemment ou rarement (voir rubrique 4). Si vous présentez ces symptômes, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser de machines.

l'Inexium contient du saccharose
l'Inexium est constitué de sphères de sucre contenant du saccharose, un type de sucre. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Teneur en sodium
Nexium contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Nexium

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier si vous le prenez depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Le médecin vous indiquera le nombre de comprimés à prendre et la durée du traitement. Cela dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre foie.

• Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Adultes âgés de 18 ans et plus

Traitement des brûlures d'estomac causées par le reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) :

- Fatigue musculaire.
 - Troubles hépatique grave.
 - Gonflement des sens chez l'homme.
- Fréquence indétectable (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)**
- Si vous prenez Nexium pendant plus de trois mois, le taux de magnésium dans votre sang pourrait diminuer. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des étourdissements ou une augmentation de la fréquence cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des analyses de sang régulières pour surveiller votre taux de magnésium.
 - Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées).
 - Eruption cutanée, pouvant être accompagnée de douleurs articulaires.
- De très rares cas, Nexium peut affecter les globules blancs, entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre associée à un état général **sévérement** affaibli, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale, telle que des douleurs dans le cou, la gorge ou la bouche, ou des difficultés à uriner. Votre médecin pourra vous prescrire une analyse de sang, afin d'exclure un déficit en globules blancs (agranulocytose).
- Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.
- Déclaration des effets secondaires**
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une réaction adverse relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7j/7 via l'URL : <https://contactaazmedical.astrazeneca.com>
- Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre de Pharmacovigilance - Adresse email: capm@capm-sante.ma
- En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Pour toute demande d'information médicale, Déclaration d'événement indésirable ou Déclaration d'une plainte relative à la qualité liée aux produits AstraZeneca, veuillez renseigner le formulaire de déclaration accessible 24h/24 et 7/7 via l'URL : <https://contactmedicalmedial.astrazeneca.com>

Vous devez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre de Pharmacovigilance . Adresse email: capom@capom-santita.ma

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver INexium

- Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur le flacon après
EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
A conserver dans l'emballage d'origine (plaquette) ou conserver le flacon soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

La substance active est l'ésoméprazole. Nexium, comprimés gastro-résistants est disponible en deux dosages contenant 20 mg ou 40 mg d'ésoméprazole (sous forme d'ésoméprazole magnésique trihydrate).

Les autres composants sont : monostéarate de glycérol (40-55), hydroxypropylcellulose, hypromellose,

oxyde de fer (rouge-brun et jaune pour le 20 mg et rouge-brun pour le 40 mg) (E172), stéarate de magnésium, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion à 30 pour cent),

cellulose microcristalline paraffine synthétique macronol nolvondate 80 crotononidone fumarate de