

COMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Sous générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être correctement renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-001618

186396

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 2606 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TAYA NAIMA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. OUIZIE Mohamed Amine
Chirurgie / Traumat. Orthopédiste
Rue / Al Qods, Angle Ben Al Qods
el D. Al / 1er Etg. Al Chock - Casa
Tél. : 05 22 27 22 57 / 0661 67 14 41*

15 NOV. 2023

Daté de consultation :

Nom et prénom du malade : TAYA NAIMA Age:

Lien de parenté : Même sexe Conjoint Enfant

Nature de la maladie : 12 NOV. 2023

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : ACCÈS

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent[e] :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15 Nov. 2023	ez		250 DH	OUZIF Mohamed Orthodontist Orthodontien Traumatolog Res Ryad Al Oods Aree sd Hafsa 1er Etg. Alh Chock - Casab 15/11/23 51 23 57 11/11/23 14 14 14

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE MAMOUNIA Bassatine Boussoufa Loubna Loubna docteur en Pharmacie 15/11/23	15/11/23	254,00

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
OUZIF Mohamed Chirurgien Dentiste Res Ryad Al Oods Aree 15/11/23	15 Nov 2023	Ref 50 gen	200 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
MEDIORCA 27 Lotissement haj fateh Boulevard 1144 - Casablanca Tél : 05 22 930 685	7/12/23					700,00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
<img alt="Dental arch diagram showing teeth numbered 1 to 8 in a loop, with arrows indicating mesial (M), distal (D), bu				

- Chirurgie des maladies osseuses et Rhumatologiques
- Ostéoporose, PRP
- Chirurgie Prothétique - Arthroscopie
- Spécialiste en chirurgie de la main et du pied
- Diplômé de la Faculté de médecine de Paris-sorbonne
- Ancien Résident de S.O.S main Paris
- Ancien Médecin du CHU Ibn Rochd
- Ancien Interné de l'hôpital Robert Ballanger (Aulnay sous bois)
- Ancien Résident de l'hôpital Paul d'Egine (Champeigny sur Marne)
- Membre de la société française de Traumato-Orthopédie



- امراض المفاصل و العظام
- هشاشة العظام - العلاج بالبلازما
- الجراحة التعويضية - الجراحة بالمنظار
- متخصص في جراحة اليد والقدم من كلية الطب
- الصورون - باريس

- طبيب سابق في مستعجلات اليد بباريس
- طبيب سابق بمستشفي ابن رشد
- طبيب سابق بمستشفي روبر بارونجي
- طبيب سابق بمستشفي بول ديجين
- عضو بالجامعة الفرنسية لجراحة المفاصل و العظام

Date : 15/11/2023

NAIMA TAYI - né(e) le : - ()

Ordonnance

Compte rendu de Radiographie.

Radiographie du genou G F/P.

pincement articulaire tricompartimental plus exagéré du compartiment interne.

légère déminéralisation osseuse.

légère déviation axiale.

Dr. OUZIF Mohamed Amine
Chirurgien Traumatol. Orthopédiste
Rés. Ryad Al Qods Angle 50 Al Qods
et Bd. Alifa 1er Etg. Ain Chock. Casablanca
Tél : 05.22.87.33.57 / 06.61.14.41

N°2, Immeuble 34, Bd Al Qods – Résidence Addamane – Ain Chock, Casablanca.

رقم 2 ، عمارة 34 ، شارع القدس إقامة ، الضمان عين ، الشق الدار البيضاء

Tel : 05.22.87.33.57 GSM : 06.61.14.41 E-mail : dr.ouzif@gmail.com

Dr. OUZIF Mohamed Amine
Chirurgien Orthopédiste Traumatologue

- Chirurgie des maladies osseuses et Rhumatologiques
- Ostéoporose, PRP
- Chirurgie Prothétique - Arthroscopie
- Spécialiste en chirurgie de la main et du pied
- Diplômé de la Faculté de médecine de Paris-sorbonne
- Ancien Résident de S.O.S main Paris
- Ancien Médecin du CHU Ibn Rochd
- Ancien Interné de l'hôpital Robert Ballanger (Aulnay sous bois)
- Ancien Résident de l'hôpital Paul d'Egine (Chamigny sur marne)
- Membre de la société française de Traumato-Orthopédie



الدكتور أوزيف محمد أمين
أخصائي في جراحة المفاصل والظامان

- أمراض المفاصل والظامان
- هشاشة العظام - العلاج بالبلازما
- الجراحة التعويضية - الجراحة بالأنظفان
- متخصص في جراحة اليد والقدم من كلية العلب
- الصوريون - بارعمن
- طبيب ساق في مستعجلات اليد بباريس
- طبيب ساق بمستشفي ابن رشد
- طبيب ساق بمستشفي وول ديجين
- عضو بالجامعة الفرنسية لجراحة المفاصل والكتفان

Ordonnance

Le : 15 NOV. 2023

NOTE D'HONORAIRE

Nom : TAYI NAIMA

Frais engagés :

Consultation Spécialiste d'Ortho

Radio de genou also DH

Total : 450 DH

Dr. Ouzif Mohamed Amine
Chirurgien Orthopédiste Traumatologue
Rés. Riad Addamane - Ain Chock - Casablanca
et Bd Haïd - 33 Aïn Chock - Casablanca
15 22 33 33 Aïn Chock - Casablanca
0661 67 14 41*

N°2, Immeuble 34, Bd Al Qods - Résidence Addamane - Ain Chock, Casablanca.

رقم 2، عمارة 34، شارع القدس إقامة، الضمان عين، الشق الدار البيضاء

Tel : 05.22.87.33.57 GSM : 06.61.67.14.41 E-mail : dr.ouzif@gmail.com

NAIMA TAYI

FACTURE : 1209/23
Date : 07/12/2023

Code	Désignation	Qté	P.U. H.T	TOTAL H.T
SO	SEMELLES ORTHOPEDIQUES	1	700,00	700,00
TOTAL HT				700,00

*MEDIC7CA
27 Lot 1000, Bd Oued Eddouira, Haj fateh
Boulevard H-44 - Casablanca
Tél : 05 22 930 685*

VENTE EN EXONERATION DE LA T.V.A ARTICLE 91-VI-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS

**ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE .
SEpte CENT DIRHAMES**

Casablanca : 330, Bd oued Eddouira
Lot Haj Fateh - El Oulfa
Tél. : 05 22 930 685
GSM : 06 00 600 231

E-mail : medior78@gmail.com

ICE : 002030595000081
RC : 409501
TVA : 36047845
IF : 26090711

OUZIF Mohamed Amine
Chirurgien Orthopédiste Traumatologue

- Chirurgie des maladies osseuses et Rhumatologiques
- Ostéoporose, PRP
- Chirurgie Prothétique - Arthroscopie
- Spécialiste en chirurgie de la main et du pied
- Diplômé de la Faculté de médecine de Paris-sorbonne
- Ancien Résident de S.O.S main Paris
- Ancien Médecin du CHU Ibn Rochd
- Ancien Interné de l'hôpital Robert Ballanger (Aulnay sous bois)
- Ancien Résident de l'hôpital Paul d'Égine (Champrigny sur Marne)
- Membre de la société française de Traumato-Orthopédie



الدكتور اوزييف محمد امين
اخصائي في جراحة المفاصل و العظام

- امراض المفاصل و العظام
- هشاشة العظام - العلاج بالبلازما
- الجراحة الترمومضية - المراحة بالمنظار
- متخصص في جراحة اليد والقدم من كلية الطب
- الصوربون - باريس
- طبيب سارق في مستعجلات اليد بباريس
- طبيب سارق بمستشفي ابن رشد
- طبيب سارق بمستشفي دوبيه بالونجي
- عضو بالجامعة الفرنسية لجراحة المفاصل والكتف

Date : 15/11/2023

NAIMA TAYI - né(e) le : - (-)

Ordonnance

semelle orthopédique pour pied plat valgus soutien de voute + coin postérieur supinateur

Le :

MEDIOR 27
27 Lotissement
Boulevard de la Casablanca
Tél: 05.22.87.33.57 - 06.61.67.14.41

Dr. OUZIF Mohamed Amine
Chirurgien Orthopédiste Traumatologue
Rue de la Casablanca 34 - 2005 Ain Chock - Casablanca
et Bd Hassan II 27 33 57 06 61 67 14 41
Tél: 05.22.87.33.57 GSM : 06.61.67.14.41 E-mail : dr.ouzif@gmail.com

N°2, Immeuble 34, Bd Al Qods – Résidence Addamane – Ain Chock, Casablanca.

رقم 2 ، عمارة 34 ، شارع القدس إقامة ، الضمان عين ، الشق الدار البيضاء

Tel : 05.22.87.33.57 GSM : 06.61.67.14.41 E-mail : dr.ouzif@gmail.com

- Chirurgie des maladies osseuses et Rhumatologiques
- Ostéoporose, PRP
- Chirurgie Prothétique - Arthroscopie
- Spécialiste en chirurgie de la main et du pied
- Diplômé de la Faculté de médecine de Paris-sorbonne
- Ancien Résident de S.O.S main Paris
- Ancien Médecin du CHU Ibn Rochd
- Ancien Interne de l'hôpital Robert Ballanger (Aulnay sous bois)
- Ancien Résident de l'hôpital Paul d'Egine (Champeigny sur Marne)
- Membre de la société française de Traumato-Orthopédie



Date : 15/11/2023

NAIMA TAYI - né(e) le : - ()

Ordonnance

DÉPO MEDROL 80 MG / ML 1 seringue de 2 ml préremplie (Methylprednisolone)
1 inj / semaine pendant 1 mois ou SOLUMEDROL 120 MG / 2 ML 1 Flacon + 1 ampoule
(Methylprednisolone) 1 injection tous les 3 jours (4 injection) ou SOLUMEDROL 40 MG
1 inj/j pendant 6 jours.

MYDOFLEX 150 MG Boîte de 30 (Tolpénzole)
1 cp x3/j pendant 10 jours

DOLICOX 90 MG Boîte de 14 (Etoricoxib)
1 cp / jour pendant 14 jours

IXOR 20 MG Boîte de 14 (Oméprazole)
1 cp / jour le matin pendant 14 jours

- امراض المفاصل والغضارب
- هشاشة العظام - العلاج بالبلازما
- الجراحة الترمومضية - الجراحة بالمنظار
- متخصص في جراحة اليد والقدم من كلية الطب الصوربون - باريس
- طبيب سابق في مستحدثات اليد بباريس
- طبيب سابق بمستشفى ابن رشد
- طبيب سابق بمستشفى ووليفري بالوادي
- طبيب سابق بمستشفى بول ميجن
- عضو بالجامعة الفرنسية لجراحة المفاصل والغضارب

5.V

5.V
Dr. Ouzif MAGNOLIA
Bassatine Bouskoura
Loubna en HALIB
Docteur en Pharmacie

25420

Dr. OUZIF Mohamed Amine
Chirurgien Traumatologue Orthopédiste
Res Ryad Al Qods, Avenue 1er Mai
et Bd Hassan 1er El Figh, Ain Chock, Casablanca
Tel : 05.22.87.33.57 / 06.61.57.14.41

maladie de Crohn, rectocolite hémorragique
insuffisance cardiaque (modérée ou sévère),
cardiaque, portage coronarien, maladie des
artères vasculaires cérébrales y compris un accident
cérébral, légèrement augmenter le risque de crise
c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être
blessés cardiaques ou un accident vasculaire
en traitement [veillez avec votre médecin ou
la pression artérielle soit bien contrôlée].
concerne, ne prenez pas les comprimés sans

90mg & 120mg, comprimé pelliculé peut
survient pas systématiquement chez tout le

devez immédiatement arrêter DOLICOX®

et contacter votre médecin.

nt, de douleurs thoraciques ou d'œdème des

unisse] : cela peut être le signe évocateur de

te ou coloration noire des selles.

lèmes cutanés tels qu'apparition d'ulcérations

les lèvres, de la langue ou de la gorge pouvant

listés ci-dessous est définie selon la convention

ent sur 10]
100]

sur 1 000]

000)

sur 10 000)

venir pendant le traitement par DOLICOX®

pieds dû à une rétention d'eau,
rythme cardiaque irrégulier ; élévation de la
respiratoire; Constipation, flatulence , gastrite,
gêne à l'estomac, nausées, vomissements,
de la bouche; Modifications des examens
Hématoxyles; Faiblesse et fatigue, syndrome

sires hautes, infection urinaire, diminution du
nombre de globules blancs, diminution des
ou diminution de l'appétit, prise de poids,
ent, voir, ressentir ou entendre des choses qui
sensation d'engourdissement ou picotements,
de l'œil, bourdonnements d'oreilles, vertiges,
cardiaque rapide, insuffisance cardiaque,
dans la poitrine, crise cardiaque, bouffées
mini-AVC, élévation sévère de la pression
toux, essoufflement, saignements de nez,
modification du transit intestinal, sécheresse de
de la paroi de l'estomac pouvant devenir
du colon irritable, inflammation du pancréas,
d'émorégeances, rougeur de la peau,
raideur, taux de potassium élevés dans le
urinaires évaluent le fonctionnement du rein,

anomalie du rythme cardiaque, infection des

couche, gastrite, Inflammation de l'œsophage.

si nécessite un avis médical immédiat),
Taux bas de sodium dans le sang,
eau et des yeux; Réactions cutanées sévères,
rougeur de la peau,
ant moins de 1 personne sur 10 000),
ment graves pour nécessiter immédiatement
essoufflement), réactions cutanées sévères,
de l'estomac pouvant devenir grave et aller
bles rénaux graves, élévation importante de
ou entendre des choses qui n'existent pas.
(estimé sur la base des données disponibles)
isse), inflammation du pancréas, fréquence

comme étant grave ou si vous présentez des
notice, veuillez en informer votre médecin ou

particularités d'emploi :

macien avant de prendre DOLICOX® 60mg.

u d'ulcère de l'estomac,

- Vous avez des œdèmes dus à une rétention de liquide,
- Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,
- Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut augmenter la pression artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses.
- Vous avez des œdèmes de la poitrine ou des reins,
- Vous avez un traitement anti-infectieux. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut masquer une fièvre, qui est un signe d'infection,
- Vous êtes une femme et souhaitez concevoir un enfant,
- Vous êtes âgée(e),

- Vous avez du diabète, du cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des points ci-dessus vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé.

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Interactions :

Autres médicaments et DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

En particulier après le début du traitement par DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, votre médecin peut être amené à vérifier, que vos médicaments agissent correctement, si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Médicaments qui fluidifient votre sang (anticoagulants) tels que la warfarine, rifampicine (un antibiotique), méthotrexate (un médicament immunosupresseur, souvent utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde), médicaments pour aider à contrôler l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion (par exemple l'enalapril et le ramipril) et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (comme le losartan et le valsartan), lithium (médicament pour traiter certains types de dépression), diurétiques, ciclosporine ou Tacrolimus (médicaments immunosupresseurs), digoxine (médicament pour traiter l'insuffisance cardiaque ou le rythme cardiaque irrégulier), minoxidil (médicament pour traiter l'hypertension artérielle), salbutamol en comprimés ou en solution buvable (médicament pour traiter l'asthme), pilule contraceptive, traitement hormonal substitutif de la ménopause, aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac est plus élevé si vous prenez DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé avec de l'aspirine.

DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec de l'aspirine à faibles doses. Si vous prenez actuellement de l'aspirine à faibles doses pour la prévention d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, vous ne devez pas interrompre le traitement par l'aspirine sans l'avis de votre médecin.

Interactions avec les aliments et les boissons :
L'efficacité de DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être plus rapide si la prise se fait sans aliments.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :
Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :
Grossesse et allaitement

Les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, ne doivent pas être pris pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être ou en cas de désir de grossesse, ne prenez pas les comprimés. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, arrêtez de prendre les comprimés et consultez votre médecin. Consultez votre médecin si vous n'êtes pas sûre ou si vous avez besoin de plus de conseils.

Le passage de l'étoricoxib dans le lait maternel n'est pas connu. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter, consultez votre médecin avant de prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé. Si vous prenez DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, vous ne devez pas allaiter.

Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La prise DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut entraîner des étourdissements et une somnolence chez certains patients.

Ne conduisez pas si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
Vous ne devez jamais prendre plus de comprimés que la posologie recommandée par votre médecin. Si vous prenez trop de comprimés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé, vous devez immédiatement prendre un avis médical.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
Il est important de prendre la dose DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé que votre médecin vous a prescrite. Si vous oubliez une dose, reprenez votre traitement à la dose habituelle le jour suivant l'oubli. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mentions, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage.

Sans objet.

Sous prescription médicale. Tableau A (liste I).

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.



82, Allée des Casuarinas - Ain Sebaâ - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

IXOR®

(Oméprazole)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- IXOR® Comprimé effervescent à dose fixe

- IXOR® Comprimé

Veuillez lire
de prendre
important

- Gardez à
à votre mère

- Ce médi-

donnez à
même si

- Si l'un des effets indésirables
remarquez un effet indésirable
notice, parlez-en à votre mè

40

IXOR® 20 mg
14 comprimés effervescents

6 118000
032793

IXOR® 20 mg 14 comprimés effervescents

PPU 73DH80
EXP 04/2025
LOT 35009 4

Que contient cette notice
1. Qu'est-ce que IXOR® et à
2. Quelles sont les Informations
IXOR® ?

3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE IXOR® ET À

- Classe pharmaco-thérapeutique
Code ATC : A02BC01
IXOR® comprimé effervescent à dose fixe. Il appartient à la classe des protons. Il diminue l'acidité de l'estomac.

- Indications thérapeutiques
IXOR® comprimé effervescent et
Chez les adultes :
- Le reflux gastro-oesophagien (RGO),
de l'oesophage (le tube qui relie la g^ote à l'estomac),
inflammation et brûlures.

- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

- Un type d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :
- Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acidité de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la g^ote à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (réurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

- Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IXOR® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

- Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
- Si vous prenez un médicament contenant du neflénavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).
- Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas IXOR® comprimé effervescent. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre IXOR® comprimé effervescent.
- En raison de la présence d'aspartame, ce médicament est contre-indiqué en cas de phénylkétoneurie.

- **Fautes attention avec IXOR® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)**

Prenez en compte la teneur en sodium chez les patients suivant un régime.

environ 765,7 mg de sodium par comprimé

environ 768,6 mg de sodium par comprimé

chez le médecin ou pharmacien avant de prendre IXOR® comprimé effervescent peut masquer des symptômes. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre IXOR® comprimé effervescent ou lorsque vous êtes sous le traitement d'un ulcère par Helicobacter pylori, il est important que vous informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

- **Aliments et boissons (Interactions avec les aliments et les boissons)**

IXOR® comprimé effervescent avec les aliments et boissons

Tous les comprimés effervescents peuvent être pris avec de la nourriture ou à jeun.

- **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

- **Effets pendant la grossesse et l'allaitement**

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou que vous prévoyez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Le loméprazole est excreté dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre IXOR® comprimé effervescent pendant l'allaitement.

- **Sportifs**

Sans objet.

- **Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines**

IXOR® comprimé effervescent n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire. Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

- **Excipients à effet notable :**

- Aspartame :
- Sodium benzoate :
- Dosez en cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium : IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent

- IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent

- **3 - COMMENT PRENDRE IXOR® ?**

- **Instruction pour un bon usage**

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de comprimés effervescent vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

- **Polycap : mode et/ou voie (s) d'administration, fréquence et durée du traitement**

- **1- Pénétration**

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

- **Utilisation chez les adultes :**

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 - 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

- La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

- **2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IXOR® ?**

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

- Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de IXOR® comprimé effervescent:

- Rifaxipine (utilisé pour traiter la tuberculose);

- Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH);

- Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organes);

- Milteperutol (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée);

- Cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente);

- Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH);

- Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus));

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer).

- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) : si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par IXOR® comprimé effervescent.

- Si votre médecin vous prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec IXOR® comprimé effervescent pour le traitement d'un ulcère par Helicobacter pylori, il est important que vous informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

- **Aliments et boissons (Interactions avec les aliments et les boissons)**

IXOR® comprimé effervescent avec les aliments et boissons

Tous les comprimés effervescents peuvent être pris avec de la nourriture ou à jeun.

- **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

- **Effets pendant la grossesse et l'allaitement**

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous alliez, si vous pensez être enceinte ou que vous prévoyez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Le loméprazole est excreté dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre IXOR® comprimé effervescent pendant l'allaitement.

- **Sportifs**

Sans objet.

- **Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines**

IXOR® comprimé effervescent n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire. Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

- **Excipients à effet notable :**

- Aspartame :
- Sodium benzoate :
- Dosez en cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium : IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent

- IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent

- **2 - Mode d'administration**

Il est recommandé de prendre IXOR® le matin.

Tous les comprimés sont à dissoudre dans un demi-verre d'eau et à prendre à jeun ou au cours d'un repas.

Chez les enfants, mélanger après dissolution IXOR® à un aliment légèrement acide, tel que yaourt, jus d'orange, compote de pomme...

- **Utilisation chez les enfants « et les adolescents »**

IXOR® comprimé effervescent peut être administré à l'enfant à partir de 1 an et pesant plus de 10 kg.

- **3 - Utilisation chez les enfants**

Il est recommandé de prendre IXOR® le matin.

Tous les comprimés sont à dissoudre dans un demi-verre d'eau et à prendre à jeun ou au cours d'un repas.

Chez les enfants, mélanger après dissolution IXOR® à un aliment légèrement acide, tel que yaourt, jus d'orange, compote de pomme...

- **Utilisation chez les adolescents « et les adolescents »**

IXOR® comprimé effervescent peut être administré à l'enfant à partir de 1 an et pesant plus de 10 kg.

- **4 - Utilisation chez les adolescents**

Il est recommandé de prendre IXOR® le matin.

Tous les comprimés sont à dissoudre dans un demi-verre d'eau et à prendre à jeun ou au cours d'un repas.

Chez les adolescents, mélanger après dissolution IXOR® à un aliment légèrement acide, tel que yaourt, jus d'orange, compote de pomme...

- **5 - Utilisation chez les adolescents**

Il est recommandé de prendre IXOR® le matin.

Tous les comprimés sont à dissoudre dans un demi-verre d'eau et à prendre à jeun ou au cours d'un repas.

Chez les adolescents, mélanger après dissolution IXOR® à un aliment légèrement acide, tel que yaourt, jus d'orange, compote de pomme...

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère

graves)

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci

sont rares mais sérieux, arrêtez de prendre IXOR® comprimé

effervescent et contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Apparition soudaine d'une respiration silente, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation.

Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagnent d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrose épidermique toxique.

- Jaunisse, urines foncées et fatigué peuvent être des symptômes de l'ulcère.

- Mauvaise haleine dans l'estomac.

- Nausées et vomissements.

- Polyurie bénigne dans l'estomac.

- Effets indésirables fréquents

- Gonflement des pieds et des chevilles.

- Troubles du sommeil (insomnie).

- Étouffements, fourmissements, somnolence.

- Vertiges.

- Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

- Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

- Malaise général, manque d'énergie.

- Effets indésirables rares

- Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.

- Réactions allergiques, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, une respiration difficile.

- Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

- Agitation, confusion ou dépression.

- Troubles du goût.

- Troubles de la vue, tels que vision trouble.

- Réspiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).

- Sécheresse buccale.

- Inflammation de l'intérieur de la bouche.

- Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.

- Perle de cheveux (alopecie).

- Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.

- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

- Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).

- Augmentation de la sucre.

- Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).

- Agressivité.

- Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.

- Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.

- Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes de la peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrose épidermique toxique).

- Faiblesse musculaire.

- Consommation accrue chez l'homme.

- Effets indésirables de fréquence indéterminée (Ne peut pas être estimé à partir des données disponibles).

- Inflammation de l'intestin (entrant dans des diarrhées).

- Si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pendant plus de 3 mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.

- Eruption cutanée, éventuellement avec des douleurs dans les articulations.

IXOR® comprimé effervescent peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devrez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

· Eruption cutanée, éventuellement avec des douleurs dans les articulations.

IXOR® comprimé effervescent peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devrez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci

sont rares mais sérieux, arrêtez de prendre IXOR® comprimé

effervescent et contactez votre pharmacien ou votre médecin.

- Apparition soudaine d'une respiration silente, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation.

Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagnent d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrose épidermique toxique.

- Jaunisse, urines foncées et fatigué peuvent être des symptômes de l'ulcère.

Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

· Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre

médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement au

Centre National de Pharmacovigilance (tel : 080100180 - Email : camp@capn.ma)

ou aux laboratoires LAPROPHAN (Email : pharmacovigilance@laprophan.com).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir

davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5 - COMMENT CONSERVER IXOR® ?

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

- Ne pas utiliser IXOR® après la date de péremption figurant sur la boîte. (La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois mentionné).

- Durée de conservation et conditions de conservation

- 2 ans

- Tube à conserver bien fermé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Température inférieure à 30°C

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les

ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Que contient IXOR® ?

Comprimé effervescent à 20 mg

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active

(s) par unité de prise

Oméprazole

20 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Citrate monosodique anhydre, Sodium bicarbonate, Phosphate monosodique 2H₂O, Phosphate di sodique 2H₂O, Aspartam, Saccharine sodique, Docusate de sodium, Crospovidone, Sodium benzoate, Siméthicone en dispersion, Arôme Peppermint, Alcool éthylique à 8 %, Eau purifiée

Composition qualitative en excipients

Excipients : Citrate monosodique anhydre, Sodium bicarbonate, Phosphate monosodique 2H₂O, Phosphate di sodique 2H₂O, Aspartam, Saccharine sodique, Docusate de sodium, Crospovidone, Sodium benzoate, Siméthicone en dispersion, Arôme Peppermint, Alcool éthylique à 96 %, Eau purifiée

- Nom et adresse du laboratoire pharmaceutique

الجرعة، قم بتناول الجرعة الموصوفة. في حالة التسخان الكامل، لا تقم مضاعفة الجرعة التالية.

6. مواعيذ العصعمل
لا تستخدم أبداً أقراص ميدوفلكس 150 ملг المغلفة في الحالات التالية:
اللون العضلي الخطي (مرض نادر يسبب ضعف العضلات).
الحساسية السابقة لميدوفلكس
في حالة الشك، إنه من المفروض أن تستشير الطبيب أو الصيدلي.

7. الآثار الجانبية
أظهرت الدراسات السريرية الأخيرة أن أقل من 5% من المرضى الذين تم علاجهم قد قاموا بالإبلاغ عن آثار ضارة.
الآثار الجانبية المليغ عنها هي كما يلي:
الجهار العصبي الگروري:

10. الاستهلاك
في بعض الأحيان: دوخة ودوار ورعاش وتنميل
غير شائع: صداع
نظام القلب والأوعية الدموية:
في بعض الأحيان، اخفاقان، اخفاض ضغط الدم
الجهاز الهضمي:
في بعض الأحيان: حفاف الفم وعسر الهضم والغثيان والتقيؤ والإسهال وألم الحليب.
غير شائع: اضطراب الطبل.

11. الثاني
في بعض الأحيان: تعرق وتميج وطفح جلدي.
غير شائع: اضطرابات عامة:
غير شائع: وهن ونعاس وألم.
في حال لاحظتم آية آثار جانبية أخرى، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

8. تحذيرات واحتياطات خاصة للإستخدام:
يتموا الحذر مع ميدوفلكس 150 ملг:
عند وصف ميدوفلكس يكتب على الطبيب بإبلاغ المريض من عناصر الحساسية المربيطة بهذا المنتج (انظر الآثار الجانبية)، إذا تم الشعور بعد تناول الدواء بمظاهر غير طبيعية (وخز في البطن والقائمين وظهور بقع حمراء وتورم في الوجه أو الأغشية المخاطية وضيق في التنفس وشعور بالغثيان وظهور علامات موجة الحساسية الأدبية) يجب وقف العلاج وإبلاغ الطبيب فوراً.
في حال الشك، لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

9. التفاعلات
تناول أو استخدام أدوية أخرى
على الرغم من أن هذه المسألة لم يتم دراستها ضمن دراسات مناسبة، فلم يتم الإبلاغ عن أي تفاعلات دوائية حتى الآن مع النيزودازينات والعقاقير المضادة للالتهابات والمسكنات التي توصف عموماً بالاشراك مع التولبريزون.
لقد أظهرت دراسة سريرية مستقبلية عدم وجود تفاعل كبير مع استهلاك

ميدوفلكس 150 ملغ

أقراص مغلفة

تولبريزون هيدروكلورايد

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل تناول هذا الدواء.
احفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، إذا كانت لديك أي شكوك ، اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات
تم وصف هذا الدواء لك. لا تتعطى أبداً لشخص آخر ، حتى لو كان لديه نفس الأعراض ، فقد يضره
إذا تفاقمت أي من الآثار الجانبية ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة ، فيرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي

1. اسم المنتج الطبي:
ميدوفلكس 150 ملг، عليه تحتوي على 30 قرصاً مغلفاً

2. مكونات الدواء:

المكونات:
تولبريزون (هيدروكلورايد) 150 ملغ
سوانغ: حامض الستريك الالماني، البوتاسيون، السليوز الالوري في إتش 102،
مياه نقية، السليوز الالوري في إتش 112، ثان أكسيد السيليكون الغرواني،
كروسوفيفون، ستيريبوت المغنيسيوم، كحول بولي فينيل متخلل جزيئاً، ثان
أكسيد التيتانيوم، بولي إيثيلين الجليكول، الثلث.

3. الفئة العلاجية أو نوع النشاط:
ميدوفلكس هو لاسترخاء العضلات

4. الاستعمالات العلاجية
ميدوفلكس يحتوي على المادة الفعالة تولبريزون هيدروكلورايد وهو لاسترخاء العضلات. يتم استخدامه، موجب وصفة طبية، في علاج تشنجات العضلات، عند الشعور بآلام ذات صلة بالعضلات والعظام، ولا سيما في العمود الفقري والمفاصل الكبيرة. ويمكن أيضاً أن يوصف في فرط التوتر العضلي والطيكي المرتبط بحالة عصبية.

5. الجرعة وطريقة تناول الدواء:
عند البالغين، تكون الجرعة الأولية عادة، قرص مغلف واحد من ميدوفلكس (جرعة من 150 ملغ) في الصباح وعند النهار وفي المساء (أي جرعة يومية من 450 ملغ). في بعض الحالات قد يصف الطبيب جرعة أكبر (قرص 150 ملغ مغلف أربع مرات يومياً). عند كبار السن، أو في حالة بعض الأمراض المرتبطة (الفشل الكلوي أو الكلوي)، الجرعة المقررة غالباً ما تكون أقل. تبقى الجرعة اليومية محفوظة حتى يتم الحصول على النتيجة العلاجية. يمكن أن تنص الوصفة الطبية على فترة زمنية أطول بين تناول الماء. في حالة التأخير البسيط في تناول

MYDOFLEX 150 mg

Comprimés pelliculés.

Tolpérison HCl

MYDOFLEX® 150 mg
Tolperisone HCl
30 Comprimés pelliculés

6 118001 260850



Qualité de ce médicament.

avoir besoin de

, si vous avez

personnellement
quelqu'un d'autre,
identiques, cela

Les devient grave
ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYDOFLEX 150mg, boîte de 30 comprimés pelliculés

2. Composition du médicament :

Composition :

TOPLERISONE (DCI).....150mg

Excipients : Acide citrique anhydre, povidone, cellulose microcristalline PH102, eau purifiée, cellulose microcristalline PH112, dioxyde de silice colloïdale, Crospovidone, stéarate de magnésium, alcool polyvinylelique partiellement hydrolysé, dioxyde de titane, polyéthylène de glycol, Talc

3. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité:

MYDOFLEX est un myorelaxant

4. Indications thérapeutiques

MYDOFLEX contient le principe actif chlorhydrate de tolperisone qui est un décontracturant musculaire. Il est utilisé, sur prescription médicale, dans le traitement des spasmes musculaires, lors d'affections douloureuses d'origine musculo-squelettique, notamment de la colonne vertébrale et des grosses articulations. Il peut aussi être prescrit dans l'hypertonie de la musculature squelettique associée à une affection neurologique.

5. Posologie et mode d'administration :

Chez l'adulte la dose initiale est en général d'un comprimé pelliculé de MYDOFLEX (soit une dose de 150 mg) matin, midi et soir (soit une dose journalière de 450

mg). Dans certains cas le médecin peut prescrire une dose plus importante (quatre fois un comprimé pelliculé à 150 mg par jour). Chez les personnes âgées, ou en cas de certaines maladies associées (insuffisance hépatique ou rénale), la dose prescrite est souvent plus faible. La dose journalière est maintenue jusqu'à l'obtention du résultat thérapeutique. La prescription médicale peut prévoir pour la suite un intervalle plus long entre les prises. En cas de simple retard d'une prise prenez la dose prévue. En cas d'oubli complet d'une prise ne pas doubler la dose suivante.

6. Contre-indications

N'utilisez jamais MYDOFLEX 150 mg comprimés pelliculés dans les cas suivants :

Myasthénie grave (maladie rare entraînant une faiblesse musculaire).

Allergie antérieure au MYDOFLEX

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Les récentes études cliniques ont montré que moins de 5% des patients traités avaient annoncé des effets indésirables. Les effets indésirables rapportés sont les suivants:

Système nerveux central:

Occasional: vertige, tremblement, paraesthesia

Peu fréquent: mal de tête

Système cardiovasculaire:

Occasional: palpitations, hypotension

Étendue gastro-intestinale:

Occasional: bouche sèche, dyspepsie, nausée, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, flatulences

Peu fréquent: constipation, brûlures d'estomac

Peau:

Occasional: transpiration, urticaire, éruption

Troubles généraux:

Peu fréquent: asthenie, somnolence, douleur

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Faites attention avec MYDOFLEX 150 mg :

En prescrivant MYDOFLEX le médecin doit informer le patient des risques d'allergies liés à ce produit (voir Effets indésirables). Si après la prise du médicament, vous ressentez des manifestations anormales (fouillis dans les mains, les pieds, apparition de plaques ouges, enflure de la face ou des muqueuses, gêne respiratoire, malaise, signes pouvant faire penser à une allergie médicamenteuse), il faut arrêter le traitement et avertir immédiatement le médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. Interactions

Prise ou utilisation d'autres

Bien que la question n'ait pas été étudiée appropriée, la médicamenteuse n'a pas été benzodiazépines, anti-inflammatoires, analgésiques qui sont associées à la prospective à la signification avec les études *in vitro* utilisées; ainsi que des enzymes tolperisone est prébiotiquement transformée par 2D6 et secondairement CYP 3A4 n'est pas hydroxylé par les médicaments. Basé sur les études attendre d'autres médicaments, nombreux. Cependant, certaines interactions peuvent être possibles.

Interactions :

Sans objets

Interactions thérapeutiques :

Si

Interactions pharmacologiques :

Si

Interactions physiologiques :

Si

Interactions physico-chimiques :

Si