

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge  
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° W21-697641

187217

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 560

Société : R.A.M

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : ABAKIL

HAFFED

Date de naissance : 1-07-1943

Adresse : LOT BNI-YAKHLEF N° 49  
RUE ALBAOFRANE Mohammed  
Idem

Tél. :

Total des frais engagés : 786,00

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr SOUMIA MHANNA  
CARDIOLOGUE  
Consultation : Exploration  
CARDIOVASCULAIRE  
Bd Palestine Mesk El Lh Lar Redouane N°30  
1er Etage N°3 Mohammedia  
Tel: 05 23 26 59 59

Cachet du médecin :

Date de consultation : 14/12/2023

Nom et prénom du malade : ABAUGL HAFED

Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA + DTC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquez les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammedia le : 14/12/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019






# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/12/23	sg. 00	300,00		INP 09/11/23 069 Dr. SOUMIA MHANNA CARDIOLOGUE Consultation et Exploration CARDIOVASCULAIRE

Bd. Palestine Mesk El-Li La Redouane N°30  
1er Etage AP 190 - Mohammedia  
Tel: 05 23 28 59 59

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	14/12/23	486,-

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



# O.D.F. PROTHESES DENTAIRES



# DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
G	
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



## CABINET DE CONSULTATION & D'EXPLORATION CARDIOVASCULAIRE EL ALIA

**Dr Soumia MHANNA**

**Spécialiste en pathologie cardiovasculaire**

Echographie doppler

Holter tensionnel et Rythmique

Epreuve d'effort

Diplômée de l'Université de Médecine de Casablanca

Diplômée en Echocardiographie de Bordeaux

Ancienne Interne au CHU de Bicêtre Paris

**الدكتورة سومية مهنة**

**أخصائية في أمراض القلب والشرايين**

الفحص بالصدى والتخطيط الكهربائي

التسجيل المستمر للضغط الدموي وتخطيط القلب

تخطيط القلب أثناء الجهد

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

حاصلة على دبلوم الفحص بالصدى ببوردو

طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

**14/12/2023**

Mohammedia, le: .....

**Mr ABAKIL Hafed**

2x4,7

**1 - Irvel 75 mg**

1 Comprimé par jour MATIN . 1J/2

3x80

**2 - Cardioaspirine 100 mg**

1 Comprimé, midi, après les repas,

3x578

**3 - LD-NOR 10**

1 Comprimé, soir, 20H

3x461

**4 - Corvasal 2 mg**

1/2 Comprimé, matin, soir, après les repas,

**REGIME PEU SALE / TT 03 MOIS**

1861

**Dr. SOUMIA MHANNA**  
CARDIOLOGUE  
Consultation et Exploration  
CARDIOVASCULAIRE  
Bd Palestine, Mesk El Lil, Lotissement Redouane N°30  
1er Etage N°3 - Mohammedia  
Tél: 05 23 28 59 59



**IRVEL®**  
libéartian

75 mg, 150 mg et 300 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 et 28

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que IRVEL® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IRVEL® ?
- 3- Comment prendre IRVEL® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver IRVEL® ?
- 6- Informations supplémentaires

#### 1- QU'EST-CE QUE IRVEL® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Code ATC : C09CA04

IRVEL® appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne leur constriction. Il en résulte une élévation de la pression artérielle. IRVEL® empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs et provoque ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une baisse de la pression artérielle.

#### Indications thérapeutiques :

IRVEL® est utilisé chez l'adulte

- Pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (élévation de la pression artérielle).
- Pour protéger les reins des patients ayant une altération de la fonction rénale.

#### 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À

**Contre - Indications :**

Ne prenez jamais IRVEL®, compris

- Si vous êtes allergique à l'irbésartan

- Si vous avez du diabète ou une

diminuer votre pression artérielle.

Mises en garde spéciales et précautions

Faites attention avec IRVEL®, compris

Adressez-vous à votre médecin avant

- Si vous souffrez de vomissements ou de diarrhée importante.

- Si vous souffrez de problèmes rénaux.

IRVEL® et si une des situations suivantes se présente

07,147

ument.

: grossesse).

avant de l'utiliser pour



**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

## 100 mg, comprimés gastro-résistants

### Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les précautions à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver le médicament ?
6. Informations complémentaires

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

EXP

MFD

1 2027

### 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine 100 mg est un médicament à base d'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout pas dans l'estomac. C'est pourquoi on peut le prendre à jeun ou après un repas.

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

## 100 mg, comprimés gastro-résistants

### Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les indications à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment l'administrer ?
6. Informations complémentaires.

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

EXP

MFD

1 2027

### 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine 100 mg est un médicament à base d'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout pas dans l'estomac. C'est pourquoi on peut le prendre à jeun ou après un repas.

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

## 100 mg, comprimés gastro-résistants

### Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les indications à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment l'utiliser ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment l'administrer ?
6. Informations complémentaires.

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

EXP

MFD

1 2027

### 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine 100 mg est un médicament à base d'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout pas dans l'estomac. C'est pourquoi on peut le prendre à jeun ou après un repas.



fatigue, sensation de malaise, faiblesse, douleur dans la poitrine, gonflement en particulier des chevilles (œdèmes), augmentation de la température.

EXP : 107  
PPV : 57,

LOT : 231

gynécologique (augmentation de la taille de la poitrine chez l'homme).  
Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

Effets indésirables éventuels rapportés avec certains statines (même type):  
troubles sexuels,  
dépression,  
troubles respiratoires, dont toux et/ou essoufflement persistant ou fluide

diabète : vous devez débuter un traitement par insuline et/ou par comprimés (glicémie) et de graisses élevée dans le sang, si vous êtes en surpoids et si si vous avez une pression artérielle élevée. Vous serez suivi attentivement par votre médecin au cours de votre traitement avec ce médicament.

5. COMMENT CONSERVER LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne laissez pas ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte. L'utilisation de ce médicament hors de la date de péremption peut nuire à la santé des enfants.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Principe actif	LD-NOR® 10 mg	LD-NOR® 20 mg	LD-NOR® 40 mg
Alvorstatine Calcium	10,34 mg	20,68 mg	41,36 mg

40 mg	20 mg	10 mg	Equivalent à alovastatine
-------	-------	-------	---------------------------

Composition de l'opadry OY-LS-2898 (Blanc) :  
 15P Macrogol/PEG 4000, HPMC2910/Hypromellose 30c  
 Dioxyde de titane, Lactose monohydraté, HPMC2910/Hypromellose 30c

Nom et adresse de l'EPi titulaire de l'AMM :

COOPER PHARMA  
41, Rue Abd Douai 20 110 Casablanca, Maroc  
Tél: 0533 377 20 110 Fax: 0533 377 20 141  
Pharmacies responsables: Amnia (SAOUDI)

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée, Janvier 2021.

774,185.1

Prevenez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire constante. Des examens complémentaires et un traitement peuvent être nécessaires pour la diagnostiquer et la traiter.

diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses élevé dans le sang. Vous serez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez éviter d'acquiescer à l'augmentation de la glycémie et des lipides en évitant de fumer et en évitant de consommer de l'alcool.

Autres médicaments et LD-NOR, comprimé pelliculé  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez  
prendre d'autres médicaments.

Certains médicaments peuvent modifier l'effet de LD-NOR ou l'effet de ces médicaments peut être modifié en cas d'association avec LD-NOR. Ces interactions peuvent diminuer l'efficacité de l'un des médicaments ou des deux. Dans d'autres cas, cette interaction pourrait augmenter le risque de survenue ou la sévérité d'effets indésirables, y compris une dégradation importante des muscles appelée myopathie.

- des médicaments utilisés pour modifier le fonctionnement du système immunitaire, tels que la ciclosporine,
- certains médicaments antidiabétiques ou antihypertenseurs, la clonidine, la clonazépamine,

[illegible]

- des médicaments utilisés pour le traitement de l'infection au VIH tels que le zalcitabine, le didanosine, le lamivudine, le dilaizem ; ou des médicaments utilisés pour contrôler le rythme cardiaque, tels que la digoxine, le vérapamil ou l'amilorone,
- le téfénovir, un médicament utilisé pour prévenir les infections dues aux cytomégalo-virus.

- d'autres médicaments connus pour interagir avec LD-NOR tels que l'azélaïne (qui diminue la

[illegible]

- si vous devez prendre de l'acide fusidique par voie orale pour traiter une infection bactérienne, vous devrez arrêter temporairement d'utiliser ce médicament. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre le D-LNOR au même régime.

Le D-LNOR ne doit pas être utilisé avec les médicaments suivants :

- des médicaments obtenus sans prescription médicale : le millepertuis,

cas, conduire à une faiblesse musculaire, une sensibilité ou une douleur musculaire (maddonalyse).  
 L-D-NOR, comprimé pellicule avec des aliments et boissons  
 Voir également la rubrique 3 relative aux instructions sur la façon de prendre L-D-NOR. Vous devez

quantités de jus de pamplemousse peuvent modifier les effets de LD-NOR.

Evitez de boire trop d'alcool lors de votre traitement par ce médicament. Pour plus d'informations voir également la rubrique « Avertissements et précautions ».

Ne prenez pas LD-NOR si vous êtes en âge d'avoir des enfants, sauf si vous utilisez une méthode de contraception fiable.

Conduite de véhicules et utilisation de machines  
Le médicament n'affecte normalement pas votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Cependant, ne conduisez pas si ce médicament affecte votre aptitude à conduire. N'utilisez pas.

LD-NOR, comprimé pellicule contient du lactose  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

EXP : 10/  
PPV : 57,

gynécologique (augmentation de la taille de la poitrine chez l'homme).  
Fréquence indéterminée; ne peut être estimée sur la base des données disponibles.  
Faiblesse musculaire constante.

**Déclaration des effets secondaires**

Vous serez attentivement par votre médecin au cours de votre traitement avec ce médicament.

La déclaration des effets indésirables suspects après autorisation du médicament est importante. Elle

A conserver à une température inférieure à 25 °C.  
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte.  
Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

Principe actif			Equivalent à Alvorastine		
LD-NOR® 10 mg	10,34 mg	10 mg	LD-NOR® 20 mg	20,68 mg	20 mg
LD-NOR® 40 mg	41,36 mg	40 mg			

(II)  
Hydroxypropyl cellulose, Silice colloïdale anhydre, Stéarate de magnésium, Opadry OY-S-2896 (white)  
Composition de l'opadry OY-S-2896 (Blanc) : Dioxyde de titane, Lactose monohydraté, HPMC2910/Hypromellose 15cf, Macrogo/PEG 4000, HPMC2910/Hypromellose 3cf, HPMC2910/Hypromellose 50cf

COOPER PHARMA  
 47, Rue Mohamed El Barh 20110 Casablanca, Maroc  
 05399 1933  
 Pharmacie responsable: Amine DAOUD  
 05399 1110 et 05399 1111

Conditions de prescription et de délivrance : Niveau A (liste I)

026  
0DH

Certains médicaments peuvent modifier l'effet de LD-NOR ou l'effet de ces médicaments sur la sévérité/daté des effets indésirables, y compris une dégradation importante des muscles squelettiques ou la sévérité/daté des effets indésirables, y compris une dégradation importante des muscles squelettiques.

[illegible]

et al. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681

des médicaments obtenus sans prescription médicale : le millepertuis, si vous devez prendre de l'acide fusidique par voie orale pour traiter une infection bactérienne, nous devrions arrêter temporairement d'utiliser ce médicament. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre LD-NOR en toute sécurité. L'association de LD-NOR avec l'acide fusidique peut, dans de rares cas, conduire à une myopathie musculaire, une sensibilité au son ou une douleur musculaire (myodolomyose).

prendre en compte les informations suivantes :

- les quantités de jus de pamplemousse que vous consommez par jour, car de grandes quantités de jus de pamplemousse peuvent modifier les effets de LD-NOR.
- l'alcool.

Ne prenez pas LD-NOR si vous êtes enceinte ou l'êtes de l'être.  
Ne prenez pas LD-NOR si vous êtes en âge d'avoir des enfants, sauf si vous utilisez une méthode de contraception fiable.  
Ne prenez pas LD-NOR si vous allaitez.  
La seconde emploi de LD-NOR pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas encore été établie. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

LD-NOR, comprimé pelliculé, contient du lactose.  
d'appareils ou ap ap machines à les utiliser affectée par ce médicament.  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.



EXP : 10/  
PPV : 57,

**Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles**

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous pouvez, décrivez un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses élevée dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée. Vous serez suivi attentivement par votre médecin au cours de votre traitement avec ce médicament.

**Précautions**

Le diabète est une maladie chronique. Elle nécessite un traitement à vie. Le diabète est une maladie grave. Elle peut entraîner de graves complications. Le diabète est une maladie qui peut être contrôlée. Elle nécessite un traitement à vie. Le diabète est une maladie grave. Elle peut entraîner de graves complications. Le diabète est une maladie qui peut être contrôlée. Elle nécessite un traitement à vie.

Ne jetez aucun médicament au puits, à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Utilisez pas ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte. Tenez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. À conserver à une température inférieure à 25 °C. **Ne pas utiliser si le bouchon est percé, déformé ou cassé.**

Principe actif		Alivastatine Calcium		Ergocalciferol & Alivastatine	
LD-NOR® 10 mg	LD-NOR® 10 mg	10,34 mg	20,68 mg	10 mg	20 mg
LD-NOR® 40 mg	LD-NOR® 40 mg	41,36 mg	41,36 mg	40 mg	40 mg

(f) Hydroxypropyl cellulose, Silice colloïdale anhydre, Stéarate de magnésium, Opady OY-LS-28908 (White Composition de l'opady OY-LS-28908 (Blanc)) : Dioxyde de titane, Lactose monohydraté, HPMC2910/Hypromellose 5000, Macrogol/PGE 1500, HPMC2910/Hypromellose 300

COOPER PHARMA  
Genève 1933  
41, Rue du Mont 20 110 Châtelaine, Genève  
Pharmacie responsable: Anna DABOUD  
طبيب: د. أنيس دابود

Conditions de prescription et de délivrance. Tableau A (liste I)

026  
0DH

Certains médicaments peuvent modifier l'effet de LD-NOR ou l'effet de ces médicaments peut modifier le effet de LD-NOR. Ces interactions peuvent diminuer l'efficacité de l'un des médicaments ou des deux. Dans d'autres cas, cette interaction pourrait augmenter le risque de survenue de la sévère d'effets indésirables.

1. *Le rôle de la langue dans la culture*  
 2. *Le rôle de la langue dans la société*  
 3. *Le rôle de la langue dans la vie personnelle*  
 4. *Le rôle de la langue dans la vie professionnelle*  
 5. *Le rôle de la langue dans la vie politique*  
 6. *Le rôle de la langue dans la vie économique*  
 7. *Le rôle de la langue dans la vie culturelle*  
 8. *Le rôle de la langue dans la vie scientifique*  
 9. *Le rôle de la langue dans la vie artistique*  
 10. *Le rôle de la langue dans la vie religieuse*  
 11. *Le rôle de la langue dans la vie juridique*  
 12. *Le rôle de la langue dans la vie médicale*  
 13. *Le rôle de la langue dans la vie militaire*  
 14. *Le rôle de la langue dans la vie sportive*  
 15. *Le rôle de la langue dans la vie scolaire*  
 16. *Le rôle de la langue dans la vie universitaire*  
 17. *Le rôle de la langue dans la vie publique*  
 18. *Le rôle de la langue dans la vie privée*  
 19. *Le rôle de la langue dans la vie familiale*  
 20. *Le rôle de la langue dans la vie amicale*  
 21. *Le rôle de la langue dans la vie sociale*  
 22. *Le rôle de la langue dans la vie communautaire*  
 23. *Le rôle de la langue dans la vie nationale*  
 24. *Le rôle de la langue dans la vie internationale*  
 25. *Le rôle de la langue dans la vie universelle*

[illegible]

devez arrêter temporairement d'utiliser ce médicament. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre LD-NOR en toute sécurité. L'association de LD-NOR avec l'acide fusidique peut, dans de rares cas, provoquer une réaction allergique grave. Si vous ressentez des symptômes tels que des démangeaisons, des éruptions cutanées, des gonflements ou des difficultés à respirer, arrêtez immédiatement l'utilisation de LD-NOR et contactez votre médecin.

Ne consommez pas plus d'un ou deux petits verres de jus de pamplemousse par jour, car de grandes quantités de jus de pamplemousse peuvent modifier les effets de LD-NOR.

Ne prenez pas LD-NOR si vous êtes enceinte ou l'avez été récemment.  
Ne prenez pas LD-NOR si vous êtes en âge d'avoir des enfants, sauf si vous utilisez une méthode de contraception fiable.  
Ne prenez pas LD-NOR si vous allaitez.  
La sécurité d'emploi de LD-NOR pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas encore été établie.

Cependant, ne conduisez pas si ce médicament affecte votre aptitude à conduire. N'utilisez pas d'appareils ou de machines si votre capacité à les utiliser est affectée par ce médicament.

**LD-NOR, comprimé pelliculé contenant du lactose**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CORVASAL® 2 mg, comprimé sécable

Molsidomine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CORVASAL et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORVASAL
3. Comment prendre CORVASAL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CORVASAL
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE CORVASAL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CORVASAL contient de la molsidomine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelés les vasodilatateurs utilisés en cardiologie. Ce médicament agit en dilatant les vaisseaux du cœur et diminue les besoins en oxygène au niveau du cœur. CORVASAL est utilisé pour éviter l'apparition de douleurs dans la poitrine dues à une maladie cardiaque (l'angine de poitrine).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS DE PRENDRE CORVASAL

#### Contre-indications :

**Ne prenez jamais CORVASAL :**

- Si vous êtes allergique à la substance Lot/Batch : ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous ressentez brutalement un mal de tête, des vertiges (état de choc, baisse importante de la tension artérielle) Fab/Mfg:
- Si vous prenez un autre médicament EXP. : l'association avec CORVASAL n'est pas recommandée (voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales :

lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Si votre médecin vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE CORVASAL

#### Posologie

- La dose à utiliser varie selon l'indication et elle est adaptée à chaque patient.
- Votre médecin augmentera progressivement la dose si vous avez une maladie du foie.
- À titre indicatif, la dose habituelle est en général comprise entre 3 à 8 mg par jour.

Vous devez vous conformer strictement à la prescription de votre médecin.

#### Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau sans être croqués ni sucés.

#### Fréquence d'administration

Il est important que vous respectiez les heures de prise de ce médicament en suivant les conseils de votre médecin.

Le médicament doit généralement être pris 3 à 4 fois par jour aux repas du matin, du midi et du soir.

#### Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament. Suivez scrupuleusement ses conseils.

#### Si vous avez pris plus de CORVASAL que vous n'auriez dû

Une baisse de la tension artérielle peut survenir. Prévenez immédiatement votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre CORVASAL

Le traitement doit être poursuivi normalement, sans tenir compte de la dose oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

PPV: 46 DH 70

2R637

04/22

03/2025

ments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

Une baisse de la tension artérielle en début de traitement peut survenir, mais disparaît progressivement, une baisse de la tension artérielle lors du debout pouvant s'accompagner de vertiges, de maux de tête, de fatigue, de léthargie, de déshydratation, de diminution du nombre de plaquettes dans le sang.

#### Effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CORVASAL® 2 mg, comprimé sécable

Molsidomine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CORVASAL et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORVASAL
3. Comment prendre CORVASAL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CORVASAL
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE CORVASAL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CORVASAL contient de la molsidomine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelés les vasodilatateurs utilisés en cardiologie. Ce médicament agit en dilatant les vaisseaux du cœur et diminue les besoins en oxygène au niveau du cœur. CORVASAL est utilisé pour éviter l'apparition de douleurs dans la poitrine dues à une maladie cardiaque (l'angine de poitrine).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS DE PRENDRE CORVASAL

#### Contre-indications :

**Ne prenez jamais CORVASAL :**

- Si vous êtes allergique à la substance Lot/Batch : ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous ressentez brutalement un mal de tête, des vertiges (état de choc, baisse importante de la tension artérielle) Fab/Mfg:
- Si vous prenez un autre médicament EXP. : l'association avec CORVASAL n'est pas recommandée (voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

#### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales :

lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Si votre médecin vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE CORVASAL

#### Posologie

- La dose à utiliser varie selon l'indication et elle est adaptée à chaque patient.
- Votre médecin augmentera progressivement la dose si vous avez une maladie du foie.
- À titre indicatif, la dose habituelle est en général comprise entre 3 à 8 mg par jour.

Vous devez vous conformer strictement à la prescription de votre médecin.

#### Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau sans être croqués ni sucés.

#### Fréquence d'administration

Il est important que vous respectiez les heures de prise de ce médicament en suivant les conseils de votre médecin.

Le médicament doit généralement être pris 3 à 4 fois par jour aux repas du matin, du midi et du soir.

#### Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament. Suivez scrupuleusement ses conseils.

#### Si vous avez pris plus de CORVASAL que vous n'auriez dû

Une baisse de la tension artérielle peut survenir. Prévenez immédiatement votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre CORVASAL

Le traitement doit être poursuivi normalement, sans tenir compte de la dose oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

PPV: 46 DH 70

2R637

04/22

03/2025

ments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables s'ils ne surviennent pas systématiquement.

Une baisse de la tension artérielle en début de traitement paraît progressivement, une baisse de la tension artérielle lors du debout pouvant s'accompagner de vertiges, de maux de tête, de sensations de faiblesse, de démangeaisons.

Une diminution du nombre de plaquettes dans le sang.

#### Effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CORVASAL® 2 mg, comprimé sécable

Molsidomine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CORVASAL et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORVASAL
3. Comment prendre CORVASAL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CORVASAL
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE CORVASAL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CORVASAL contient de la molsidomine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelés les vasodilatateurs utilisés en cardiologie. Ce médicament agit en dilatant les vaisseaux du cœur et diminue les besoins en oxygène au niveau du cœur. CORVASAL est utilisé pour éviter l'apparition de douleurs dans la poitrine dues à une maladie cardiaque (l'angine de poitrine).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS DE PRENDRE CORVASAL

#### Contre-indications :

**Ne prenez jamais CORVASAL :**

- Si vous êtes allergique à la substance Lot/Batch : ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous ressentez brutalement un mal de tête, des vertiges (état de choc, baisse importante de la tension artérielle) Fab/Mfg:
- Si vous prenez un autre médicament EXP. : l'association avec CORVASAL n'est pas recommandée (voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

#### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales :

lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Si votre médecin vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE CORVASAL

#### Posologie

- La dose à utiliser varie selon l'indication et elle est adaptée à chaque patient.
- Votre médecin augmentera progressivement la dose si vous avez une maladie du foie.
- À titre indicatif, la dose habituelle est en général comprise entre 3 à 8 mg par jour.

Vous devez vous conformer strictement à la prescription de votre médecin.

#### Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau sans être croqués ni sucés.

#### Fréquence d'administration

Il est important que vous respectiez les heures de prise de ce médicament en suivant les conseils de votre médecin.

Le médicament doit généralement être pris 3 à 4 fois par jour aux repas du matin, du midi et du soir.

#### Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament. Suivez scrupuleusement ses conseils.

#### Si vous avez pris plus de CORVASAL que vous n'auriez dû

Une baisse de la tension artérielle peut survenir. Prévenez immédiatement votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre CORVASAL

Le traitement doit être poursuivi normalement, sans tenir compte de la dose oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

PPV: 46 DH 70

2R637

04/22

03/2025

ments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables s'ils ne surviennent pas systématiquement

Une baisse de la tension artérielle en début de traitement paraît progressivement, une baisse de la tension artérielle lors du debout pouvant s'accompagner de vertiges, de maux de tête, de sensations de faiblesse, de démangeaisons.

Une diminution du nombre de plaquettes dans le sang

coïncides

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.