

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0059834

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6787 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Ayad Mohamed

Date de naissance : 01/05/86

Adresse : Salmi 2 Rue 16 J. 777 105

Tél. : 06 05 85 89 95 Total des frais engagés : 414,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur HAMID YASIR
Médecine Générale
Centre Had Hrara - Had Hrara
Province Safi Tél: 05 22 42 42 86

Date de consultation : 10/12/23

Nom et prénom du malade : Ayad Mohamed Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Abscu aual + de la maladie

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Safi Le : 10/12/23

Signature de l'adhérent(e) :

SAFIE ALLAL BEN ABDELLAH
MUPRAS

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant la Relève des Actes
10 Dec 2023	CA		152.00	DOCTEUR HANND Médecin Dentiste Centre Haute Marne Province Sainte Thérèse

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/12/23	264,60

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H	25533412 00000000	21433552 00000000	
D	00000000	00000000		
G	35533411	11433553		
B				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION			DATE DE L'EXECUTION

Docteur HAMID Yasir

Médecine Générale

Centre Had Harara - Had Harara

Province Safi

Tél : 05 24 64 24 88

Gsm : 06 66 46 64 78



الدكتور حامد ياسر

الطب العام

مركز حد حرارة - حد حرارة

إقليم آسفي

الهاتف : 05 24 64 24 88

المحمول : 06 66 46 64 78

Had Harara, le : في حد حرارة.

10 Dec 2023

M Ayad Nolamed

106,80

11 Financis 15 10

74,80

12 Septem Fe

22,40

13 x 21 ' 108
canaphine 500 mg

31,60

14 neurofisine 500 mg

29,00

15 Cyfer 500 mg
1 ml x 2

264,60



résultats de leurs urines permettent de déposer la présence de sucre dans les urines, et de leur sang appelle test de Combes. Si vous devez faire des tests :
• Informez la personne qui prévient l'échantillon que vous avez pris TRIAXON®
Si vous êtes diabétique ou que vous avez besoin d'une surveillance de votre glycémie, vous ne devez pas utiliser certains appareils de mesure qui pourraient évaluer votre glycémie de manière incorrecte pendant que vous recevez de la céftriaxone. Si vous utilisez ce type d'appareils, veillez les instructions d'utilisation et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Des méthodes alternatives de mesure peuvent être utilisées si nécessaire.

Enfant
Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmière avant l'administration de TRIAXON® chez votre enfant :
• Ille a récemment pris ou si vous devrez prendre un produit contenant du calcium à injecter dans la veine.

Autres médicaments et TRIAXON® 500mg/2ml et TRIAXON® 1g/3.5ml, poudre et solvant pour solution injectable IM
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec régularité pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

En particulier vous prenez l'un des médicaments suivants. Informez votre médecin ou votre pharmacien car ils peuvent interagir avec la céftriaxone :

• Un type d'antibiotique appelé aminoside;

• Un antibiotique appelé céphalosporine utilisée pour traiter les infections en particulier de la peau.

Un grand nombre de médicaments peuvent interagir avec la céftriaxone, entraînant une modification de leurs effets. Ces médicaments incluent :

• Des médicaments utilisés pour traiter les infections (clavulanic acide, erythromycine);

• Des médicaments utilisés dans le traitement des ulcères de l'estomac (par exemple, cimétidine);

• De puissants médicaments anti-ulcères comme la césolidine et la pénididine (analogues ou médicaments opiacés);

• De puissants médicaments utilisés pour traiter l'engorgement des battements cardiaques (par exemple, mexiletine, tocainide).

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament. Le médecin évaluera les bénéfices du traitement par TRIAXON® et les risques pour votre bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

TRIAZON® peut provoquer des étourdissements. Si vous avez la tête qui tourne ou avez des vertiges, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ni de machines. Si vous ressentez ces symptômes, parlez-en à votre médecin.

TRIAZON® 500 mg/2 ml et TRIAXON® 1g/3.5 ml poudre et solvant pour solution injectable IM contient du sodium. A tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, si ce n'est pas nécessaire.

3. COMMENT UTILISER TRIAXON® 500mg/2ml et TRIAXON® 1g/3.5ml, poudre et solvant pour solution injectable IM ?

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

TRIAZON® est habituellement administré par un médecin ou une infirmière. Il sera administré en injection directement dans un muscle. TRIAXON® est préparé par le médecin, le pharmacien ou l'infirmière et ne sera pas mélangé avec des injections contenant de calcium, ni administré en même temps que de telles injections. Dose habituelle

Votre médecin vous prescrira la dose appropriée de TRIAXON®. La dose dépend de la sévérité et du type d'infection, de la prise d'autres antibiotiques, de votre poids et de votre âge, ainsi que du fonctionnement de vos reins et de votre foie. Le nombre de jours ou de semaines pendant lesquels vous prenez TRIAXON® dépend du type d'infection que vous avez.

Adultes, patients âgés et enfants de 12 ans et plus, pesant 50 kilogrammes (kg) ou plus :

• 1 à 2 g une fois par jour, selon la sévérité et le type d'infection. Si vous avez une infection sévère, votre médecin vous donnera une dose plus élevée (jusqu'à 4 en une fois par jour). Si votre dose quotidienne est supérieure à 2 g, vous pourrez la recevoir en une dose unique, en une fois par jour ou en deux doses séparées.

Nouveaux-nés, nourrissons et enfants âgés de 15 à 12 mois pesant moins de 50 kg :

• 50 à 80 mg de TRIAXON® par kilogramme de poids corporel de l'enfant, en une fois par jour, selon la sévérité et le type d'infection. Si vous avez une infection sévère, votre médecin vous donnera une dose plus élevée, jusqu'à 100 mg par kilogramme de poids corporel, jusqu'à 4 g en une fois par jour au maximum. Si votre dose quotidienne est supérieure à 2 g, vous pourrez la recevoir en une dose unique, en une fois par jour ou en deux doses séparées.

• Les enfants pesant 50 kg ou plus doivent recevoir la dose habituelle de l'adulte.

Nouveaux-nés (0-14 jours)

• 20 à 50 mg de TRIAXON® par kilogramme de poids corporel de l'enfant, en une fois par jour, selon la sévérité et le type d'infection.

• La dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 50 mg par kg de poids corporel de l'enfant.

Personnes ayant des problèmes de foie et de rein

Vous pourrez prendre une dose différente de la dose habituelle. Votre médecin décrira la dose de TRIAXON® dont vous avez besoin, et vous surveillera attentivement en fonction de la gravité de votre problème de foie ou de rein.

Si vous avez utilisé plus de TRIAXON® 500 mg/2 ml et TRIAXON® 1g/3.5 ml, poudre et solvant pour solution injectable IM que vous n'auriez dû

Si vous recevez accidentellement une dose plus importante que la dose prescrite, contactez immédiatement votre médecin ou l'hôpital le plus proche.

Si vous oubliez d'utiliser TRIAXON® 500mg/2ml et TRIAXON® 1g/3.5 ml, poudre et solvant pour solution injectable IM.

Si vous oublié une injection, faites-vous faire cette injection le plus tôt possible. Cependant, si l'heure de l'injection suivante est très proche, ne pas faire faire l'injection oubliée. Ne prenez pas une double dose (deux injections en même temps) pour compenser celle que vous avez oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser TRIAXON® 500mg/2ml et TRIAXON® 1g/3.5ml, poudre et solvant pour solution injectable IM.

N'arrêtez pas d'utiliser TRIAXON® sauf si votre médecin vous dit de le faire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre infirmière.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne se surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent se produire avec ce médicament :

Réactions allergiques sévères (fréquence indéterminée, ne peut être évaluée à partir des données disponibles)

Si vous avez une réaction allergique sévère, consultez immédiatement un médecin.

Les signes peuvent inclure :

- un gonflement soutenu du visage, de la gorge, des lèvres ou de la bouche. Vous pourrez alors avoir du mal à respirer ou à avaler;
- un gonflement soutenu des mains, des pieds et des chevilles.

Éruptions cutanées sévères (fréquence indéterminée, ne peut être évaluée à partir des données disponibles)

Si vous avez une éruption cutanée sévère, contactez immédiatement un médecin.

- Les signes peuvent inclure une éruption cutanée sévère qui se développe rapidement, avec une formation de cloques ou la peau qui pèle, et éventuellement des cloques dans la bouche.

Principe actif :

Céftriaxone

500,00 mg

Sous forme de céftriaxone sodique

539,636 mg

Pour un flacon de poudre

Solvant : chlorhydrate de lidocaïne, solution d'hydroxyde de sodium 2 M, eau pour préparations injectables q.s.p 2 ml

Excipient à effet rotatoire : sodium

Que contient TRIAXON® 1g/3.5ml, poudre et solvant pour solution injectable IM ?

Prud'hom

Principe actif :

Céftriaxone

1000,00 mg

Sous forme de céftriaxone sodique

1079,27 mg

Pour un flacon de poudre

Solvant : chlorhydrate de lidocaïne, solution d'hydroxyde de sodium 2 M, eau pour préparations injectables q.s.p 3,5 ml

Excipient à effet rotatoire : sodium

Qu'est-ce que TRIAXON® 1g/3.5ml, poudre et solvant pour solution injectable IM, et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre et solvant pour solution injectable IM.

Boîte de 1 flacon de poudre et 1 ampoule de solvant de 2 ml.

Qu'est-ce que TRIAXON® 1g/3.5ml, poudre et solvant pour solution injectable IM, et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre et solvant pour solution injectable IM.

Boîte de 1 flacon de poudre et 1 ampoule de solvant de 3,5 ml

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM au Maroc:

COOPER

41, Rue Mohamed DOURI

20 110 Casablanca MAROC

Nom et adresse du fabricant

LPD-International TORLANT S.A

Ctra de Berlanga 135 B

08290 CERDANYOLA Del Valles

Barcelone - ESPAGNE

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : Septembre/2019

Conditions de prescription et de livraison

Tableau A (Liste I)

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRES

QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Toutefois, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de se diviser ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance. Il rend certains traitements antibiotiques inutiles.

La résistance s'acquiert par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inutile ce médicament, si vous ne respectez pas :

• le dosage à prendre;

• les moments de prise;

• la durée du traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2- Respectez strictement votre ordonnance.

3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

CECI EST UN MÉDICAMENT.

UN MÉDICAMENT N'EST PAS UN PRODUIT COMME LES AUTRES.

Il vous concerne, vous et votre santé;

le médicament est un produit actif;

Une longue recherche a permis de découvrir son activité, mais son absorption n'est pas toujours sans danger.

ne fait pas utiliser des médicaments qui ait son effet.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le dit votre médecin.

il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas.

Ne le reportez pas de votre有效期.

VOTRE PHARMACIEN CONNAIT LES MÉDICAMENTS : suivez ses conseils.

Il ne sagit pas pour vous de prendre beaucoup de médicaments en quantité importante.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

pertension artérielle ou une athérosclérose connue, la polyarthrite rhumatoïde ou l'endocardite (une infection du cœur). Les antécédents familiaux de prolongation de l'intervalle QT (anomalie observée au rythme électrique de l'activité cardiaque), si vous présentez un déséquilibre sanguin (en particulier les faibles concentrations de potassium ou de magnésium) ou avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si votre cœur est cardiaque, si vous avez déjà eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes personne âgée ou si vous prenez d'autres médicaments qui entraînent des modifications de l'ECG (voir la rubrique *Prise d'autres médicaments*). Certaines infections de l'appareil génital, votre médecin peut vous prescrire un association à **SEPCEN®**. Si aucune amélioration des symptômes n'est observée, veuillez consulter votre médecin.

CEN®

nt votre médecin, si l'un des troubles suivants se produit pendant que vous
médecin déterminera si le traitement par **SEPCEN®** doit être interrompu.
évere et soudaine (réaction/choc anaphylactique, œdème de Quincke). Dès lors,
un faible risque que vous présentiez une réaction allergique sévère, qui se
symptômes suivants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou
vertiges lors du passage en position debout. Si vous ressentez ces symptômes,
SEPCEN® et contactez immédiatement votre médecin.
aves, durables, invalidants et potentiellement irréversibles. Les médicaments
fluoroquinolone/quinolone, y compris **SEPCEN®**, ont été associés à des effets
mais graves, dont certains peuvent être persistants (durant des mois ou des
potentiellement irréversibles. Il s'agit notamment de douleurs dans les tendons,
culations des membres supérieurs et inférieurs, de difficultés à marcher, de
telles que des fourmillements, des picotements, des chatouilllements, une
sensation de brûlure (paresthesies), de troubles sensoriels incluant des troubles
odorat et de l'audition, d'une dépression, de troubles de la mémoire, d'une fatigue
sévères du sommeil.

Si ces effets indésirables après avoir pris SEPCEN®, contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin. Si ces effets indésirables persistent ou si d'autres effets indésirables apparaissent, contactez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin.

lement au niveau des articulations ou lors que l'inflammation ou une rupture des tendons dans de rares cas. Le risque est plus important si vous êtes âgé(e) (plus de 60 ans), si vous avez une greffe d'organe, si vous avez des problèmes rénaux ou si vous prenez des médicaments anti-inflammatoires. L'inflammation et les ruptures de tendons peuvent se produire dès le début du traitement et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt du traitement par SEPCEN®. Si vous ressentez de la douleur ou d'inflammation d'un tendon (par exemple au niveau de la cheville, de l'épaule ou du genou), arrêtez de prendre SEPCEN®, contactez votre médecin et suivez ses instructions.

teint au repos. Évitez tout effort inutile car cela pourrait augmenter le risque de douleurs soudaine et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos. Symptômes d'un anévrisme et d'une dissection aortiques, rendez-vous d'urgence d'un hôpital. Votre risque peut être augmenté si vous êtes traité(e) administrée par voie générale. Soudainement un essoufflement, en particulier lorsque vous vous allongez sur votre dos, un gonflement de vos chevilles, de vos pieds ou de votre abdomen, ou une palpitation cardiaque (sensation de battements de cœur rapides ou irréguliers). Votre médecin immédiatement.

risque ou d'autres affection neurologiques comme une ischémie cérébrale ou cérébral, des effets indésirables affectant le système nerveux central pourraient se produire. Dans ce cas, arrêtez de prendre **SEPCEN®** et contactez immédiatement votre médecin. Des symptômes d'atteinte nerveuse (neuropathie) tels que des douleurs, une perte des picotements, un engourdissement et/ou une faiblesse musculaire peuvent se produire au niveau des pieds et des jambes ou des mains et des bras. Dans ce cas, arrêtez de prendre **SEPCEN®** et informez-en immédiatement votre médecin afin de prévenir une évolution vers une affection neurologique.

triques peuvent se produire la première fois que vous prenez SEPCEN®. Si vous ou de psychose, vos symptômes pourraient s'aggraver lors du traitement par ce produit, arrêtez de prendre SEPCEN® et contactez immédiatement votre médecin. La famille des quinolones peuvent provoquer une augmentation de votre taux de glucose dans le sang (hyperglycémie), ou une diminution de votre taux de glucose dans le sang (hypoglycémie), en dessous de la valeur normale, pouvant entraîner une perte de conscience (comme dans les cas graves (voir rubrique 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?). Ceci tient en compte pour les patients diabétiques. Si vous êtes diabétique, votre taux de

diarrhées lorsque vous prenez des antibiotiques, notamment **SEPCEN®**, même si vous n'avez pas de symptômes. Si vous remarquez que vos selles contiennent du sang ou du mucus, arrêtez **SEPCEN®**, car votre vie pourrait être mise en danger. Ne prenez pas de médicament ou ralentir le transit intestinal et contactez votre médecin.

Si vous avez des difficultés de la vision ou si vos yeux semblent être autrement affectés, consultez un ophtalmologiste.

almogliste.
plus sensible au soleil ou aux rayons ultraviolets (UV) lorsque vous prenez
d'exposer de façon prolongée au soleil ou à des rayons UV artificiels que
bines de bronzage.
un prélevement de sang ou d'urine, prévenez le médecin ou le personnel du

ue vous prenez **SEPCEN®**.
problèmes rénaux, prévenez votre médecin car **la dose de SEPCEN® devra être réduite**.
neur des lésions hépatiques. Si vous remarquez des symptômes tels que : perte

Si ces symptômes persistent, si vous avez des difficultés d'assimilation, des douleurs dans l'estomac, des nausées, des vomissements, des diarrées, des urines foncées, des démangeaisons ou une sensibilité de l'estomac à la palpation, ENDO® et contactez immédiatement votre médecin.

infections. Si vous présentez une infection accompagnée d'une déterioration grave de votre état, ou de la fièvre accompagnée des douleurs dans la gorge/le pharynx/ la larynx, immédiatement votre médecin. Une analyse de sang éventuellement du nombre de globules blancs (agranulocytose) peut indiquer que vous prenez ce médicament.

Autres médicaments et SEPCEN® :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne prenez pas **SEPCEN®** en même temps que la tizanidine indésirable telles qu'une baisse de la pression artérielle et jamais **SEPCEN®** ».

Les médicaments suivants sont connus pour interagir avec SEPCEN® en même temps que ces médicaments peuvent. Cela pourrait également augmenter la probabilité de réactions indésirables. Prévenez votre médecin si vous prenez :

- Des antivitamines K (exemple : la warfarine) ou d'sang).
 - Du probénécide (utilisé pour traiter la goutte).
 - Du méthotrexate (utilisé pour traiter certains types de la théophylline (utilisée pour traiter les problèmes de la tizanidine (utilisée pour traiter les problèmes plaques).
 - Olanzapine (un antipsychotique).
 - De la clozapine (un antipsychotique).
 - Du ropinirole (utilisé pour traiter la maladie de Parkinson).
 - De la phénytoïne (utilisée pour traiter l'épilepsie).
 - Du métoclopramide (utilisé dans les nausées et les vomissements).
 - Ciclosporine (utilisée dans les maladies de peau, d'organe).
 - Glibenclamide (utilisé dans le diabète).
 - Autres médicaments pouvant modifier votre rythme cardiaque ou vos rythmes cardiaques :
 - groupes des antiarythmiques (par exemple, la quinidine, le sotalol, le dofetilide, l'ibutilide), les antidépresseurs tricycliques (par exemple, le clomipramine), certains médicaments pour le rhume des foins, certains médicaments pour les troubles de sommeil).
 - Zolpidem (utilisé dans les troubles de sommeil).
 - SEPCEN® peut augmenter la concentration des médicaments dans le sang.
 - La peritoneal (utilisée pour traiter les troubles de la circulation sanguine dans les maladies cardiaques ou les maladies pulmonaires).
 - La caféine.
 - Duloxétine (utilisée dans la dépression, les atteintes urinaires).
 - Lidocaine (utilisée dans les maladies cardiaques ou les maladies pulmonaires).
 - Sildénafil (par exemple, dans les troubles de l'érection).
 - Agomélatine (utilisée dans la dépression).

Certains médicaments atténuent les effets de SEP. Envisez de prendre :

 - Des antacides.
 - L'omeprazole
 - Des compléments minéraux.
 - Du sucralfate.

- Un chélateur polymérique du phosphate (par ex., le
- Des médicaments ou des compléments contenant c

- S'il est essentiel pour vous de prendre ces médicaments ou quatre heures après ces médicaments.
SEPCEN® avec des aliments et boissons

Si vous prenez SEPCEN® en dehors des repas, ne c

ou des yaourts) ou des boissons

produits peuvent altérer l'absorption de la substance.

Il est préférable d'éviter d'utiliser SEPCEN® pendant la grossesse. Ne prenez pas SEPCEN® pendant l'allaitement parce que

pourrait nuire à la santé de votre enfant.

- **Effets sur la capacité de conduire et l'utilisation de SEPSEN®** peut diminuer votre niveau de vigilance. produire. Assurez-vous donc de savoir comment utiliser

produire. Assurez-vous donc de savoir comment à véhiculer ou d'utiliser des machines. En cas de doute,

• Informations importantes concernant certains :

Call for subjects

3. COMMENT PRENDRE SEPCEN® ?
Votre médecin vous expliquera précisément quelle fréquence et pendant combien de temps. Cela dépend. Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes.

éventuellement être adaptée. Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours. Respectez toujours la posologie indiquée par votre

a. Avalez les comprimés avec une grande quantité de

mauvais goût.
b. Essayez de prendre les comprimés à peu près à la c. Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou repas n'a pas d'incidence grave sur l'effet du médicament SEPCEN® avec des produits laitiers de type lait ou yaourt.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg
Boîte de 10 comprimés b^llliculés
D.C.I : Ciprofloxacine

22 23 24 25 26 27

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

- Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **SEPCEN®** et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **SEPCEN®** ?
 3. Comment prendre **SEPCEN®** ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver **SEPCEN®** ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Chez l'adulte :

chez l'adulte. SEPCENO® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- infections des voies respiratoires.
 - infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
 - infections urinaires.
 - infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
 - infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
 - infections de la peau et des tissus mous.
 - Infections des os et des articulations.
 - Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
 - Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
 - Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
 - Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

• Ne prenez jamais SEPCEN® :

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans **SEPGEN®** (voir rubrique 6).
 - Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

- **Mise en garde et précaution d'emploi :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adresssez-vous à votre médecin avant de prendre **SEPCEN®** :

- Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
 - Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
 - Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que **SEPCEN** ;

SEPCEN® :

- Si vous êtes diabétique car ce que la ciméflouxine risque de vous occasionner une hypertension artérielle
- Si vous souffrez de l'aggravation des symptômes
- Si vous savez que le glucose-6-phosphatase est bas
- Si vous avez reçu un anévrisme aortique
- Si vous avez déjà eu une valvulopathie cardiaque
- Si vous présentez des prédispositions (par exemple le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules naines, la

74,80

LIT: 103,8

PIR: 67/212

PVV: 74,80 DH

maladie de Behcet, l'hépatite, une maladie des articulations, etc. Si vous avez des problèmes né(e) avec ou avez mal au cœur, l'ECG, qui est un enregistrement des électrolytiques dans le sang (ou dans le sang), si vous avez des problèmes d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance respiratoire, une femme ou un homme qui a des anomalies au niveau des reins, pour le traitement de certaines maladies, il faut prendre autre antibiotique en association avec l'antibiotique. Après 3 jours de traitement par l'antibiotique, il faut faire une ECG.

Pendant la prise de SEP

Prévenez immédiatement

Une surveillance clinique particulière s'impose chez les patients ayant préalablement présenté une réaction cutanée associée à la prise de fluconazole ou un autre dérivé azolé. Le patient devra être informé qu'en cas de survenue de lésions bulleuses, le fluconazole devra être immédiatement arrêté et qu'il devra consulter un médecin le plus rapidement possible.

Les azolés, dont le fluconazole, ont été associés à un allongement de l'intervalle QT sur l'électrocardiogramme.

Dans les études de surveillance post-marketing chez des patients traités par fluconazole, de rares cas d'allongement de l'intervalle QT ainsi que des torsades de pointes ont été rapportés.

Ces notifications font état de patients présentant des pathologies lourdes et de nombreux autres facteurs de risque notamment un allongement congénital du QT, des désordres électrolytiques ou certains traitements associés susceptibles d'y contribuer.

Le fluconazole devra être administré avec précaution chez les patients présentant des conditions pro-arythmogènes.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Consulter le médecin ou le pharmacien pour tout éclaircissement concernant l'utilisation du médicament.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament ne doit pas être utilisé en association avec le cisapride (médicament utilisé dans le reflux gastro-œsophagien) et le pimozide (médicament utilisé dans certains troubles de l'humeur).

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment l'halofantrine (médicament utilisé dans le traitement du paludisme), même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

EFFETS INDESIRABLES:

Les effets gastro-intestinaux et cutanés sont les effets indésirables les plus couramment rencontrés.

Troubles gastro-intestinaux : nausées, flatulence, douleurs abdominales, diarrhées.

Troubles de la peau et des tissus : rashes, réactions cutanées sévères à type de toxidermies bulleuses (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, en particulier au cours du SIDA). Des cas d'alopecies généralement réversibles ont été rapportés.

Troubles du système nerveux : céphalées pouvant être éventuellement liées au produit.

Troubles hépato-Biliaires : augmentation des transaminases hépatiques généralement réversibles à l'arrêt du traitement, des atteintes hépatiques sévères éventuellement associées à des taux sériques élevés de fluconazole, d'évolution parfois fatale, ont été exceptionnellement rapportées.

Troubles sanguins et du système lymphatique : leucopénies (neutropénies, agranulocytose), thrombopénies.

Troubles du système immunitaire : réactions anaphylactiques.

Troubles cardiaques : de rares cas d'allongement de l'intervalle QT et torsades de pointes.

POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION:

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin

CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants

CONDITIONS DE DELIVRANCE :

Liste I

PEREMPTION :

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A19332 FXT 3



Laboratoires Pharmaceutiques Pharma 5

21, Rue des Asphodèles - Casablanca

Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

CANAFLUCAN®

FLUCONAZOL

FORMES ET PRÉSENTATION

Gélule à 150 mg : Boîte de 1, 2, 3, 4, et 7 gélules

Gélule à 50 mg : Boîte de 3 et 7 gélules

COMPOSITION

Fluconazole (DCI)	150 mg
Excipients q.s.p.	1 gélule
Fluconazole (DCI)	50 mg
Excipient q.s.p.	1 gélule
Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté	

PROPRIÉTÉ

PROPRIÉTÉS Le fluconazole est un agent antifongique bis-triazolé utilisable par voie orale.

INDICATIONS

INDICATIONS

Chez l'adulte pour le

- Traitement des candidoses oropharyngées chez les patients immunodéprimés soit en raison d'une affection maligne, soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA),
 - Traitement des candidoses buccales atrophiques.

Chez l'enfant pour le

- Traitement des candidoses oropharyngées chez l'enfant immunodéprimé.
 - Traitement des candidoses systémiques, incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), candidoses œsophagiennes et candidoses urinaires.
 - Traitement des cryptococcoses neuro-méningées ; le traitement d'entretien au cours du SIDA doit être poursuivi indéfiniment.

Le fluconazole dosé à 150 mg est indiqué pour le traitement des

- Candidoses vaginales et périnéales aiguës et récidivantes.
 - Balanites candidosiques
 - Dermoépidermomycoses incluant les tinea pedis (intertrigo interorteils), les tinea corporis (Herpès circiné), les tinea cruris (intertrigo) et les candidoses cutanées.
 - Onychomycoses
 - Candidoses buccales atrophiques
 - Cryptococcoses neuro-méningées : Traitement d'attaque : son efficacité a été démontrée principalement chez les patients atteints du SIDA. Le fluconazole est également indiqué dans le traitement d'entretien des cryptococcoses chez les patients atteints du SIDA. Il doit alors être prescrit indéfiniment.
 - Candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et candidoses urinaires.
 - Prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

CONTRE INDICATIONS

Le fluconazole ne doit pas être administré dans les cas suivants

- Hypersensibilité au fluconazole et/ou à d'autres dérivés azolés,
 - Chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique
 - Grossesse et allaitement,
 - En association avec:
 - le cisapride,
 - le pimozide.

Ce médicament est générale

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Chez les patients présentant que lorsqu'une pathologie se hépatiques est conseillée; l'a

d'aggravation d'une anomalie. Le patient devra être informé d'atteinte hépatique grave (as vomissements, ictere) le traitement arrêté et qu'il devra consulter

LOT : 3243
PER : 03 - 26
P.P.V : 22 DH 40

Pevagine®

Nitrate d'Econazole.

Composition :

Produits Composition	PEVAGINE® Ovule	PEVAGINE® Crème
Nitrate d'Econazole	150 mg	1 g
Excipients q.s.p	1 ovule	100 g

Propriétés :

Nitrate d'Econazole est un dérivé imidazolé à action antifongique possédant un spectre d'action extrêmement large : il est actif, *in vitro* sur pratiquement tous les champignons pathogènes ainsi que sur les bactéries gram positif.

Indications :

Pevagine est indiqué dans le pityriasis versicolor, les candidoses, les dermatophytoses de la peau glabre et des plis.

Pevagine ovules est indiqué dans le traitement des mycoses vaginales, surinfectées ou non par des bactéries.

Son activité sur les bactéries gram+ en indique l'usage en monothérapie dans les dermatomycoses surinfectées.

Contre-indications :

Hypersensibilité au nitrate d'econazole.

Effets indésirables :

Rares: sensation de brûlures, prurit et rougeur de la peau.

Posologie :

- Crème dermique :

application matin et soir ~~en massage doux jusqu'à pénétration complète.~~

- Ovules gynécologiques

1 Ovule à introduire prof

3460

au coucher.

Présentations :

- Crème dermique : tube

- Ovules gynécologiques

150mg.

azole.

ues dosées à

Crème: A conserver à un

Ovules: A conserver à une température inférieure à 30 °C.

بفاجين®

نيترات إيكونازول

التركيب :

بفاجين دهن	بفاجين حمولات نسائية	الشكل المكونات
1 غرام	150 مغ	نيترات إيكونازول
كمية كافية لـ 100 غرام	كمية كافية لحمولة واحدة	سواغ

الخواص :

مشتقت إيميدازولي ذو مفعول مضاد للفطريات ويتوفر على طيف ذا فعالية جد متسعة وهو فعال على سائر الفطريات المعلنة وكذا على الباكتيريات من صنف غرام إيجابي.

داعي الاستعمال :

يشار باستعمال بفاجين في النخالية المنشقة أو المثلونة، في داء المبيضات، في الفطر الجلدي بالجلد الأملس والغضون.

بفاجين حمولات يستعمل في داء الفطريات في الجهاز التناسلي المصحوبة بالتعفن البكتيري أو لا.

ومفعوله على باكتيريات غرام إيجابي (+) يجعل استعماله كاف لوحده لمعالجة الفطريات الجلدية الملوثة.

موانع الاستعمال :

الحساسية المفرطة لنيترات إيكونازول

الأثار الجانبية :

نادرة: حكة، واحمرار الجلد.

المقادرات :

- الدهن الجلدي : استعمال محلى في الصباح والمساء بواسطة ذلك لطيف.

- الحمولات الخاصة بأمراض النساء : حمولة واحدة تتحمّم بداخل الفرج مساء عند النوم.

التقديم :

- الدهن الجلدي : أنبوبة بها 30 غرام.

- الحمولات الخاصة بأمراض النساء : علبة بها 3 حمولات.

الدهن : يحتفظ به في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

الحمولات : يحتفظ بها في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.