

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3449

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : TOUARGA Mostafa

Date de naissance : 1953

Adresse : Rue Houmt Bay Ille 2577 casa

Tél. : 0666047766 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr. Najia SOBHI**  
Médecine Générale  
Rue 59, N°1 Hay El Farah  
Tel. 0522 80 87 17 - Casab

Date de consultation : 06/12/2013

Nom et prénom du malade : Touarga Mostafa Age :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté : *Touarga Mostafa*

Nature de la maladie : *FITAT APPART. DENTAL*


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05				
12	C			
2009				
			1000 Dhs	Dr. Nabil BOBHI Médecin Généraliste 59, N° 1 Hay El Farah 122800717 - Casab

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE IFNI DR. ALAMI KARIMA mm. Wafa Bank Amd Rue IFNI et Bd Med VADIL	26/12/23	1178.20

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

### **(Création, remont, adjonction)**

Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth (1 through 8) on both the upper and lower arches. A coordinate system is overlaid, with the vertical axis labeled 'H' at the top, the horizontal axis labeled 'D' on the left, and the diagonal axis labeled 'B' at the bottom right. The teeth are arranged in a curve, with the first molar on the left and the second molar on the right of the curve.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur SOBHI NAJIA

Ex. Médecin Interne de l'Hôpital de  
Gisors France

## MEDECINE GENERALE

Rue 59, N°1, Hay El Farah  
- Casablanca -  
Tél.: 05 22 80 87 17

# الدكتورة نجية صبّي

طبيبة سابقاً بمستشفى  
جزور فرنسا

## الطب العام

زنقة 59، أمام المقاطعة 22، حي الفرج  
- الدار البيضاء -  
الهاتف : 05 22 80 87 17

Casablanca, le : 06/12/2023 الدار البيضاء، في

Touarga Hustaffel.

126,00 x 3 Dallal 200 mg 30 1292

378

144,50 Cefal 20

45

147,60 Cefal 20

45

14,00 Difl 10

45

129,00 x 3 Panoselis 20/300

45

387

1291

35,70 x 3 Alpraz 20/300

1292

107,1

1293

T. 1178,20

PHARMACIE IFNI  
DR. ALAMI KARIMA  
71mm. Kefla 200 mg 30  
IFNI MEDICAL CASABLANCA  
Tel: 05 22 44 94 66

45

45

45

1291

45

1292

Dr. Najia SOBHI  
Médecine Générale  
Rue 59, N°1 Hay El Farah  
Tel: 05 22 80 87 17 - Casa

# Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

PPV: 14DH00

PER: 03/24

LOT: K893

1g, sous forme de paracétamol DC 90 -

à sodique, providone K30, amidon de  
ségestéale).

mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL

t indiqué en cas de douleur et/ou fièvre  
douleurs dentaires, courbatures, règles  
et par votre médecin dans les douleurs



Cette boîte est destinée aux adultes (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol.  
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?**

**Contre-indications :**

**Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants :**  
allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

**PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :**

**Précautions Particulières :**

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

**Mises en garde :**

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

**Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").**

**Grossesse et allaitement :**

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.







# DIPREZAR®

Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé, boîte de 30

PPV 126DH00  
PER 03/24  
LOT K657



ce médicament car elle contient des informations

lire.  
nations à votre médecin ou à votre pharmacien,  
le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur  
pas aux vôtres.  
émergue un effet indésirable non mentionné dans  
cien.

ers pelliculés et dans quels cas est-il utilisé ?  
prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés  
nprimés pelliculés ?

Comprimés pelliculés ?

**1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**  
Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - code ATC C09DA01  
DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II avec ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.  
DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?**

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibactériens tels que le cétomoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin).
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® en début de grossesse, voir rubrique « Grossesse »).
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'alsikrena.

EN CAS DE DOUCE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés :

**Mises en garde et précautions particulières d'emploi :**

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être [ou susceptible de devenir] enceinte, DIPREZAR® est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé »).
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales [sténose artérielle rénale] ou avez un rein fonctionnel unique et que vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque).
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale [rétrécissement des valves du cœur] ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez eu des goutte.
- Si vous avez ou avez des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et la fièvre [lupus érythémateux disséminé].
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou si vous allez faire des tests pour vérifier votre fonction thyroïdienne, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hydrocortisone/cétoïdésone primaire [un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostéron et à une anomalie des glandes surrenales].
- Si vous prenez un ou des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle élevée :
- Un IEC (par exemple enalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux liés au diabète.
- Un aliskrena.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle, et les taux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.

Les patients qui prennent de l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments peuvent être au risque de cancer de la peau non mélanome et/ou de cancer de la peau. Afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées par un diagnostique histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il est recommandé d'éviter les rayons UV et d'avoir une protection adéquate. L'utilisation d'HCTZ doit aussi être réexaminiée avec une surveillance régulière de la peau.

Vous également la rubrique « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30 ».

**Enfants et adolescents :**

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® chez les enfants. Il n'y a pas été donné aux enfants.

Autres médicaments et DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide sont des médicaments couramment utilisés.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être utilisées avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg.

La surveillance étroite de votre médecin devrait être maintenue.

Des précautions particulières (telles que contrôles supplémentaires, potassiques, substituts de sel contenant potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs) peuvent être nécessaires pour contrôler le rythme cardiaque ou il est aussi important pour votre médecin de savoir :

- D'autres médicaments pour abaisser votre pression artérielle.
- Des stéroïdes.
- Des médicaments pour le traitement du cancer.
- Des antalgiques.
- Des médicaments pour le traitement d'infection.
- Des médicaments contre l'arthrose.
- Des médicaments pour lutter contre un taux imbalancé de sel.
- Des médicaments myorelaxants.
- Des somnifères.
- Des opioïdes tels que la morphine.
- Des « amines pressives » telles que l'adrénaline.
- Des médicaments antidiabétiques oraux ou des insulines.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés ou à l'ajuster.

Informez aussi votre médecin que vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés et recevez des produits de contraste iodés.

**DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés :**

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en prenant DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés.

Des augmentations excessives de sel dans l'alimentation peuvent entraîner des déhors des repas.

**Grossesse et allaitement :**

Vous devrez informer votre médecin si vous pensez que vous êtes enceinte. Votre pharmacien vous recommandera normalement d'arrêter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés.

Si vous prenez DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés, il est déconseillé pendant les 3 derniers mois de la grossesse car cela pourraient nuire à votre enfant.

Informez votre médecin si vous allitez ou êtes enceinte. Il est déconseillé pour les femmes qui allaitent et votrez souhaitera allaiter.

**Sportifs :**

Le diurétique contenu dans ce médicament peut entraîner un contrôle antidopage.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines :**

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, attention particulière (telles que la conduite d'un véhicule) devra être prise car vous pouvez comment vous tolérez ce médicament.

**DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés :**

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance au médicament.

**3. COMMENT PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg :**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien la posologie appropriée de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés.

Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pour permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

**Hypertension :**

La posologie habituelle pour la plupart des patients est de 1 comprimé par jour pour contrôler votre pression artérielle. 2,5 mg une fois par jour, 5 mg une fois par jour, 10 mg une fois par jour, 15 mg une fois par jour, 20 mg une fois par jour, 25 mg une fois par jour, 30 mg une fois par jour, 35 mg une fois par jour, 40 mg une fois par jour, 45 mg une fois par jour, 50 mg une fois par jour, 55 mg une fois par jour, 60 mg une fois par jour, 65 mg une fois par jour, 70 mg une fois par jour, 75 mg une fois par jour, 80 mg une fois par jour, 85 mg une fois par jour, 90 mg une fois par jour, 95 mg une fois par jour, 100 mg une fois par jour, 105 mg une fois par jour, 110 mg une fois par jour, 115 mg une fois par jour, 120 mg une fois par jour, 125 mg une fois par jour, 130 mg une fois par jour, 135 mg une fois par jour, 140 mg une fois par jour, 145 mg une fois par jour, 150 mg une fois par jour, 155 mg une fois par jour, 160 mg une fois par jour, 165 mg une fois par jour, 170 mg une fois par jour, 175 mg une fois par jour, 180 mg une fois par jour, 185 mg une fois par jour, 190 mg une fois par jour, 195 mg une fois par jour, 200 mg une fois par jour, 205 mg une fois par jour, 210 mg une fois par jour, 215 mg une fois par jour, 220 mg une fois par jour, 225 mg une fois par jour, 230 mg une fois par jour, 235 mg une fois par jour, 240 mg une fois par jour, 245 mg une fois par jour, 250 mg une fois par jour, 255 mg une fois par jour, 260 mg une fois par jour, 265 mg une fois par jour, 270 mg une fois par jour, 275 mg une fois par jour, 280 mg une fois par jour, 285 mg une fois par jour, 290 mg une fois par jour, 295 mg une fois par jour, 300 mg une fois par jour, 305 mg une fois par jour, 310 mg une fois par jour, 315 mg une fois par jour, 320 mg une fois par jour, 325 mg une fois par jour, 330 mg une fois par jour, 335 mg une fois par jour, 340 mg une fois par jour, 345 mg une fois par jour, 350 mg une fois par jour, 355 mg une fois par jour, 360 mg une fois par jour, 365 mg une fois par jour, 370 mg une fois par jour, 375 mg une fois par jour, 380 mg une fois par jour, 385 mg une fois par jour, 390 mg une fois par jour, 395 mg une fois par jour, 400 mg une fois par jour, 405 mg une fois par jour, 410 mg une fois par jour, 415 mg une fois par jour, 420 mg une fois par jour, 425 mg une fois par jour, 430 mg une fois par jour, 435 mg une fois par jour, 440 mg une fois par jour, 445 mg une fois par jour, 450 mg une fois par jour, 455 mg une fois par jour, 460 mg une fois par jour, 465 mg une fois par jour, 470 mg une fois par jour, 475 mg une fois par jour, 480 mg une fois par jour, 485 mg une fois par jour, 490 mg une fois par jour, 495 mg une fois par jour, 500 mg une fois par jour, 505 mg une fois par jour, 510 mg une fois par jour, 515 mg une fois par jour, 520 mg une fois par jour, 525 mg une fois par jour, 530 mg une fois par jour, 535 mg une fois par jour, 540 mg une fois par jour, 545 mg une fois par jour, 550 mg une fois par jour, 555 mg une fois par jour, 560 mg une fois par jour, 565 mg une fois par jour, 570 mg une fois par jour, 575 mg une fois par jour, 580 mg une fois par jour, 585 mg une fois par jour, 590 mg une fois par jour, 595 mg une fois par jour, 600 mg une fois par jour, 605 mg une fois par jour, 610 mg une fois par jour, 615 mg une fois par jour, 620 mg une fois par jour, 625 mg une fois par jour, 630 mg une fois par jour, 635 mg une fois par jour, 640 mg une fois par jour, 645 mg une fois par jour, 650 mg une fois par jour, 655 mg une fois par jour, 660 mg une fois par jour, 665 mg une fois par jour, 670 mg une fois par jour, 675 mg une fois par jour, 680 mg une fois par jour, 685 mg une fois par jour, 690 mg une fois par jour, 695 mg une fois par jour, 700 mg une fois par jour, 705 mg une fois par jour, 710 mg une fois par jour, 715 mg une fois par jour, 720 mg une fois par jour, 725 mg une fois par jour, 730 mg une fois par jour, 735 mg une fois par jour, 740 mg une fois par jour, 745 mg une fois par jour, 750 mg une fois par jour, 755 mg une fois par jour, 760 mg une fois par jour, 765 mg une fois par jour, 770 mg une fois par jour, 775 mg une fois par jour, 780 mg une fois par jour, 785 mg une fois par jour, 790 mg une fois par jour, 795 mg une fois par jour, 800 mg une fois par jour, 805 mg une fois par jour, 810 mg une fois par jour, 815 mg une fois par jour, 820 mg une fois par jour, 825 mg une fois par jour, 830 mg une fois par jour, 835 mg une fois par jour, 840 mg une fois par jour, 845 mg une fois par jour, 850 mg une fois par jour, 855 mg une fois par jour, 860 mg une fois par jour, 865 mg une fois par jour, 870 mg une fois par jour, 875 mg une fois par jour, 880 mg une fois par jour, 885 mg une fois par jour, 890 mg une fois par jour, 895 mg une fois par jour, 900 mg une fois par jour, 905 mg une fois par jour, 910 mg une fois par jour, 915 mg une fois par jour, 920 mg une fois par jour, 925 mg une fois par jour, 930 mg une fois par jour, 935 mg une fois par jour, 940 mg une fois par jour, 945 mg une fois par jour, 950 mg une fois par jour, 955 mg une fois par jour, 960 mg une fois par jour, 965 mg une fois par jour, 970 mg une fois par jour, 975 mg une fois par jour, 980 mg une fois par jour, 985 mg une fois par jour, 990 mg une fois par jour, 995 mg une fois par jour, 1000 mg une fois par jour, 1005 mg une fois par jour, 1010 mg une fois par jour, 1015 mg une fois par jour, 1020 mg une fois par jour, 1025 mg une fois par jour, 1030 mg une fois par jour, 1035 mg une fois par jour, 1040 mg une fois par jour, 1045 mg une fois par jour, 1050 mg une fois par jour, 1055 mg une fois par jour, 1060 mg une fois par jour, 1065 mg une fois par jour, 1070 mg une fois par jour, 1075 mg une fois par jour, 1080 mg une fois par jour, 1085 mg une fois par jour, 1090 mg une fois par jour, 1095 mg une fois par jour, 1100 mg une fois par jour, 1105 mg une fois par jour, 1110 mg une fois par jour, 1115 mg une fois par jour, 1120 mg une fois par jour, 1125 mg une fois par jour, 1130 mg une fois par jour, 1135 mg une fois par jour, 1140 mg une fois par jour, 1145 mg une fois par jour, 1150 mg une fois par jour, 1155 mg une fois par jour, 1160 mg une fois par jour, 1165 mg une fois par jour, 1170 mg une fois par jour, 1175 mg une fois par jour, 1180 mg une fois par jour, 1185 mg une fois par jour, 1190 mg une fois par jour, 1195 mg une fois par jour, 1200 mg une fois par jour, 1205 mg une fois par jour, 1210 mg une fois par jour, 1215 mg une fois par jour, 1220 mg une fois par jour, 1225 mg une fois par jour, 1230 mg une fois par jour, 1235 mg une fois par jour, 1240 mg une fois par jour, 1245 mg une fois par jour, 1250 mg une fois par jour, 1255 mg une fois par jour, 1260 mg une fois par jour, 1265 mg une fois par jour, 1270 mg une fois par jour, 1275 mg une fois par jour, 1280 mg une fois par jour, 1285 mg une fois par jour, 1290 mg une fois par jour, 1295 mg une fois par jour, 1300 mg une fois par jour, 1305 mg une fois par jour, 1310 mg une fois par jour, 1315 mg une fois par jour, 1320 mg une fois par jour, 1325 mg une fois par jour, 1330 mg une fois par jour, 1335 mg une fois par jour, 1340 mg une fois par jour, 1345 mg une fois par jour, 1350 mg une fois par jour, 1355 mg une fois par jour, 1360 mg une fois par jour, 1365 mg une fois par jour, 1370 mg une fois par jour, 1375 mg une fois par jour, 1380 mg une fois par jour, 1385 mg une fois par jour, 1390 mg une fois par jour, 1395 mg une fois par jour, 1400 mg une fois par jour, 1405 mg une fois par jour, 1410 mg une fois par jour, 1415 mg une fois par jour, 1420 mg une fois par jour, 1425 mg une fois par jour, 1430 mg une fois par jour, 1435 mg une fois par jour, 1440 mg une fois par jour, 1445 mg une fois par jour, 1450 mg une fois par jour, 1455 mg une fois par jour, 1460 mg une fois par jour, 1465 mg une fois par jour, 1470 mg une fois par jour, 1475 mg une fois par jour, 1480 mg une fois par jour, 1485 mg une fois par jour, 1490 mg une fois par jour, 1495 mg une fois par jour, 1500 mg une fois par jour, 1505 mg une fois par jour, 1510 mg une fois par jour, 1515 mg une fois par jour, 1520 mg une fois par jour, 1525 mg une fois par jour, 1530 mg une fois par jour, 1535 mg une fois par jour, 1540 mg une fois par jour, 1545 mg une fois par jour, 1550 mg une fois par jour, 1555 mg une fois par jour, 1560 mg une fois par jour, 1565 mg une fois par jour, 1570 mg une fois par jour, 1575 mg une fois par jour, 1580 mg une fois par jour, 1585 mg une fois par jour, 1590 mg une fois par jour, 1595 mg une fois par jour, 1600 mg une fois par jour, 1605 mg une fois par jour, 1610 mg une fois par jour, 1615 mg une fois par jour, 1620 mg une fois par jour, 1625 mg une fois par jour, 1630 mg une fois par jour, 1635 mg une fois par jour, 1640 mg une fois par jour, 1645 mg une fois par jour, 1650 mg une fois par jour, 1655 mg une fois par jour, 1660 mg une fois par jour, 1665 mg une fois par jour, 1670 mg une fois par jour, 1675 mg une fois par jour, 1680 mg une fois par jour, 1685 mg une fois par jour, 1690 mg une fois par jour, 1695 mg une fois par jour, 1700 mg une fois par jour, 1705 mg une fois par jour, 1710 mg une fois par jour, 1715 mg une fois par jour, 1720 mg une fois par jour, 1725 mg une fois par jour, 1730 mg une fois par jour, 1735 mg une fois par jour, 1740 mg une fois par jour, 1745 mg une fois par jour, 1750 mg une fois par jour, 1755 mg une fois par jour, 1760 mg une fois par jour, 1765 mg une fois par jour, 1770 mg une fois par jour, 1775 mg une fois par jour, 1780 mg une fois par jour, 1785 mg une fois par jour, 1790 mg une fois par jour, 1795 mg une fois par jour, 1800 mg une fois par jour, 1805 mg une fois par jour, 1810 mg une fois par jour, 1815 mg une fois par jour, 1820 mg une fois par jour, 1825 mg une fois par jour, 1830 mg une fois par jour, 1835 mg une fois par jour, 1840 mg une fois par jour, 1845 mg une fois par jour, 1850 mg une fois par jour, 1855 mg une fois par jour, 1860 mg une fois par jour, 1865 mg une fois par jour, 1870 mg une fois par jour, 1875 mg une fois par jour, 1880 mg une fois par jour, 1885 mg une fois par jour, 1890 mg une fois par jour, 1895 mg une fois par jour, 1900 mg une fois par jour, 1905 mg une fois par jour, 1910 mg une fois par jour, 1915 mg une fois par jour, 1920 mg une fois par jour, 1925 mg une fois par jour, 1930 mg une fois par jour, 1935 mg une fois par jour, 1940 mg une fois par jour, 1945 mg une fois par jour, 1950 mg une fois par jour, 1955 mg une fois par jour, 1960 mg une fois par jour, 1965 mg une fois par jour, 1970 mg une fois par jour, 1975 mg une fois par jour, 1980 mg une fois par jour, 1985 mg une fois par jour, 1990 mg une fois par jour, 1995 mg une fois par jour, 2000 mg une fois par jour, 2005 mg une fois par jour, 2010 mg une fois par jour, 2015 mg une fois par jour, 2020 mg une fois par jour, 2025 mg une fois par jour, 2030 mg une fois par jour, 2035 mg une fois par jour, 2040 mg une fois par jour, 2045 mg une fois par jour, 2050 mg une fois par jour, 2055 mg une fois par jour, 2060 mg une fois par jour, 2065 mg une fois par jour, 2070 mg une fois par jour, 2075 mg une fois par jour, 2080 mg une fois par jour, 2085 mg une fois par jour, 2090 mg une fois par jour, 2095 mg une fois par jour, 2100 mg une fois par jour, 2105 mg une fois par jour, 2110 mg une fois par jour, 2115 mg une fois par jour, 2120 mg une fois par jour, 2125 mg une fois par jour, 2130 mg une fois par jour, 2135 mg une fois par jour, 2140 mg une fois par jour, 2145 mg une fois par jour, 2150 mg une fois par jour, 2155 mg une fois par jour, 2160 mg une fois par jour, 2165 mg une fois par jour, 2170 mg une fois par jour, 2175 mg une fois par jour, 2180 mg une fois par jour, 2185 mg une fois par jour, 2190 mg une fois par jour, 2195 mg une fois par jour, 2200 mg une fois par jour, 2205 mg une fois par jour, 2210 mg une fois par jour, 2215 mg une fois par jour, 2220 mg une fois par jour, 2225 mg une fois par jour, 2230 mg une fois par jour, 2235 mg une fois par jour, 2240 mg une fois par jour, 2245 mg une fois par jour, 2250 mg une fois par jour, 2255 mg une fois par jour, 2260 mg une fois par jour, 2265 mg une fois par jour, 2270 mg une fois par jour, 2275 mg une fois par jour, 2280 mg une fois par jour, 2285 mg une fois par jour, 2290 mg une fois par jour, 2295 mg une fois par jour, 2300 mg une fois par jour, 2305 mg une fois par jour, 2310 mg une fois par jour, 2315 mg une fois par jour, 2320 mg une fois par jour, 2325 mg une fois par jour, 2330 mg une fois par jour, 2335 mg une fois par jour, 2340 mg une fois par jour, 2345 mg une fois par jour, 2350 mg une fois par jour, 2355 mg une fois par jour, 2360 mg une fois par jour, 2365 mg une fois par jour, 2370 mg une fois par jour, 2375 mg une fois par jour, 2380 mg une fois par jour, 2385 mg une fois par jour, 2390 mg une fois par jour, 2395 mg une fois par jour, 2400 mg une fois par jour, 2405 mg une fois par jour, 2410 mg une fois par jour, 2415 mg une fois par jour, 2420 mg une fois par jour, 2425 mg une fois par jour, 2430 mg une fois par jour, 2435 mg une fois par jour, 2440 mg une fois par jour, 2445 mg une fois par jour, 2450 mg une fois par jour, 2455 mg une fois par jour, 2460 mg une fois par jour, 2465 mg une fois par jour, 2470 mg une fois par jour, 2475 mg une fois par jour, 2480 mg une fois par jour, 2485 mg une fois par jour, 2490 mg une fois par jour, 2495 mg une fois par jour, 2500 mg une fois par jour, 2505 mg une fois par jour, 2510 mg une fois par jour, 2515 mg une fois par jour, 2520 mg une fois par jour, 2525 mg une fois par jour, 2530 mg une fois par jour, 2535 mg une fois par jour, 2540 mg une fois par jour, 2545 mg une fois par jour, 2550 mg une fois par jour, 2555 mg une fois par jour, 2560 mg une fois par jour, 2565 mg une fois par jour, 2570 mg une fois par jour, 2575 mg une fois par jour, 2580 mg une fois par jour, 2585 mg une fois par jour, 2590 mg une fois par jour, 2595 mg une fois par jour, 2600 mg une fois par jour, 2605 mg une fois par jour, 2610 mg une fois par jour, 2615 mg une fois par jour, 2620 mg une fois par jour, 2625 mg une fois par jour, 2630 mg une fois par jour, 2635 mg une fois par jour, 2640 mg une fois par jour, 2645 mg une fois par jour, 2650 mg une fois par jour, 2655 mg une fois par jour, 2660 mg une fois par jour, 2665 mg une fois par jour, 2670 mg une fois par jour, 2675 mg une fois par jour, 2680 mg une fois par jour, 2685 mg une fois par jour, 2690 mg une fois par jour, 2695 mg une fois par jour, 2700 mg une fois par jour, 2705 mg une fois par jour, 2710 mg une fois par jour, 2715 mg une fois par jour, 2720 mg une fois par jour, 2725 mg une fois par jour, 2730 mg une fois par jour, 2735 mg une fois par jour, 2740 mg une fois par jour, 2745 mg une fois par jour, 2750 mg une fois par jour, 2755 mg une fois par jour, 2760 mg une fois par jour, 2765 mg une fois par jour, 2770 mg une fois par jour, 2775 mg une fois par jour, 2780 mg une fois par jour, 2785 mg une fois par jour, 2790 mg une fois par jour, 2795 mg une fois par jour, 2800 mg une fois par jour, 2805 mg une fois par jour, 2810 mg une fois par jour, 2815 mg une fois par jour, 2820 mg une fois par jour, 2825 mg une fois par jour, 2830 mg une fois par jour, 2835 mg une fois par jour, 2840 mg une fois par jour, 2845 mg une fois par jour, 2850 mg une fois par jour, 2855 mg une fois par jour, 2860 mg une fois par jour, 2865 mg une fois par jour, 2870 mg une fois par jour, 2875 mg une fois par jour, 2880 mg une fois par jour, 2885 mg une fois par jour, 2890 mg une fois par jour, 2895 mg une fois par jour, 2900 mg une fois par jour, 2905 mg une fois par jour, 2910 mg une fois par jour, 2915 mg une fois par jour, 2920 mg une fois par jour, 2925 mg une fois par jour, 2930 mg une fois par jour, 2935 mg une fois par jour, 2940 mg une fois par jour, 2945 mg une fois par jour, 2950 mg une fois par jour, 2955 mg une fois par jour, 2960 mg une fois par jour, 2965 mg une fois par jour, 2970 mg une fois par jour, 2975 mg une fois par jour, 2980 mg une fois par jour, 2985 mg une fois par jour, 2990 mg une fois par jour, 2995 mg une fois par jour, 3000 mg une fois par jour, 3005 mg une fois par jour, 3010 mg une fois par jour, 3015 mg une fois par jour, 3020 mg une fois par jour, 3025 mg une fois par jour, 3030 mg une fois par jour, 3035 mg une fois par jour, 3040 mg une fois par jour, 3045 mg une fois par jour, 3050 mg une fois par jour, 3055 mg une fois par jour, 3060 mg une fois par jour, 3065 mg une fois par jour, 3070 mg une fois par jour, 3075 mg une fois par jour, 3080 mg une fois par jour, 3085 mg une fois par jour, 3090 mg une fois par jour, 3095 mg une fois par jour, 3100 mg une fois par jour, 3105 mg une fois par jour, 3110 mg une fois par jour, 3115 mg une fois par jour, 3120 mg une fois par jour, 3125 mg une fois par jour, 3130 mg une fois par jour, 3135 mg une fois par jour, 3140 mg une fois par jour, 3145 mg une fois par jour, 3150 mg une fois par jour, 3155 mg une fois par jour, 3160 mg une fois par jour, 3165 mg une fois par jour, 3170 mg une fois par jour, 3175 mg une fois par jour, 3180 mg une fois par jour, 3185 mg une fois par jour, 3190 mg une fois par jour, 3195 mg une fois par jour, 3200 mg une fois par jour, 3205 mg une fois par jour, 3210 mg une fois par jour, 3215 mg une fois par jour, 3220 mg une fois par jour, 3225 mg une fois par jour, 3230 mg une fois par jour, 3235 mg une fois par jour, 3240 mg une fois par jour, 3245 mg une fois par jour, 3250 mg une fois par jour, 3255 mg une fois par jour, 3260 mg une fois par jour, 3265 mg une fois par jour, 3270 mg une fois par jour, 3275 mg une fois par jour, 3280 mg une fois par jour, 3285 mg une fois par jour, 3290 mg une fois par jour, 3295 mg une fois par jour, 3300 mg une fois par jour, 3305 mg une fois par jour, 3310 mg une fois par jour, 3315 mg une fois par jour, 3320 mg une fois par jour, 3325 mg une fois par jour, 3330 mg une fois par jour, 3335 mg une fois par jour, 3340 mg une fois par jour, 3345 mg une fois par jour, 3350 mg une fois par jour, 3355 mg une fois par jour, 3360 mg une fois par jour, 3365 mg une fois par jour, 3370 mg une fois par jour, 3375 mg une fois par jour, 3380 mg une fois par jour, 3385 mg une fois par jour, 3390 mg une fois par jour, 3395 mg une fois par jour, 3400 mg une fois par jour, 3405 mg une fois par jour, 3410 mg une fois par jour, 3415 mg une fois par jour, 3420 mg une fois par jour, 3425 mg une fois par jour, 3430 mg une fois par jour, 3435 mg une fois par jour, 3440 mg une fois par jour, 3445 mg une fois par jour, 3450 mg une fois par jour, 3455 mg une fois par jour, 3460 mg une fois par jour, 3465 mg une fois par jour, 3470 mg une fois par jour, 3475 mg une fois par jour, 3480 mg une fois par jour, 3485 mg une fois par jour, 3490 mg une fois par jour, 3495 mg une fois par jour, 3500 mg une fois par jour, 3505 mg une fois par jour, 3510 mg une fois par jour, 3515 mg une fois par jour, 3520 mg une fois par jour, 3

# ESAC® 20 mg

Veuillez lire attentivement l'information

med

LE 22/12  
PER 12/24  
PPV 1440150

144180



les  
- le  
- la  
- le  
remè  
- le tr  
Helio  
- le tra  
non stér  
- la préven  
estomac et du duodénum associés à la prise  
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

## Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 20 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

### Ne pas utiliser ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,
- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).

### Prendre des précautions particulières avec ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétoconazole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).
- si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.
- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de *Helicobacter pylori* avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres

si vos symptômes persistent après 4 semaines, consultez votre médecin.

Ensuite, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule de 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins.

Le traitement à la demande, en fonction des besoins, n'est pas recommandé chez les patients traités par un AINS, susceptibles de développer un ulcère istro-duodénal.

### dutes :

### Traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie peinte *Helicobacter pylori* :

La dose initiale est de 20 mg associé à deux antibiotiques (amoxicilline 1 G et rithromycine 500 Mg) deux fois par jour pendant 7 jours.

### Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 semaines.

### Prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Prenez une fois par jour.

AC ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de mises disponibles.

Prenez strictement les instructions de votre médecin et si vous avez un doute, hésitez pas à lui demander conseil.

### Si vous avez pris plus d'ESAC 20 mg que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

### Si vous avez oublié de prendre ESAC 20 mg :

Prenez-le dès que possible.

Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement normalement.

### Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ESAC 20 mg est susceptible d'entraîner occasionnellement des effets indésirables chez certaines personnes.

Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légère et disparaissent à l'arrêt du traitement.

### Effets indésirables fréquents

(chez 1 à 10 % des patients traités) :  
Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, flatulence.

### Effets indésirables peu fréquents

(chez moins de 1 % des patients traités) :  
Sensation vertigineuse, œdème périphérique, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaire), malaise.

### Effets indésirables rares

(chez moins de 0,1 % des patients traités) :  
Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie





# ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Comprimé sécable

LOT 43 104 1  
EXP 12 2025  
PPV 35.70

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ ?

- syndrome d'apnée du sommeil respiratoire pendant le sommeil.  
- insuffisance hépatique grave.  
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indiqué de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut lui seul résoudre les difficultés d'origine anxiété. Il convient de demander l'avis de votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à lutter contre l'anxiété.

## Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : il peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs peuvent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non médicamenteuses (alcoolique).

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, demandez à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un état de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou quelques jours, de signes tels que : douleur importante, insomnie, douleurs

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique

#### ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

Certains médicaments peuvent modifier l'action de PAROXETINE WIN, et augmenter le risque d'effets secondaires. PAROXETINE WIN peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Les médicaments connus pour interagir avec PAROXETINE WIN sont :

• des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène)), • la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments anti-psychotiques, • l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés contre la douleur et l'inflammation, • le tramadol et la pétididine, des médicaments contre la douleur, • des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la migraine, • d'autres antidépresseurs incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine, • un complément alimentaire appelé tryptophane, • des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, la perphenazine, la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines conditions psychiatriques, • le fentanyl, utilisé en anesthésie, • les opioïdes chroniques, • l'aspirine et d'autres médicaments utilisés pour traiter l'infection, • le valproate de sodium et l'atomoxétine, qui est • la procyclidine, qui • le warfarin ou d'autres médicaments anticoagulants, • l'aspirine, médicaments • le métaproloïd, un • les cardiaques, • la • le linézolide, un • le cancéreux du sein.

PER: 10/22/2009

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
PAROXETINE WIN 20MG

CP B30  
PPV: 129,00 DH

5 113000 062301

Si vous prenez, ou si vous êtes prescrit.

Si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Alliments et boissons

Ne prenez pas de boissons alcoolisées pendant votre traitement par PAROXETINE WIN. L'alcool peut aggraver les effets secondaires. La prise de PAROXETINE WIN le matin avec le repas réduira le risque de nausée.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

##### Grossesse, allaitement et fertilité

##### Grossesse

Prévenez votre médecin dès que possible si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou si vous avez un projet de grossesse. Chez les nourrissons dont les mères avaient pris la paroxétine durant les premiers mois de la grossesse, quelques études ont montré une augmentation du risque de malformations à la naissance, en particulier cardiaques. Dans la population générale, le risque d'anomalie cardiovasculaire à la naissance est de 1 %. Ce risque augmente jusqu'à 2 % chez les mères ayant pris la paroxétine. Si vous êtes enceinte, votre médecin et vous-même décidez s'il est préférable pour vous de changer de traitement et d'arrêter progressivement ou de continuer PAROXETINE WIN.

Assurez-vous que votre médecin ou la sage-femme soit informé que vous prenez PAROXETINE WIN.

Si PAROXETINE WIN est utilisé pendant la grossesse, particulièrement à la fin, PAROXETINE WIN peut augmenter le risque de survenue de maladie grave chez les nouveau-nés, appelée risque d'hypertension pulmonaire persistante chez le nouveau-né. Dans ce cas, la pression du sang dans les vaisseaux entre le cœur et les poumons du nouveau-né est trop élevée. Si vous prenez PAROXETINE WIN durant les 3 derniers mois de grossesse, votre nouveau-né peut également présenter d'autres symptômes, habituellement dans les 24 heures suivant la naissance. Ces symptômes sont :

• difficulté respiratoire, • coloration violacée de la peau, des lèvres ou des ongles, ou difficulté de régulation de la température, • vomissements ou difficultés d'alimentation, • somnolence ou grande fatigue, sommeil perturbé ou pleurs permanents, • rigidité ou hypotonie, • nervosité, irritabilité, tremblements, convulsions, • réflexes exagérés.

Si votre bébé présente l'un de ces symptômes, ou si vous vous interrogez sur la santé de votre bébé, parlez-en à votre médecin ou à la sage-femme. Ils vous indiqueront ce qu'il faut faire.

# ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

## Comprimés sécables

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

LOT 230104 1  
EXP 12 2025  
PPV 35.70

ment. Si vous prenez ce médicament avec quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

**Classe pharmacothérapeutique**  
**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

#### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

respiratoires pendant le sommeil : - insuffisance hépatique grave, - myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### **Précautions d'emploi et Mises en garde**

Ce traitement médicamenteux ne lui seul résoudre les difficultés liées à l'anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous informera sur les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

#### **Mises en garde**

Si une perte d'efficacité survient ou si l'utilisation répétée du médicament devient insuffisante, n'augmentez pas la dose.

**Risque de DEPENDANCE :** ce médicament peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs peuvent favoriser la survenue de la dépendance : - durée du traitement, - dose, - antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, contactez votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un état de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou quelques jours, de signes tels que : importante, insomnie, douleurs

# ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

## Comprimés sécables

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

LOT 230104 1  
EXP 12 2025  
PPV 35.70

ment. Si vous prenez ce médicament avec quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

**Classe pharmacothérapeutique**  
**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

#### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

respiratoires pendant le sommeil : - insuffisance hépatique grave, - myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### **Précautions d'emploi et Mises en garde**

Ce traitement médicamenteux ne lui seul résoudre les difficultés liées à l'anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous informera sur les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

#### **Mises en garde**

Si une perte d'efficacité survient ou si l'utilisation répétée du médicament devient insuffisante, n'augmentez pas la dose.

**Risque de DEPENDANCE :** ce médicament peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs peuvent favoriser la survenue de la dépendance : - durée du traitement, - dose, - antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, contactez votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un état de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou quelques jours, de signes tels que : importante, insomnie, douleurs