

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-820076

188105

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1896 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : DRISSIA

Nom & Prénom : GHAZZAL

Date de naissance : 28/11/53

Adresse : Avenue 10^{ème} étage Immi Cas

Tél. : 06 85 36 47 54 Total des frais engagés : 934,00 DHS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. EL ALAOUI Saïda
Ophtalmologiste
207, Boulevard Mohammed VI
Tél: 05 22 94 91 88 / CASA

Date de consultation : 07/11/2023

Nom et prénom du malade : GHAZZAL DRISSIA Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection longue durée


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le 07/11/2023

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNBP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/11/2023	CS	02	3000	INF: 081 m 6512 Dr. EL ALAOUI Saïda Ophtalmologiste Boulevard Zerkatouni 2166 - CASA

INP: 081 m 65 720

Dr. EL ALAOUI Saïda
Ophtalmologiste
207, Boulevard Zerkouni
26 22 94 81 66 - CASA

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AERIA angle Bd. Abdellah Bencherif P.d. L'Aéropostale - Casablanca Tél: 0529.12.23.23 061111734	11/11/2023	634.00

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

PHARMACIE SERIA
angle Bd. Abdouh Bencherif
et P.d. L'Aéropostale - Casablanca
Tél: 0529.12.23.23
06114734



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>								
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>								
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>								
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>								
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>								
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	B		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	H											
	25533412	21433552										
	00000000	00000000										
	B											
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>								
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>								

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

INP:

--	--	--	--	--	--	--	--

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saida EL ALAOUI

Ophthalmologiste

Ancien Interne et Attachée au

CHNO des QUINZE-VINGTS Paris

Diplômée de l'université P.et M. Curie Paris VI

الدكتورة سعيدة العلوي

طب العيون

طبيبة سابقة بالمركز الاستشفائي الوطني

لطب العيون 15.20 بباريس

خريجة جامعة باريس 6

07 novembre 2023

GHAZZAL Drissia

93.00 x 2

RELAXIUM b6 375

1 cp par jour



HYE



1 goutte x 4 / j , pendant 6 Mois 2 YEUX

109.00 x
4

T = 634.00

PHARMACIE AERIA
Angle Bd. Abdellah Bencherif
et Bd. L'Aéropostale - Casablanca
Tél: 0529.12.23.23

Dr. EL ALAOUI Saïda
Ophthalmologiste
207, Boulevard Zerketouni
Tél: 05 22 94 91 66 - CASA

BIOMYLASE®
 Cellulés ; Boîte de 24
 Flacon de 125 ml
 Alpha-amylase

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
 En cas de besoin de la relire.
 Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin.
 Ce médicament est prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif.
 Il est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non habituel, consultez votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT
 Composition qualitative et quantitative

Comprimé :	Pour 1 Cp enrobé
Alpha-amylase *Soit 2142.9 Unités Pharmacopée Européenne par Comprimé. Excipients	3000 U CEIP* q.s.p.....1 Cp
Sirop :	Pour 1 ml de sirop
Alpha-amylase *Soit 142.86 Unités Pharmacopée Européenne par ml de sirop. Excipients	200 U CEIP* q.s.p.....1 ml

EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

Comprimé : Saccharose et Jaune orangé S (E110).

Sirop : Saccharose, Glycérol, Parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217), Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219).

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament appartient à la classe des enzymes à visée anti-inflammatoire.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?

Posologie

• Comprimé :

Adulte : 1 Comprimé, 3 fois par jour au cours des repas.

• Sirop :

Adulte : 1 cuillère à soupe (15 ml), 3 fois par jour.

Enfant de plus de 3 ans (plus de 15 kg) : 2 cuillères à café (10 ml), 3 fois par jour.

Nourrisson et enfant de 6 mois à 3 ans (7 kg à 15 kg) : 1 cuillère à café (5 ml), 3 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Avaler les comprimés, sans les croquer, avec un verre d'eau.

Durée du traitement

Pour les comprimés : Ne prolongez pas le traitement au-delà de 5 jours sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Ne prenez jamais BIOMYLASE :

• En cas d'antécédents d'allergie à l'alpha-amylase ou à l'un des composants, notamment les parabens (le cas du sirop).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, BIOMYLASE peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.



Lubricant op
Sodium Hyal
 10 ml

LOT

0780723



2025 07

PPC
DHS

109,00

Composition: Sod
 sic sodium phosph
 water for injections

v), dibasic sodium phosphate, monoba
 benzalkonium chloride, sodium edetate,

What is it?

Hye is a 0.4% ophthalmic solution of sodium hyaluronate, obtained by biotechnological synthesis. Sodium hyaluronate has muco-mimetic, muco-adhesive and viscoelastic properties that improve the tear film stability and keeps the ocular surface lubricated, moisturized and protected.

How is it presented?

Hye is an ophthalmic solution in a bottle of 10 ml.

When should it be used?

The lubricant, moisturising and protective qualities of sodium hyaluronate relieve irritation, dryness, burning and foreign body sensation due to environmental elements (wind, sun, smoke, dry air), visual stress (excessive light and prolonged use of computers) or mechanical factors (contact lenses use, after ocular surgery), providing a long lasting relief.

How much to use?

1 drop in the eye 2-3 times daily.

Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if the container is damaged.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.
- Do not use after the expiry date shown on the pack.
- Do not touch the eye with the tip of the container.
- After administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution; it is therefore advisable to wait until the blurring has disappeared before undertaking any activity that requires clear vision.
- Leave at least 10-15 minutes between administration of any other ophthalmic drugs.
- Once opened the bottle the product can be used within 30 days.
- Do not wear contact lenses during instillation of the product and do not place the lenses for at least 15 minutes. Benzalkonium chloride may be absorbed by soft contact lenses changing their color.
- Benzalkonium chloride may cause eye irritation. If you feel abnormal eye sensation, stinging or pain in the eye after using this product, consult your doctor.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Store below 25°C.
- Do not swallow.



Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva, 6/8, 56121, Pisa, Italy

Distributor: B2S Health Services, 9, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani – Centre Commercial Dar Essalam-Souissi – Rabat

Date of last revision of the text: February 2021



Dispose of properly after use



Lubricant op
Sodium Hyal
 10 ml

LOT

0780723



2025 07

PPC
DHS

109,00

Composition: Sod
 sic sodium phosph
 water for injections

v), dibasic sodium phosphate, monoba-
 zenzalkonium chloride, sodium edetate,

What is it?

Hye is a 0.4% ophthalmic solution of sodium hyaluronate, obtained by biotechnological synthesis. Sodium hyaluronate has muco-mimetic, muco-adhesive and viscoelastic properties that improve the tear film stability and keeps the ocular surface lubricated, moisturized and protected.

How is it presented?

Hye is an ophthalmic solution in a bottle of 10 ml.

When should it be used?

The lubricant, moisturising and protective qualities of sodium hyaluronate relieve irritation, dryness, burning and foreign body sensation due to environmental elements (wind, sun, smoke, dry air), visual stress (excessive light and prolonged use of computers) or mechanical factors (contact lenses use, after ocular surgery), providing a long lasting relief.

How much to use?

1 drop in the eye 2-3 times daily.

Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if the container is damaged.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.
- Do not use after the expiry date shown on the pack.
- Do not touch the eye with the tip of the container.
- After administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution; it is therefore advisable to wait until the blurring has disappeared before undertaking any activity that requires clear vision.
- Leave at least 10-15 minutes between administration of any other ophthalmic drugs.
- Once opened the bottle the product can be used within 30 days.
- Do not wear contact lenses during instillation of the product and do not place the lenses for at least 15 minutes. Benzalkonium chloride may be absorbed by soft contact lenses changing their color.
- Benzalkonium chloride may cause eye irritation. If you feel abnormal eye sensation, stinging or pain in the eye after using this product, consult your doctor.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Store below 25°C.
- Do not swallow.



Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva, 6/8, 56121, Pisa, Italy

Distributor: B2S Health Services, 9, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani – Centre Commercial Dar Essalam-Souissi – Rabat

Date of last revision of the text: February 2021



Dispose of properly after use



Lubricant op
Sodium Hyal
 10 ml

LOT

0780723



2025 07

PPC
DHS

109,00

Composition: Sod
 sic sodium phosph
 water for injections

v), dibasic sodium phosphate, monoba-
 zenzalkonium chloride, sodium edetate,

What is it?

Hye is a 0.4% ophthalmic solution of sodium hyaluronate, obtained by biotechnological synthesis. Sodium hyaluronate has muco-mimetic, muco-adhesive and viscoelastic properties that improve the tear film stability and keeps the ocular surface lubricated, moisturized and protected.

How is it presented?

Hye is an ophthalmic solution in a bottle of 10 ml.

When should it be used?

The lubricant, moisturising and protective qualities of sodium hyaluronate relieve irritation, dryness, burning and foreign body sensation due to environmental elements (wind, sun, smoke, dry air), visual stress (excessive light and prolonged use of computers) or mechanical factors (contact lenses use, after ocular surgery), providing a long lasting relief.

How much to use?

1 drop in the eye 2-3 times daily.

Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if the container is damaged.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.
- Do not use after the expiry date shown on the pack.
- Do not touch the eye with the tip of the container.
- After administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution; it is therefore advisable to wait until the blurring has disappeared before undertaking any activity that requires clear vision.
- Leave at least 10-15 minutes between administration of any other ophthalmic drugs.
- Once opened the bottle the product can be used within 30 days.
- Do not wear contact lenses during instillation of the product and do not place the lenses for at least 15 minutes. Benzalkonium chloride may be absorbed by soft contact lenses changing their color.
- Benzalkonium chloride may cause eye irritation. If you feel abnormal eye sensation, stinging or pain in the eye after using this product, consult your doctor.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Store below 25°C.
- Do not swallow.



Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva, 6/8, 56121, Pisa, Italy

Distributor: B2S Health Services, 9, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani – Centre Commercial Dar Essalam-Souissi – Rabat

Date of last revision of the text: February 2021



Dispose of properly after use



Gélule
Voie orale

Relaxium[®]

B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg
équivalent en Magnésium150 mg
Vitamine B6.....1 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg
équivalent en Magnésium.....300 mg
Vitamine B6.....2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg
équivalent en Magnésium.....375 mg
Vitamine B6.....2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

LOT : 230794
DLUO : 09/2026
99.00DH

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60
Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30
Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

Deva
Pharmaceutique

140-147, Zone Industrielle 79 34000 - Castelnau

Code : AC2 - 00068



Gélule
Voie orale

Relaxium[®]

B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg
équivalent en Magnésium150 mg
Vitamine B6.....1 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg
équivalent en Magnésium.....300 mg
Vitamine B6.....2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg
équivalent en Magnésium.....375 mg
Vitamine B6.....2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

LOT : 230794
DLUO : 09/2026
99,00DH

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60
Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30
Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

Deva
Pharmaceutique

100 147 - Zone Industrielle TS 10400 - Comblanchien

Code : AC2 - 00068