

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

M22- 0008810

188329

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule 0560

Société :

R. A. M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : M. ABAKIL HAFID

Date de naissance :

1-07-1943

Adresse :

LOT BENI-VAKHLEF N° 49  
Rue ALGHOFRAINE MOHAMMEDA

Tél. :

Total des frais engagés : 2344,28 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

ABAKIL HAFID

Enfant

Nature de la maladie :

DR YASSIN SAYER

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammeda

Le : 26/12/2023

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes   |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 09/12/23        | Actes             | Co                    | 300 DA                          | DR. KASSIM SAYERH<br>CHIRURGIEN UROLOGUE<br>Bir Anzarane App. 1<br>Mohamed Nadia - Tel. 05 21 21 00 06 |

### EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur   | Date     | Montant de la Facture |
|--|----------|-----------------------|
|  | 09/12/23 | 1456,20               |

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue   | Date     | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|----------|------------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE AMARA<br>Mohamed AMARA<br>Radiologue<br>1, Bd. Med. V - Mohammed V<br>Tel. : 05 23 30 40 30 | 21/12/23 | B 410                        | 588,00 DA              |

### AUXILIAIRES MEDICAUX





| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre |    |    |    | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|----|----|----|---------------------------------|
|                                  |                | AM     | PC | IM | IV |                                 |
|                                  |                |        |    |    |    | -                               |
|                                  |                |        |    |    |    | -                               |
|                                  |                |        |    |    |    | -                               |
|                                  |                |        |    |    |    | -                               |

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES   | Dents Traitées   | Nature des Soins     | Coefficient |                         |
|---|--|----------------------|-------------|-------------------------|
|    |  |                      |             | Coefficient DES TRAVAUX |
|   |  |                      |             | MONTANTS DES SOINS      |
|  |  |                      |             | DEBUT D'EXECUTION       |
|   |  |                      |             | FIN D'EXECUTION         |
| O.D.F PROTHESES DENTAIRES   | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE              |                      |             |                         |
|   | H  | 25533412<br>00000000 | G           | 21433552<br>00000000    |
|   | D  | 00000000<br>35533411 | B           | 00000000<br>11433553    |
|   |  |                      |             | Coefficient DES TRAVAUX |
|   | [Création, remont, adjonction]                         |                      |             | MONTANTS DES SOINS      |
|   | Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession |                      |             | DATE DU DEVIS           |
|   |  |                      |             | DATE DE L'EXECUTION     |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



## Bulletin d'analyses

Hafsal

Abdelkif

A Mohammedia le : 09 DEC 2023

- NFS
- GROUPAGE SANGUIN
- TP
- VS
- CRP
- UREE
- CREATININEMIE
- CLAIRANCE DE LA CREATININE
- GLYCEMIE A JEUN
- PSA TOTAL
- PSA LIBRE
- HbA1c
- Rapport PSA L/T
- TSH US

1. Bd. Med. V - Mohammedia  
 05 23 30 40 30  
 Tel : 05 23 30 40 30  
 LABORATOIRE  
 Mohammed Andrologue  
 BIOLOGISTE  
 Mohammedia

- ECBU
- IONOGRAUME SANGUIN
- SPERMOGRAMME
- SPERMOCULTURE
- TESTOSTERONEMIE
- FSH
- LH
- BILAN LIPIDIQUE
- BILAN HEPATIQUE
- ACIDE URIQUE
- VITAMIN D
- VITAMIN B12
- CALCÉMIE
- PTH



Dr Yassin SAYERH  
Chirurgien Urologue  
- Andrologue -  
Fixe : 05 21 21 00 06  
05 23 31 79 63



الدكتور يسن الطايخ  
أخصائي في أمراض وجراحة الكلى، البرستات،  
المسالك البولية والأعضاء التناسلية  
عضو في الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية  
Membre de L'American Urological  
Association  
Urgences : 06 64 21 43 99

## Ordonnance

A Mohammedia le : 09 DEC 2023

Mr Hafed Abarh  
6x163,25  
~~Al Dust 20,10~~ 48 6  
1 gelatine (66mg)  
6x79,50  
~~21 Tlouz she Fj~~ 48 6  
1 qf. (66mg)  
2456,25  


12, Rue Bir Anzaran Résidence Fayçal (Derrière Carrefour KASBAH) 1er Etage Mohammedia



12. شارع بدر أنزaran إقامة فيصل (وراء كارفور القصبة) الطابق الأول المحمدية

# DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

## - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires tels que la difficulté à uriner ou la nécessité de faire pipi plus souvent pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut être faible et l'urine peut être plus foncée. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire devienne complètement bloqué (rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. La chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostate. Le Dutastéride réduit la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et de réduire le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie. Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamoxifène pour traiter les symptômes de l'hypertrophie de la prostate.

## - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutastéride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-reductase ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnez-les au pharmacien).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament sans le vérifier auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être donné à l'enfant ou aux adolescents.

- Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, en raison d'une réaction anaphylactique.

### Précautions d'Avertissement

PPV : 163 Dhs 20

Adressez-vous à :

N° de LOT. : XXXXXXXXXX

- Dans certains cas, l'alpha-bloquante peut entraîner une réaction d'hypotension orthostatique (l'hypotension orthostatique).

Date d'EXP : 04/2025

patients présentant une maladie cardiaque.

- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques ou de maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement prendre un autre médicament.

Le cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques ou de maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement prendre un autre médicament.

# DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

## - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la prostate. La production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone (DHT) peut entraîner une augmentation du volume de la prostate. L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires tels que la difficulté à uriner, la nécessité de faire pipi plus souvent et la nécessité de faire pipi la nuit. Le jet d'urine peut être faible et le débit peut être lent. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. La chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostate. La prise de Dutastéride réduit la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et de réduire le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie. Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamoxifène contre les symptômes de l'hypertrophie de la prostate.

## - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutastéride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-reductase ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnez-les au pharmacien).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament sans le vérifier auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être donné à l'enfant ou aux adolescents.

- Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, en raison d'une réaction anaphylactique.

### Précautions d'Avertissement

PPV : 163 Dhs 20

Adressez-vous à :

N° de LOT. : LF30617A

- Dans certains cas, l'alpha-bloquante peut entraîner une baisse de la tension artérielle et une augmentation de la sécrétion d'urine.

Date d'EXP: 04/2025

patients présentant une hypertension artérielle.

Le cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques, de l'insuline ou de l'insuline, ou de l'insuline.

# DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

## - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires tels que la difficulté à uriner ou la nécessité de faire pipi plus souvent pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut être faible et l'urine peut être plus foncée. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire devienne complètement bloqué (rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. La chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostate. Le Dutastéride réduit la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et de réduire le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie. Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamoxifène pour traiter les symptômes de l'hypertrophie de la prostate.

## - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutastéride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-reductase ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnez-les au pharmacien).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament sans le vérifier auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être donné à l'enfant ou aux adolescents.

- Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, en raison d'une réaction anaphylactique.

### Précautions d'Avertissement

PPV : 163 Dhs 20

Adressez-vous à :

N° de LOT. : XXXXXXXXXX

- Dans certains cas, l'alpha-bloquante peut entraîner une réaction d'hypotension orthostatique (l'hypotension orthostatique).

Date d'EXP. : 04/2025

patients présentant une maladie cardiaque.

- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques ou de maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement prendre un autre médicament.

Le Dutastéride peut entraîner une réaction d'hypotension orthostatique (l'hypotension orthostatique).

# DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

## - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la prostate. La production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone (DHT) peut entraîner une augmentation du volume de la prostate. L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires tels que la difficulté à uriner, la nécessité de faire pipi plus souvent et la nécessité de faire pipi dans la nuit. Ces symptômes peuvent être causés par une prostate trop grande qui empêche l'urine de sortir correctement. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire devienne lent et difficile (rétrécissement urinaire). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. La chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostate. La prise de Dutastéride réduit la production de DHT, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et de soulager les symptômes de l'hypertrophie de la prostate. Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamoxifène pour traiter les symptômes de l'hypertrophie de la prostate.

## - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutastéride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-reductase ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnez-les si possible).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament sans le vérifier auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être donné à l'enfant ou aux adolescents.

- Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, en raison d'une réaction anaphylactique.

### Précautions d'Avertissement

PPV : 163 Dhs 20

Adressez-vous à :

N° de LOT. : XXXXXXXXXX

- Dans certains cas, l'effet de l'alpha-bloquant peut être diminué.

Date d'EXP. : 04/2025

patients présentant une maladie cardiaque.

Le cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques ou de maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement prendre un autre médicament.

# DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

## - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires tels que la difficulté à uriner ou la nécessité de faire pipi plus souvent pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut être faible et l'urine peut être plus foncée. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire devienne complètement bloqué (rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. La chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostate. Le Dutastéride réduit la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et de réduire le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie. Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamoxifène pour traiter les symptômes de l'hypertrophie de la prostate.

## - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutastéride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-reductase ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnez-les au pharmacien).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament sans le vérifier auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être donné à l'enfant ou aux adolescents.

- Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, en raison d'une réaction anaphylactique.

### Précautions d'Avertissement

PPV : 163 Dhs 20

Adressez-vous à :

N° de LOT. : XXXXXXXXXX

- Dans certains cas, l'alpha-bloquante peut entraîner une réaction d'hypotension orthostatique (l'hypotension orthostatique).

Date d'EXP. : 04/2025

patients présentant une maladie cardiaque.

- Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques ou de maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement prendre un autre médicament.

Le Dutastéride peut entraîner une réaction d'hypotension orthostatique (l'hypotension orthostatique).

# DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

## - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires tels que la difficulté à uriner ou la nécessité de faire pipi plus souvent pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut être faible et l'urine peut être plus foncée. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire devienne complètement bloqué (rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. La chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostate. Le Dutastéride réduit la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et de réduire le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie. Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamoxifène pour traiter les symptômes de l'hypertrophie de la prostate.

## - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutastéride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-reductase ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnez-les au pharmacien).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament sans le vérifier auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être donné à l'enfant ou aux adolescents.

- Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, en raison d'une réaction anaphylactique.

### Précautions d'emploi :

#### Avertissement :

Adressez-vous à votre pharmacien si vous avez des questions.

- Dans certains cas, l'alpha-bloquage peut entraîner une baisse de la tension artérielle.

patients présentant une hypertension artérielle.

PPV : 163 Dhs 20

N° de LOT : LF30617A

Date d'EXP : 04/2025

patients présentant une hypertension artérielle.

patients présentant une hypertension artérielle.

patients présentant une hypertension artérielle.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boite de 15 comprimés

TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boite de 30 comprimés

DCI: Térazosine chlorhydrate dihydraté.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

### • Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la taille de la prostate). La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

#### • Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

#### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
- En cas de vertige, somnolence, étourdissements et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.
- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paliers d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.
- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Etant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

#### • Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

*Enfants* : il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

*Personnes âgées* : La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées.

Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

#### • Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent interagir entre eux.

L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui diminue la pression artérielle) est déconseillée.

Certains patients prenant un traitement à base d'alpha-bloquant (médicament qui diminue la pression artérielle) pour le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypertrrophie bénigne de la prostate peuvent ressentir des sensations vertigineuses ou des étourdissements, qui peuvent être dus à une pression artérielle basse lors du passage rapide à la position assise ou à la position debout. Certains patients ont éprouvé ces symptômes lors de la prise de médicaments indiqués dans la dysfonction érectile (impuissance) avec les alpha-bloquants. Afin de réduire la probabilité de survenue de ces symptômes, vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de débuter un traitement pour la dysfonction érectile.

#### • Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. La sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée durant la grossesse, seul votre médecin peut évaluer les possibles effets bénéfiques qui justifient son utilisation face au risque que peut courir le fœtus.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la térazosine dans le lait maternel. Le traitement ne devrait pas être envisagé chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### • Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle. Au début du traitement, une prudence particulière doit être envisagée par les conducteurs de véhicules et les personnes réalisant des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer un problème à la réalisation de leurs occupations. Il est formellement conseillé d'évitez de conduire ou d'utiliser des machines durant les 12 premières heures suivant l'administration de la dose initiale ou en cas de modification de posologie (augmentation de dose ou reprise du traitement interrompu auparavant).

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

#### • Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés :

Ce médicament contient du lactose. Demandez l'avis de votre médecin en cas d'intolérance à certains sucre, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. La laque jaune orangé (colorant de TERAZOSINE NORMON® 2 mg) et la laque rouge porceau (colorant de TERAZOSINE NORMON® 5mg), peuvent provoquer des réactions allergiques. Ils peuvent également déclencher une crise d'asthme chez les patients allergiques à l'acide acetylsalicylique.

### 3. COMMENT PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration de TERAZOSINE NORMON® comprimés indiquées par votre médecin. En cas de doute consultez votre médecin ou pharmacien.

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

#### Hyperplasie bénigne de prostate :

**Dose initiale** : Pour tous les patients, la dose respecte le même schéma d'augmentation

Doses suivantes : Après 3 ou 4 jours de traitement, et selon la réponse en prise unique pendant une semaine.

Postérieurement, la posologie pourra être augmentée progressivement jusqu'à obtenir la réponse clinique voulue.

La dose d'entretien recommandée chez le patient présentant une hyperplasie bénigne de la prostate est de 5 mg/jour.

Les patients manifestant une réponse clinique jugée insuffisante, la posologie peut être augmentée à 10 mg/jour.

N° AMM : 406/18 DMP/21/NRQ  
79,50  
DOS : 32 012  
PER : 06/18 026  
PPV : 9.50 026  
JH

RAZOSINE NORMON® 2 mg) en une seule prise le soir au coucher. Il est impératif de éviter l'apparition d'une hypotension aiguë.

peut être augmentée à 2 mg/jour, soit un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 2 mg

NORMON® 5 mg).  
NORMON® 5 mg).

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boite de 15 comprimés

TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boite de 30 comprimés

DCI: Térazosine chlorhydrate dihydrate.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

### • Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la taille de la prostate). La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

#### • Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

#### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
- En cas de vertige, somnolence, étourdissements et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.
- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paliers d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.
- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Etant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

#### • Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

*Enfants* : il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

*Personnes âgées* : La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées.

Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

#### • Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent interagir entre eux.

L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui diminue la pression artérielle) est déconseillée.

Certains patients prenant un traitement à base d'alpha-bloquant (médicament qui diminue la pression artérielle) pour le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypertrrophie bénigne de la prostate peuvent ressentir des sensations vertigineuses ou des étourdissements, qui peuvent être dus à une pression artérielle basse lors du passage rapide à la position assise ou à la position debout. Certains patients ont éprouvé ces symptômes lors de la prise de médicaments indiqués dans la dysfonction érectile (impuissance) avec les alpha-bloquants. Afin de réduire la probabilité de survenue de ces symptômes, vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de débuter un traitement pour la dysfonction érectile.

#### • Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. La sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée durant la grossesse, seul votre médecin peut évaluer les possibles effets bénéfiques qui justifient son utilisation face au risque que peut courir le fœtus.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la térazosine dans le lait maternel. Le traitement ne devrait pas être envisagé chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### • Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle. Au début du traitement, une prudence particulière doit être envisagée par les conducteurs de véhicules et les personnes réalisant des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer un problème à la réalisation de leurs occupations. Il est formellement conseillé d'évitez de conduire ou d'utiliser des machines durant les 12 premières heures suivant l'administration de la dose initiale ou en cas de modification de posologie (augmentation de dose ou reprise du traitement interrompu auparavant).

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

#### • Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés :

Ce médicament contient du lactose. Demandez l'avis de votre médecin en cas d'intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

La laque jaune orangé (colorant de TERAZOSINE NORMON® 2 mg) et la laque rouge porceau (colorant de TERAZOSINE NORMON® 5mg), peuvent provoquer des réactions allergiques. Ils peuvent également déclencher une crise d'asthme chez les patients allergiques à l'acide acetylsalicylique.

### 3. COMMENT PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration de TERAZOSINE NORMON® comprimés indiquées par votre médecin. En cas de doute consultez votre médecin ou pharmacien.

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

#### Hyperplasie bénigne de prostate :

**Dose initiale** : Pour tous les patients, la dose respecte le même schéma d'augmentation

**Doses suivantes** : Après 3 ou 4 jours de traitement, et selon la réponse en prise unique pendant une semaine.

Postérieurement, la posologie pourra être augmentée progressivement jusqu'à obtenir la réponse clinique voulue.

La dose d'entretien recommandée chez le patient présentant une hyperplasie bénigne de la prostate est de 5 mg/jour.

Les patients manifestant une réponse clinique jugée insuffisante, la posologie peut être augmentée à 10 mg/jour.

N° AMM : 406/18 DMP/21/NRQ  
79,50  
DOS : 32 012  
PER : 06/12/2013  
PPV : 9.5026  
JH

RAZOSINE NORMON® 2 mg) en une seule prise le soir au coucher. Il est impératif de éviter l'apparition d'une hypotension aiguë.

peut être augmentée à 2 mg/jour, soit un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 2 mg

NORMON® 5 mg).  
NORMON® 5 mg).

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boite de 15 comprimés

TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boite de 30 comprimés

DCI: Térazosine chlorhydrate dihydrate.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

### • Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la taille de la prostate). La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

#### • Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

#### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
- En cas de vertige, somnolence, étourdissements et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.
- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paliers d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.
- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Etant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

#### • Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

*Enfants* : il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

*Personnes âgées* : La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées.

Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

#### • Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent interagir entre eux.

L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui diminue la pression artérielle) est déconseillée.

Certains patients prenant un traitement à base d'alpha-bloquant (médicament qui diminue la pression artérielle) pour le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypertrrophie bénigne de la prostate peuvent ressentir des sensations vertigineuses ou des étourdissements, qui peuvent être dus à une pression artérielle basse lors du passage rapide à la position assise ou à la position debout. Certains patients ont éprouvé ces symptômes lors de la prise de médicaments indiqués dans la dysfonction érectile (impuissance) avec les alpha-bloquants. Afin de réduire la probabilité de survenue de ces symptômes, vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de débuter un traitement pour la dysfonction érectile.

#### • Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. La sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée durant la grossesse, seul votre médecin peut évaluer les possibles effets bénéfiques qui justifient son utilisation face au risque que peut courir le fœtus.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la térazosine dans le lait maternel. Le traitement ne devrait pas être envisagé chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### • Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle. Au début du traitement, une prudence particulière doit être envisagée par les conducteurs de véhicules et les personnes réalisant des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer un problème à la réalisation de leurs occupations. Il est formellement conseillé d'évitez de conduire ou d'utiliser des machines durant les 12 premières heures suivant l'administration de la dose initiale ou en cas de modification de posologie (augmentation de dose ou reprise du traitement interrompu auparavant).

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

#### • Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés :

Ce médicament contient du lactose. Demandez l'avis de votre médecin en cas d'intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. La laque jaune orangé (colorant de TERAZOSINE NORMON® 2 mg) et la laque rouge porceau (colorant de TERAZOSINE NORMON® 5mg), peuvent provoquer des réactions allergiques. Ils peuvent également déclencher une crise d'asthme chez les patients allergiques à l'acide acetylsalicylique.

### 3. COMMENT PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration de TERAZOSINE NORMON® comprimés indiquées par votre médecin. En cas de doute consultez votre médecin ou pharmacien.

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

#### Hyperplasie bénigne de prostate :

**Dose initiale** : Pour tous les patients, la dose respecte le même schéma d'augmentation

Doses suivantes : Après 3 ou 4 jours de traitement, et selon la réponse en prise unique pendant une semaine.

Postérieurement, la posologie pourra être augmentée progressivement jusqu'à obtenir la réponse clinique voulue.

La dose d'entretien recommandée chez le patient présentant une hyperplasie bénigne de la prostate est de 5 mg/jour.

Les patients manifestant une réponse clinique jugée insuffisante, la posologie peut être augmentée à 10 mg/jour.

N° AMM : 406/18 DMP/21/NRQ  
79,50  
DOS : 32012  
PER : 06/026  
PPV : 9,50 JH

RAZOSINE NORMON® 2 mg) en une seule prise le soir au coucher. Il est impératif de éviter l'apparition d'une hypotension aiguë.

peut être augmentée à 2 mg/jour, soit un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 2 mg

NORMON® 5 mg).  
NORMON® 5 mg).

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boite de 15 comprimés

TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boite de 30 comprimés

DCI: Térazosine chlorhydrate dihydrate.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

### • Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la taille de la prostate). La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

#### • Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

#### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
- En cas de vertige, somnolence, étourdissements et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.
- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paliers d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.
- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Etant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

#### • Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

*Enfants* : il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

*Personnes âgées* : La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées.

Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

#### • Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent interagir entre eux.

L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui diminue la pression artérielle) est déconseillée.

Certains patients prenant un traitement à base d'alpha-bloquant (médicament qui diminue la pression artérielle) pour le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypertrrophie bénigne de la prostate peuvent ressentir des sensations vertigineuses ou des étourdissements, qui peuvent être dus à une pression artérielle basse lors du passage rapide à la position assise ou à la position debout. Certains patients ont éprouvé ces symptômes lors de la prise de médicaments indiqués dans la dysfonction érectile (impuissance) avec les alpha-bloquants. Afin de réduire la probabilité de survenue de ces symptômes, vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de débuter un traitement pour la dysfonction érectile.

#### • Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. La sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée durant la grossesse, seul votre médecin peut évaluer les possibles effets bénéfiques qui justifient son utilisation face au risque que peut courir le fœtus.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la térazosine dans le lait maternel. Le traitement ne devrait pas être envisagé chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### • Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle. Au début du traitement, une prudence particulière doit être envisagée par les conducteurs de véhicules et les personnes réalisant des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer un problème à la réalisation de leurs occupations. Il est formellement conseillé d'évitez de conduire ou d'utiliser des machines durant les 12 premières heures suivant l'administration de la dose initiale ou en cas de modification de posologie (augmentation de dose ou reprise du traitement interrompu auparavant).

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

#### • Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés :

Ce médicament contient du lactose. Demandez l'avis de votre médecin en cas d'intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. La laque jaune orangé (colorant de TERAZOSINE NORMON® 2 mg) et la laque rouge porceau (colorant de TERAZOSINE NORMON® 5mg), peuvent provoquer des réactions allergiques. Ils peuvent également déclencher une crise d'asthme chez les patients allergiques à l'acide acetylsalicylique.

### 3. COMMENT PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration de TERAZOSINE NORMON® comprimés indiquées par votre médecin. En cas de doute consultez votre médecin ou pharmacien.

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

#### Hyperplasie bénigne de prostate :

**Dose initiale** : Pour tous les patients, la dose respecte le même schéma d'augmentation

Doses suivantes : Après 3 ou 4 jours de traitement, et selon la réponse en prise unique pendant une semaine.

Postérieurement, la posologie pourra être augmentée progressivement jusqu'à obtenir la réponse clinique voulue.

La dose d'entretien recommandée chez le patient présentant une hyperplasie bénigne de la prostate est de 5 mg/jour.

Les patients manifestant une réponse clinique jugée insuffisante, la posologie peut être augmentée à 10 mg/jour.

N° AMM : 406/18 DMP/21/NRQ  
79,50  
DOS : 32012  
PER : 06/026  
PPV : 9,50 JH

RAZOSINE NORMON® 2 mg) en une seule prise le soir au coucher. Il est impératif de éviter l'apparition d'une hypotension aiguë.

peut être augmentée à 2 mg/jour, soit un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 2 mg

NORMON® 5 mg).  
NORMON® 5 mg).

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boite de 15 comprimés

TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boite de 30 comprimés

DCI: Térazosine chlorhydrate dihydrate.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

### • Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la taille de la prostate). La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle.

TERAZOSINE NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

#### • Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

#### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.
- En cas de vertige, somnolence, étourdissements et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.
- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1% des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paliers d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.
- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Etant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

#### • Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

*Enfants* : il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

*Personnes âgées* : La sensibilité à la TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées.

Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

#### • Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent interagir entre eux.

L'administration concomitante de la térazosine avec d'autres antihypertenseurs (médicament qui diminue la pression artérielle) est déconseillée.

Certains patients prenant un traitement à base d'alpha-bloquant (médicament qui diminue la pression artérielle) pour le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypertrrophie bénigne de la prostate peuvent ressentir des sensations vertigineuses ou des étourdissements, qui peuvent être dus à une pression artérielle basse lors du passage rapide à la position assise ou à la position debout. Certains patients ont éprouvé ces symptômes lors de la prise de médicaments indiqués dans la dysfonction érectile (impuissance) avec les alpha-bloquants. Afin de réduire la probabilité de survenue de ces symptômes, vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquants avant de débuter un traitement pour la dysfonction érectile.

#### • Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. La sécurité de la térazosine pendant la grossesse n'a pas été établie. La térazosine ne doit pas être utilisée durant la grossesse, seul votre médecin peut évaluer les possibles effets bénéfiques qui justifient son utilisation face au risque que peut courir le fœtus.

Aucune information n'a été confirmée sur le passage de la térazosine dans le lait maternel. Le traitement ne devrait pas être envisagé chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### • Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La térazosine peut provoquer une diminution de la pression artérielle. Au début du traitement, une prudence particulière doit être envisagée par les conducteurs de véhicules et les personnes réalisant des tâches difficiles, car l'apparition fréquente de symptômes prémonitoires peut engendrer un problème à la réalisation de leurs occupations. Il est formellement conseillé d'évitez de conduire ou d'utiliser des machines durant les 12 premières heures suivant l'administration de la dose initiale ou en cas de modification de posologie (augmentation de dose ou reprise du traitement interrompu auparavant).

Dans le cas d'une hypotension, le patient devra être allongé jusqu'à disparition complète des symptômes.

#### • Informations importantes sur les composants de TERAZOSINE NORMON® comprimés :

Ce médicament contient du lactose. Demandez l'avis de votre médecin en cas d'intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. La laque jaune orangé (colorant de TERAZOSINE NORMON® 2 mg) et la laque rouge porceau (colorant de TERAZOSINE NORMON® 5mg), peuvent provoquer des réactions allergiques. Ils peuvent également déclencher une crise d'asthme chez les patients allergiques à l'acide acetylsalicylique.

### 3. COMMENT PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration de TERAZOSINE NORMON® comprimés indiquées par votre médecin. En cas de doute consultez votre médecin ou pharmacien.

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

#### Hyperplasie bénigne de prostate :

**Dose initiale** : Pour tous les patients, la dose respecte le même schéma d'augmentation

**Doses suivantes** : Après 3 ou 4 jours de traitement, et selon la réponse en prise unique pendant une semaine.

Postérieurement, la posologie pourra être augmentée progressivement jusqu'à obtenir la réponse clinique voulue.

La dose d'entretien recommandée chez le patient présentant une hyperplasie bénigne de la prostate est de 5 mg/jour.

Les patients manifestant une réponse clinique jugée insuffisante, la posologie peut être augmentée à 10 mg/jour.

N° AMM : 406/18 DMP/21/NRQ  
79,50  
DOS : 32012  
PER : 06/026  
PPV : 9-026  
JH

RAZOSINE NORMON® 2 mg) en une seule prise le soir au coucher. Il est impératif de éviter l'apparition d'une hypotension aiguë.

peut être augmentée à 2 mg/jour, soit un comprimé de TERAZOSINE NORMON® 2 mg

NORMON® 5 mg).

NORMON® 5 mg).

**LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES**

Dr. M. AMARA

3,Bd Mohammed V - Tél.: 0523.30.40.30 - Fax: 0523.30.43.20

Référence:

**31221234**

Analyses effectuées le: 21/12/2023

Pour.....: **Mr. ABAKIL HAFED**

Sur prescription du: Dr SAYERH YASSIN

Code.....: 00028186



Organisme.....:

**Bilan:**

CBU PSA

Cotation : (B 410 )

**Montant Net :** 588.00 **Dhs**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

**CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT Dhs 00 Cts**



Mohammed AMARA  
Pharmacien Biogiste

Diplômé de l'Université de Bruxelles (U.L.B.)  
Spécialités : Biochimie - Hématologie  
Immunologie - Bactériologie - Mycologie

# مختبر اعمارة للتحليلات الطبية

## LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Prélèvement du : 21/12/2023      Heure : 09:40  
Edition du : 22/12/2023  
Code Patient : 00028186  
Matricule :



Référence 31221T2234      du : 21/12/2023  
Mr. ABAKIL HAFED  
Médecin: Dr. SAYERH YASSIN

### BACTERIOLOGIE EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

- Aspect..... : Clair

#### CHIMIE:

- PH..... : 6  
- Albumine..... : Négatif  
- Glucose..... : Négatif  
- Corps cétoniques..... : Négatif  
- Sang..... : Négatif

#### CYTOLOGIE:

|                                  |      |          |
|----------------------------------|------|----------|
| - Leucocytes..... : 2 à 3        | /chp | (< à 5)  |
| - Hématies..... : 0              | /chp | (< à 10) |
| - Cellules épithéliales. : Rares |      |          |
| - Cylindres..... : Absents       |      |          |
| - Cristaux..... : Absents        |      |          |
| - Trichomonas ..... : Absents    |      |          |
| - Levures..... : Absentes        |      |          |

#### RECHERCHE DE GERMES BANALS ET LEVURES:

- Culture..... : Demeurée stérile.

### MARQUEURS EXAMEN DE SANG

| Analyses   | Résultats | Normes | Antécédents                     |
|--|-----------|--------|---------------------------------|
| P.S.A.....<br>(Antigène spécifique de la prostate) | 2.39      | ng/ml  | N : (< 4.00)<br>2.29 (20/06/23) |

*LABORATOIRE AMARA  
Mohammed V (Face Clinique Fedala) - Mohammedia - Tél.: 0523.30.40.30 - Fax : 0523.30.43.20*