

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-717588

188816

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10442 Société : RAM
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : HIRIZI Abdelkader
 Date de naissance : 04-03-1970
 Adresse : 3270636 complexe Med II Maârif extension Losablanca
 Tél. : 0662779705 Total des frais engagés : 487,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Docteur DEBBARN Laïla
Médecine générale
 Centre Commercial Nadia, Imm 3
 Route d'El Jadida - Maârif - Casa
 Tél. : 05 22 98 77 57


Cachet du médecin :

Date de consultation : 25/12/23
 Nom et prénom du malade : HIRIZI Abdelkader Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Rhumatoïdisme
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 25/12/2023
 Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/12/23	C		200,00	INP : INP: 091044420 Docteur DEBBARH Laila Médecine générale Nadia Hammou Maril - Cas

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. Abderrahim RABBAA Pharmacie RESIDENCE NADIA Centre Commercial Nadia 281, Bd. Brahim Roudani 33 72 69 - Casablanca	25/11/23	287,70



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est tenu de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>								
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>								
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>								
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>								
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>								
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H											
	25533412	21433552										
	00000000	00000000										
	B											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </tbody> </table>			D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>		
	D	G										
	00000000	00000000										
	35533411	11433553										
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>								
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>								

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur DEBBARH Laïla

Diplômée de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Rabat

MEDECINE GENERALE

Centre Commercial Nadia - Imm. 3
Bd. Brahim Roudani (Ex. Route d'El Jadida)
Maârif - Casablanca • Tél. : 0522 98.22.57

الدكتورة الدباغ ليلي

خريجة كلية الطب والصيدلة
بالرباط

الطب العام

إقامة نادية - المركز التجاري - عمارة 3
شارع ابراهيم روداني (طريق الجديدة سابقا)
المعاريف - الدار البيضاء - الهاتف : 0522 98.22.57

Casablanca, le 25/12/23

Dr. Abderrahim RABBAË
Pharmacie RÉSÉDENCE NADIA
Centre Commercial Nadia
281, Bd. Brahim Roudani
Tél.: 0522 23 72 69 - Casablanca

Hirizi Abdelkader

6000

Mazex 500

1cp à midi x 3j

8500

Bromylase 3000

1cp x 3 fois après repas x 5j

67,90

Toudex cp sucre

1cp x 3 fois

7000

Ergic 5mg

1cp le soir x 14j

14,80

Vitamine C 500

1cp eff le matin

- Febrex sachets
1 sachet x 2 fois x 5j

20,00



28770

Dr. Abderrahim RABBA
Pharmacie RESIDENCE NADIA
281, Bd. Brahim Roudani
Tel.: 0522 23 72 69 - Casablanca

Docteur DEBBARH Laila
Médecine générale
Centre Commercial Nadia, Imm 3
Indida - Maarif - Casa
22 98 77 57

TOUL

Forme et présentation :

Sirop. Flacon de 125 ml, Flacon de 200 ml

Composition :

Cassis feuille, mauve bleu fleur (et glycérine, acide citrique), extrait e sorbate, sodium benzoate, gom um a, citrique monohydrate, aspartame, a

Propriétés :

TOUDEX® est une association synergique de composants bénéfiques pour les irritations et les inflammations des voies respiratoires. La mauve possède une action puissamment émolliente.

Le cassis (i fluid) possède une action

*I fluid est un procédé unique dont les composants de la plante est précieux pour sa son intégrité.

Conseils d'utilisation :

Agiter avant utilisation.

Nourrisson (à partir d'un an) : 1 cuillère

Enfant : 1 à 2 cuillérées à café 3 fois/jour

Adulte : 1 cuillérée à soupe 3 fois/jour

Durée d'utilisation :

Une fois le flacon entamé, il doit être conservé à l'abri de la lumière et de l'humidité jusqu'à l'ouverture.

Fabriqué Phytéo Laboratoires

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament

TOUDEX®

Mauve - Cassis

LOT 107048/FC18
PER 10/2025
PPC 67,90

Sans alcool
Sans sucre



SIROP

Flacon 125 ml



Laboratoires Pharmaceutiques

MAZAX®

Azithromycine

3 comprimés pelliculés

500 mg

 Voie orale

MAZAX®
Azithromycine



3 comprimés pelliculés

500 mg

Antibiotique

LOT : 1754
PER : 01 - 25
P.P.V : 60 DH 00



Pharmed

Laboratoires Pharmaceutiques

 Voie orale

BIOMYLASE
Comprimés pelliculés ;
Sirop ; Flacon de

00155

- Veillez à l'attention de cette notice
- Garder la notice, vous pourriez avoir besoin de la
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, consultez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être un effet indésirable devient grave ou si mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Comprimé :	Alpha-amylase *Soit 2142,9 Unités Pharmacopée Européenne par Comprimé. Excipients
Pour 3000	q.s.f.
Sirop :	Alpha-amylase *Soit 142,86 Unités Pharmacopée Européenne par ml de sirop. Excipients
Pour 200	q.s.f.

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE

Comprimé : Saccharose et Jaune orangé S (E110), de méthyle sodique (E219).
Sirop : Saccharose, Glycérol, Parahydroxybenzoate de

Classe pharmaco-thérapeutique

Ce médicament appartient à la classe des enzymes à visé
DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?
Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu

Posologie

• Comprimé :
Adulte : 1 Comprimé, 3 fois par jour au cours des repas.
• Sirop :
Adulte : 1 cuillère à soupe (15 ml), 3 fois par jour.
Enfant de plus de 3 ans (plus de 15 kg) : 2 cuillères à café
Nourisson et enfant de 6 mois à 3 ans (7 kg à 15 kg) : 1 c

Mode et voie d'administration

Voie orale.
Avaler les comprimés, sans les croquer, avec un verre d'eau.
Durée du traitement
Pour les comprimés : Ne prolongez pas le traitement
En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance.
Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ne prenez jamais BIOMYLASE :
• En cas d'antécédents d'allergie à l'alpha-amylase ou à l'alpha-amylase pur.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
Comme tous les médicaments, BIOMYLASE peut survenir pas systématiquement chez tout le monde

PENDANT	REPAS
DUREE	
SOIR	
MIDI	
MATIN	

3000 U.CEIP
ALPHA-AMYLASE

BIOMYLASE®

24

COMPRIMÉS ENROBÉS

VOIE ORALE

POLYMEDIC

VITAMINE C® GALENICA**Acide ascorbique**

Comprimé effervescent, Boîte

FATIGUE - CONVALESCENCE**VITAMINE C 1000 mg****GALENICA****10 COMPRIMÉS EFFERVESCENTS****Voie orale****ARÔME ORANGE**

Que contient cette notice

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C®**EST-IL UTILISÉ ?****2. QUELLES SONT LES****AVANTAGES ?****3. COMMENT****4. QUEL****5. COMMENT****6. INFORM****1. QU'EST-CE QUE**

Classe pharmacologique

ACIDE ASCORBIQUE

Indications thérapeutiques

Ce médicament est

fatigue passagers d

Vous devez vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

amélioration ou si vous

Composition :

Acide ascorbique 1000 mg

Excipients q.s.p 1 comprimé effervescent.

Excipients à effet notoire : E110, saccharose, sodium.

Boîte de 10 comprimés effervescent.

AMM N° : 570/18DMP/21/NRQ

Dr Maria MAFTOUH

Pharmacien Responsable

يُحفظ بعيداً عن الحرارة والرطوبة.**Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.****VITAMINE C 1g**

Boîte de 10 comprimés effervescent

PPV : 14,80 DH



6 118000 190929

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A**PRENDRE VITAMINE C® ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications :

Ne prenez jamais VITAMINE C® :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,

• Si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein),

• Si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux,

• Si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie),

• Si vous avez moins de 15 ans.

Mise en garde spéciale et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITAMINE C®.

• Ce médicament contient du sodium (composant principal du sel de cuisine/selable). A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).

• Si votre fatigue s'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle s'accompagne de manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

• En raison d'un effet légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

• Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d'autres sources, comme les médicaments, les aliments enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

• La vitamine C augmente l'absorption du fer par votre organisme. En cas d'hémochromatose (maladie héréditaire se caractérisant par une surcharge en fer), adressez-vous à votre médecin car l'utilisation de ce médicament doit faire l'objet de précautions strictes.

• La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d'apparition d'une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

• La vitamine C peut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, notamment de tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire, avertissez votre médecin si des tests sont prévus.

Enfants et adolescents : Sans objet.**Interactions avec d'autres médicaments :**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient de la vitamine C. D'autres médicaments en combinaison de ce médicament peuvent avoir des effets indésirables.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux, issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

Vitamine C 1000 mg, comprimé effervescent, arôme orange, boîte de 10 comprimés effervescent

**LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA**
Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

Imp. AJUR

NVC429VFA01

ERGIC® 5 mg

Desloratadine

pelliculés, boîtes de 7 et 14 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'infos ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si les signes de votre maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ERGIC®, comprimé pelliculé ET D'UTILITÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ERGIC®, comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ERGIC®, comprimé pelliculé ET D'UTILITÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

Qu'est-ce que ERGIC® ?

ERGIC® contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

Comment agit ERGIC® ?

ERGIC® est un médicament contre l'allergie qui ne vous aide pas à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

Indications thérapeutiques :

Quand ERGIC® doit-il être utilisé ?

ERGIC® soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants.

ERGIC® est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserver votre sommeil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?

Contre-indications :

Ne prenez jamais ERGIC® :

Si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ou à la loratadine.

Mise en garde spéciale et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier avant de prendre ERGIC® :

• Si vous présentez une maladie des reins.

• Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de convulsions.

Enfants et adolescents :

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

Interactions avec d'autres médicaments :

Il n'y a pas d'interactions connues d'ERGIC® avec d'autres médicaments. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons :

ERGIC® peut être pris pendant ou en dehors des repas.

La plus grande prudence est recommandée si vous prenez de l'alcool en même temps que votre traitement par ERGIC®.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives : Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La prise d'ERGIC® n'est pas recommandée si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Fertilité : Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité chez l'humain.

Sportifs : Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

À la dose recommandée, il est peu probable que ce médicament affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Bien que la plupart des personnes ne ressentent pas de somnolence, il est néanmoins recommandé de tester votre réponse à ce médicament avant d'accomplir des activités exigeant une vigilance, telles que conduire des véhicules ou utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?

Votre médecin vous prescrira ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Adultes et adolescents de 12 ans et plus :

La dose recommandée est d'un comprimé une fois par jour avec de l'eau, au moment ou en dehors des repas.

Mode et voie d'administration :

Ce médicament est destiné à la voie orale.

Avaliez le comprimé en entier.

Durée du traitement :

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre ERGIC®. Si votre rhinite allergique est intermittente (présence de symptômes sur une période de moins de 4 jours par semaine ou sur une période inférieure à 4 semaines), votre médecin vous recommandera ce traitement pour une durée qui dépendra de l'évaluation des antécédents de votre maladie. Si votre rhinite allergique est persistante (présence de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

مخبريات

الإرشادات - حالات عدم الإستعمال - المفادير وكيفية الإستعمال : اقرأ البيان داخله.

Indications - Contre-indications - Posologie et mode d'emploi :

lire notice intérieure.

AMM N° : 120/20DMP/21/NNPD

المغرب - من اولاد صالح - الدار البيضاء - المكناس

Laboratoires GALENICA - Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

لا يترك في متناول الأطفال
Ne pas laisser à la portée des enfants.

يحفظ في أقل من 30 درجة مئوية.

Conserver à une température inférieure à 30°C.

قرصا ملبسا 30



• Sécheresse de la bouche ;

• Maux de tête.

Adultes

Depuis la commercialisation de la desloratadine, les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000.

• Battements du cœur irréguliers ou plus intenses ;

• Eruption cutanée ;

• Réactions allergiques sévères ;

• Nausées ;

• Battements du cœur rapides ;

• Vomissements ;

• Insomnie ;

• Vertige ;

• Hallucinations ;

• Agitation avec mouvements corporels augmentés ;

• Anomalies du bilan hépatique sanguin ;

• Inflammation du foie.

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

• Coloration jaune de la peau et/ou des yeux

• Faiblesse inhabituelle

Augmentation de la sensibilité de la peau au soleil, y compris en cas de soleil voilé, ainsi qu'au rayonnement ultraviolet (UV) par exemple aux lampes UV d'un solarium.

• Modification du rythme des battements du cœur.

• Anomalie du comportement

• Aggravité

• Prise de poids, augmentation de l'appétit

Enfants :

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

• Modification du rythme des battements du cœur.

• Anomalie du comportement.

• Rythme lent des battements du cœur.

• Aggravité.

5. COMMENT CONSERVER ERGIC®, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette thermoformée après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. À conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez un changement de l'aspect des comprimés.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Que contient ERGIC®, comprimé pelliculé ?

• La substance active est :

• Desloratadine

Desloratadine 5 mg. Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants du comprimé sont : Calcium phosphate dibasique, Cellulose microcristalline PH 102, Amidon de maïs prégelatinisé, Stéarate de magnésium, Carboxyméthylamyloamidon sodique, Laurylsulfate de sodium, Talc.

Le pelliculage du comprimé contient : Opadry II white, Carmin d'indigo.

Qu'est-ce qu'il contient de l'emballage extérieur :

ERGIC® 5 mg comprimés pelliculés est conditionné en plaquettes thermoformées dans des boîtes de 7, 14 et 30 comprimés.

Nom et adresse de l'EPi titulaire de l'AMM MAROC : Laboratoires pharmaceutiques GALENICA, N 13, G-5, Z.I. Ouled Saleh - Bouskoura -20180 - Casablanca - Maroc.

Nom et adresse du fabricant (quand celui-ci n'est pas titulaire de l'AMM) : Néant.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : Octobre 2018

Conditions de prescription et de délivrance : Liste II



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA

Casablanca - Maroc

FEBREX

BR-X[®]

COMPOSITION :

Phéniramine maléate
 Paracétamol
 Acide ascorbique (Vit C)
 Excipients q.s.p.
 Excipients à effet notoire :
 Granulés sans sucre : Aspartam.
 Granulés avec sucre : Saccharose 7.9g.

PROPRIÉTÉS :

FEBREX[®] Adulte agit en exerçant 3 actions pharmacologiques :

- Une action antihistaminique qui permet de réduire les rhinorrhées et les larmoiements associés, et qui s'oppose aux phénomènes spasmodiques tels que les éternuements en salve.
- Une action antalgique antipyrétique permettant une sédation de la fièvre et de la céphalée, myalgies).
- Une compensation en acide ascorbique de l'organisme.

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des affections ORL aiguës : rhumes, rhinites allergiques, rhinorhées.
- Traitement symptomatique des états grippaux.
- En cas d'affection bactérienne, une antibiothérapie peut être nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Insuffisance hépatocellulaire.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
- Adénome prostatique.
- Enfant de moins de 15 ans.
- Phénylcétonurie pour **FEBREX[®]** sans sucre (présence d'aspartam).
- Granulés avec sucre : En raison de la présence du saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, déficit en sucraase isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de fièvre élevée ou persistante, de survenue de signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, une réévaluation du traitement doit être faite.

Mises en garde :

- Le risque de dépendance essentiellement psychique n'apparaît que pour des posologies supérieures à celles recommandées et pour des traitements au long cours.
- Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments. Chez l'adulte de plus de 50 kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 4 g par jour.

Précautions d'emploi :

- L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs (barbituriques en particulier) qui potentialisent l'effet sédatif des antihistaminiques est à éviter pendant le traitement.
- Granulés avec sucre : tenir compte, dans la ration journalière, de la teneur en saccharose.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs est déconseillée pendant le traitement.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Sans Sucre

Adulte

- Rhume
- État Grippal
- Rhinite Allergique
- Rhinopharyngite



8 Sachets de Granulés



Pharmed
Laboratoires Pharmaceutiques

Sans Sucre
Voie Orale

PHARMED LOT : 4349
UT. AV : 05-26
PPV : 20DH00

A24050

NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS.

Pharmed
Laboratoires Pharmaceutiques
21, Quartier Burger - Casablanca

A24080 EXT 11