

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 282 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Hadjoud Aldeebas

Date de naissance : 1934

Adresse : Rue 1 N° 52 Hay Nazzala Hay Hassan

Tél. : 06.63.66.07.30 Total des frais engagés : 12.43.30 Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 03/01/2024

Nom et prénom du malade : ..... Age : 1

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : .....

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : 03/01/2024

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03.01.2024		5	1500	Dr. BABOU JERRAH Spécialiste des Maladies VASCULAIRES Adultes et Enfants Dr. Babou Jerrah, 1 <sup>er</sup> étage n° Lahjar 06 66 54 77 15 <b>CLINIQUE JERRAH</b> 413, AV. CASABLANCA Tel: 0522 24 31 31 - Fax: 0522 23 12 99 Email : jerrah@casablanca.ma

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
DR. TIP POLYCLINIQUE Route Mly Thami Hay Hassan Tel: 0522 90 21 57	31/01/2024	143.30

## ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
03/01/2024	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553
	D	00000000	B	00000000
		35533411		
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS      VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Nouvelle Ambulance SARL

Assistance Médicale Multi-Service 24/24

Date : 03/01/2024

# Facture N° 00693

Nom et Prénom : HA DDOUD Abdellaziz -

Transport normal à peu -

Ambulance en urgence -

SOS vers à domicile

Tél : 05 22 25 48 48  
Pompes Funèbres  
Assistance Médicale  
SOS Médecin à domicile  
NOUVELLE AMBULANCE

DH H.T. \_\_\_\_\_

T.V.A. 1% \_\_\_\_\_

TTC 400,000 Dhs \_\_\_\_\_

Ambulance Médicalisée • Avion • Sanitaires • Hospitalisation à Domicile • Ambulance avec Couveuse  
Pompes Funèbres • SOS Médecin

14 Lot Feddane Kheir, Bernoussi - Casablanca - Tél. : 05 22 25 48 48

E-mail : nouvelleambulance.urgence@gmail.com - Site Web : www.sosurgence-casa.com

R.C : 386733 - T.P : 31621662 - I.F : 24884804 - ICE: 0019866497000052



AKDITAL

1038

Clinique Jerrada Oasis  
مصحة جرادة الوازيس

Casablanca, le.....

03/08/2012

BABO  
Cardiologue des Malades d'Adultes et d'Enfants  
6600 Boulevard Abderrahim Bouabid Casablanca  
Tél. 05 22 23 81 82 Fax: 05 22 23 81 82  
E-mail: cliniquejerradaoasis@akdital.ma Site web: www.cliniquejerradaoasis.ma

- HL HADDOUD ABDALLAH
- 35000
- 1) - Rexaban 15 mg  
1sp x 21 jet 38mm  
puis passer
- 2) - Re 21000  
DR. TIR Abdelaziz Mich (Ne pas mettre que sur avis medical)  
PHARMACIE POLYCLINIQUE  
Bonne Mly Thamy Hay Hassan Casab  
Tél. 05 22 23 81 82 Fax 05 22 23 81 82
- 3) - Raniphen 140 mg  
87.00 140 mg  
4) - BioVance 800 x 07 jrs -  
PHARMACIE POLYCLINIQUE  
Bonna M. Abdellatif
- 5) - Pirinlys 100 mg x 36 x 05 jrs -  
PHARMACIE POLYCLINIQUE  
Bonna M. Abdellatif
- 113, Boulevard Abderrahim Bouabid (Ex-Jerrada), Oasis, Casablanca  
Tél. 05 22 23 81 81 / 05 22 23 84 52 / 56 / 54 - Fax: 05 22 23 81 82  
E-mail : cliniquejerradaoasis@akdital.ma - Site web : www.cliniquejerradaoasis.ma
- ISO 9001  
BUREAU VERITAS Certification
-

L'ingestion de ce mélange doit être immédiatement suivie par une prise d'aliments. Si nécessaire, votre médecin pourra aussi vous donner le comprimé écrasé en utilisant une sonde gastrique. Prenez les(s) comprimé(s) comprimé(s) chaque jour jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter. Essayez de prendre les(s) comprimé(s) comprimé(s) une heure fixe chaque jour afin de ne pas oublier. Votre médecin peut décrire les temps sous diverses poursuites le traitement. Pour prévenir la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins du cœur (AVC) et les autres vaisseaux sanguins de votre corps : Si vous avez des symptômes de maladie cardiaque ou de maladie vasculaire, prenez ces médicaments à l'heure indiquée par votre médecin.

- Si vous prenez un comprimé de 20 mg ou un comprimé de 15 mg une fois par jour et si vous avez oublié de prendre ce comprimé, prenez-le dès que vous avez oublié de prendre. Prenez le comprimé suivant le même jour pour compenser le retardement de votre prise que vous avez oublié de prendre. Pour éviter les effets secondaires, ne prenez pas plus d'un comprimé de 15 mg une fois par jour en une seule prise.

pharmaciens. Des questions sur les médicaments. Réexamen peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

Couvrir les autres médicaments du même type (les antithrombotiques), ce médicament peut provoquer des saignements chez tout le monde.

- 1 - Qu'est-ce que REXABAN® ? 15 mg de 20 mg, et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre REXABAN® ?
- 3 - Comment prendre REXABAN® ? 15 mg et 20 mg ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables événuels ?
- 5 - Comment contrôler REXABAN® ? 15 mg et 20 mg ?

**REXBAN® 15 mg et 20 mg**

**REXABAN® 15 mg**  
**Comprimés p**  
**Boîte de 14, 28 et 56 (15 mg)**  
**Boîte de 14, 28 et 56 (20 mg)**

**LOT 231449**

**EXP 06/26**

**PPV 213DH00**

▼ Ce médicament fait l'objet de mesures de sécurité. Veuillez déclarer les effets indésirables.

< Veuillez lire attentivement les instructions importantes pour vous.

- Gardez cette notice.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1 - Qu'est-ce que REXABAN® 15 mg et 20 mg, et dans quel cas est-il utilisé ?

2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

3 - Comment prendre REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5 - Comment conserver REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

6 - Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE REXABAN® 15 mg et 20 mg, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité.

Rexaban appartient à une classe de médicaments appelés antithrombotiques. Il agit en bloquant un facteur de la coagulation sanguine (le facteur Xa), réduisant ainsi la tendance du sang à former des caillots (code ATC : B01AF01).

Indications thérapeutiques :

Rexaban contient une substance active appelée Rivaroxaban et il est utilisé chez l'adulte pour :

- Prévenir la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau (Accident Vasculaire Cérébral, ou AVC) et dans les autres vaisseaux sanguins de votre corps si vous souffrez d'une irrégularité du rythme cardiaque appelée fibrillation atriale non valvulaire.

- Traiter les caillots sanguins qui se sont formés dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) et dans les vaisseaux sanguins de vos poumons (embolie pulmonaire), et prévention la réapparition de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins de vos jambes et/ou de vos poumons.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE REXABAN® 15 mg et 20 mg ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Contre-indications :

Ne prenez jamais REXABAN 15 mg et 20 mg :

- Si vous êtes allergique au Rivaroxaban ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes sujet à des saignements excessifs.

- Si vous avez une maladie ou une prédisposition au niveau d'un organe qui augmente les risques de saignements importants (par exemple un ulcère de l'estomac, une blessure ou un saignement dans le cerveau, une intervention chirurgicale récente du cerveau ou des yeux).

- Si vous prenez déjà des médicaments pour empêcher la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), sauf lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte.

- Si vous présentez une maladie du foie augmentant les risques de saignement.

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, ne prenez pas ce médicament et prévenez votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec REXABAN 15 mg et 20 mg :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Si vous présentez un risque accru de saignement, ce qui pourrait être le cas dans les situations suivantes :

- insuffisance rénale sévère, car l'état de votre fonction rénale peut avoir une influence sur la quantité de médicament pouvant agir dans votre corps ;

- si vous prenez d'autres médicaments destinés à prévenir la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte ;

- troubles hémorragiques ;

- pression artérielle très élevée, non contrôlée par un traitement médicamenteux ;

- maladie de l'estomac ou de l'intestin susceptible d'entrainer un saignement, par ex. inflammation des intestins ou de l'estomac ou inflammation de l'œsophage par ex. due à un reflux gastro-oesophagien, (remontées acides de l'estomac vers l'œsophage) ;

- anomalies au niveau des vaisseaux sanguins du fond de l'œil (rétinopathie) ;

- maladie des poumons avec dilatation des bronches et présence de pus (bronchectasie), ou antécédents de saignement dans les poumons.

- Si vous avez une valve cardiaque artificielle.

- Si votre médecin considère que votre pression artérielle est instable ou si un autre traitement ou une intervention chirurgicale pour enlever le caillot sanguin de vos poumons est prévu.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous devez être traité(e) par ce médicament et s'il est nécessaire de vous surveiller étroitement.

Si vous devez bénéficier d'une intervention chirurgicale :

- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'opération.

- Si l'intervention chirurgicale implique l'utilisation d'un cathéter ou une injection dans votre colonne vertébrale (pour une anesthésie péridurale ou rachidienne ou pour l'injection d'un calmant, par ex.) :

- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'injection ou le retrait du cathéter.

## D) DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE : Février 2016.

Si vous souffrez de diarrhée sévère (avec de l'eau ou du sang), accompagnée de symptômes tels que fièvre, douleur abdominale ou sensibilité abdominale arrêtez de prendre RANCIPHEX® et consultez immédiatement votre médecin.  
Si vous n'arrivez pas à prendre RANCIPHEX® pendant long terme (parce que les symptômes sont toujours aussi importants), parlez-en à votre médecin.

- La posologie habituelle est de 1 comprimé par jour aussi longtemps que nécessaire.

- Prenez le comprimé le matin.

- Votre médecin voudra ajuster votre posologie.

Pour les ulcères de l'estomac et l'intestin :

- La posologie habituelle pendant 6 semaines.

- Prenez le comprimé le matin.

- Votre médecin peut vous prescrire des supplémentaires si vous souffrez d'ulcères de l'intestin.

Pour les ulcères de l'estomac et l'intestin :

- La posologie habituelle pendant 4 semaines.

- Prenez le comprimé le matin avant de manger.

- Votre médecin peut vous demander de prendre RANCIPHEX® pendant 4 semaines supplémentaires si votre état ne s'améliore pas.

Pour les ulcères causés par une infection par *Helicobacter Pylori* et pour éviter qu'ils se reproduisent :

- La posologie habituelle est de 1 comprimé de RANCIPHEX® 20 mg deux fois par

PPV: 113 DH 70  
RANCIPHEX® 20 mg une fois par jour

## RANCIPHEX® pendant 6 semaines

### 10. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance et y compris un médicament à base de plantes, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous prenez en particulier l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

- Kétoconazole ou itraconazole - utilisés pour traiter les infections causées par un champignon. RANCIPHEX® peut diminuer le taux de ce type de médicament dans votre sang. Votre médecin pourra avoir besoin d'ajuster votre dose.

- Alazanavir - utilisé pour traiter l'infection par le VIH. RANCIPHEX® peut diminuer le taux de ce type de médicament dans votre sang et ils ne doivent pas être utilisés ensemble.



# BioVanic®

comprimé pelliculé sécable  
voie orale

Lévofoxacin

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice pour toute information supplémentaire.

- Si vous avez toutes les informations nécessaires, n'oubliez pas d'en faire part à votre pharmacien.

- Ce médicament vous protège contre les infections bactériennes.

- N'offrez pas ce médicament à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.

- Ce médicament peut être nocif.

- si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous ne connaissez pas un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

LOT : M0978

PER : 02/2025

PPU : 87,00 DH

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que BIOVANIC 500 MG et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BIOVANIC 500 MG ?
3. Comment prendre BIOVANIC 500 MG ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIOVANIC 500 MG ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. Qu'est-ce que BIOVANIC 500 MG et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques de la famille des fluoroquinolones - code ATC : J01MA12.

Le nom de votre médicament est BIOVANIC 500 mg comprimé pelliculé sécable.

BIOVANIC 500 mg comprimé pelliculé sécable contient une substance active : la lévofoxacine. Elle appartient à un groupe de médicaments appelés fluoroquinolones. La lévofoxacine est un antibiotique de type « quinolone ». Elle agit contre les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

BIOVANIC 500 mg comprimé pelliculé sécable peut être utilisé pour traiter les infections suivantes :

• Sinus.

• Poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires tels que la pneumonie.

• Voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou votre vessie.

• Prostate, lorsque vous avez une infection qui dure.

• Peau et tissus sous-cutanés, y compris les muscles. C'est ce que l'on appelle les « tissus mous ».

Dans certaines situations particulières, BIOVANIC 500 mg comprimé pelliculé sécable peut également être utilisé pour diminuer les risques de contracter une maladie connue sous le nom de « maladie du charbon » ou les risques d'aggravation de la maladie connue sous le nom de « maladie bactérienne responsable de la maladie du charbon ».

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BIOVANIC 500 MG ?

Consultez votre médecin si vous n'êtes pas certain de faire partie d'un groupe de personnes qui doivent éviter ce médicament.

### Ne prenez jamais BIOVANIC 500 MG :

• Vous êtes allergique à la lévofoxacine, à d'autres antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, à la moxifloxacin, à la ciprofloxacin ou à l'ofloxacin, ou à l'un des ingrédients contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

• Les signes d'une réaction allergique sont notamment : une éruption cutanée, des problèmes pour avaler ou pour respirer, un gonflement des lèvres ou de la langue.

• Vous avez déjà eu des crises d'épilepsie.

• Vous avez déjà eu un problème à vos tendons, tels qu'une tendinite ou une entorse, avec un traitement par un antibiotique de la famille des fluoroquinolones.

• Vous êtes un enfant ou un adolescent en période de croissance.

• Vous êtes enceinte, vous pourriez être enceinte ou vous pensez être enceinte.

• Vous allaitez.

Ne prenez pas ce médicament si l'une des conditions ci-dessus s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BIOVANIC 500 mg comprimé pelliculé sécable.

### Avertissements et précautions :

#### Avant de prendre ce médicament

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, y compris la lévofoxacine, si vous avez déjà présenté un effet indésirable lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, informez votre médecin au plus vite.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BIOVANIC 500 mg comprimé pelliculé sécable si :

• Vous avez 60 ans ou plus.

• Vous prenez des corticostéroïdes, parfois appelés stéroïdes (y compris les inhalateurs et BIOVANIC 500 mg comprimé pelliculé sécable).

• Vous avez subi une transplantation.

- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
- chez l'enfant : 500 mg/jour à 20-40 mg/kg/jour

Dans certains cas, votre partenaire doit être impérativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.

#### DANS TOUTES LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Voie orale:

Avaler les comprimés avec de l'eau.

#### Fréquence d'administration

1 à 3 fois ----- ions.

#### Duré

Pour

et au

La di-

guéri-

mais

serait

Cas pa-

est de

certain

due à :

Si vous

dû :

Consulte

En cas s-

consulte

Il peut êt-

RE. QUEL



LOT : 23E018  
PER. 04 2028

doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites car vous l'aurez conseillé.

Si autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes atteignez n'est pas due au traitement antibiotique il de réduire ou de suspendre votre traitement et retarderait votre guérison.

ent de la lambilase (infection due à un parasite) de l'amibiase (infection due à un parasite) et de l') est de 7 jours; pour la trichomonase (infection t en une prise unique.

0 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez

ci ou votre pharmacien.  
coordonner les mouvements, désorientation,

traitemen

#### TRÉS EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Manifestations digestives :** troubles digestifs non graves : douleurs au niveau de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhée; + inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, troubles du goût, perte d'appétit; + pancréatite (inflammation du pancréas) reversible à l'arrêt du traitement; - décoloration ou modification de l'aspect de la langue (peut être provoquée par le développement d'un champignon).

**Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses :** + bouffées de chaleur avec rougeur du visage, démangeaisons, éruption sur la peau parlant accompagnée de fièvre; + urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqûre d'ortie), brûlure gênante du visage et du cou d'origine allergique (céderme de Quincke), choc d'origine allergique pouvant mettre la vie en jeu (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL ?); + très rares cas de rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules et accompagnée de fièvre (pustulose exanthématisante aiguë généralisée) (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL ?); - Éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson); + Erythème pigmenté fixe : éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de brûlure faisant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament.

**Manifestations nerveuses :** atteinte des nerfs des membres (neuropathie sensitivess périphériques) traduisant par les manifestations au niveau des mains et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, diminution de la sensibilité du toucher; + maux de tête; + vertiges; + convulsions; + confusion; + troubles neurologiques appelés encéphalopathies ou syndrome cérébelleux, se traduisant par un état de confusion, des troubles de la conscience, du comportement, des difficultés à coordonner les mouvements, des troubles de la prononciation, des troubles de la marche, des mouvements involontaires des yeux, des tremblements. Ces troubles sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement et peuvent être associés à des modifications de l'imagerie médicale (IRM). D'exemples non cas d'évolution fatale ont été rapportés (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL ?); + méningite non microbienne.

**Troubles psychiques :** + hallucinations; + troubles de la personnalité (paranoïa, délire) pouvant s'accompagner d'idées ou d'actes suicidaires (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL ?); + tendance à la dépression.

**Troubles visuels :** + troubles visuels passagères tels que vision trouble, vision double, myopie, diminution de la vision, changement dans la vision des couleurs;

+ atteinte/inflammation du nerf optique.

**Troubles sanguins :** + taux anormalement bas de plaquettes dans le sang, taux anormalement bas ou chute importante de certains globules blancs (neutrophiles) dans le sang.

**Manifestations au niveau du foie :** + Augmentation des enzymes hépatiques (transaminases, phosphatas alcalines); + très rares cas de maladie grave du foie (parfois accompagnés de jaunissement) notamment des cas d'insuffisance hépatique nécessitant une transplantation.

**Autres :** + coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'adresse email : pharmacovigilance.maroc@sanoft.com. Tel standard : +212 (0) 22 66 90 00.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

Conserver les plaquettes dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière. Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

Ce que contient FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé

La substance active est : Métronidazole ..... 500,00 mg  
Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont : Amidon de blé, povidone K30, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 2000.

Qu'est-ce que FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur

Le médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé.

Boîte de 20.

**La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Janvier 2021.**

Tableau A (Liste I).

#### Conseil d'éducation sanitaire :

#### QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle. Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas : la dose à prendre ; les moments de prise ; et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2- Respectez strictement votre ordonnance.

3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

#### Titulaire d'AMM au Maroc :

sanoft-aventis Maroc. Route de Rabat R.P.1, Ain Sébaâ, Casablanca.

Lahcen BOUCHAOURI, Pharmacien Responsable.

#### Nom et adresse du fabricant :

Maphar, Boulevard ALKIMIA N°6 QJ-Sidi Bernoussi, Casablanca.

pelliculé".  
des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre moins souvent et votre  
ce médicament moins souvent et votre  
à vous examiner.  
La dompéridone accro de troubles cardiaques.  
les patients prenant des médicaments pharmaceutiques pour traiter les problèmes ou bactériens. Autres médicaments comprimé pelliculé).  
La dompéridone doit être utilisée à la dose efficace la plus faible chez l'adulte et chez l'enfant.

Pendant le traitement par la dompéridone, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par la dompéridone devra alors être arrêté. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Interactions avec d'autres médicaments

Ne prenez jamais PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé si vous prenez des médicaments pour traiter : • des infections fongiques (dues à des champignons), tels que des antifongiques azolés, en particulier le kétocozaole oral, le fluconazole ou le voriconazole ; • des infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthromycine, la moxifloxacine, la pentamidine (ce sont des antibiotiques) ; • des problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, la quinidine, la disopyramide, le dofétidile, le sotalol, le diltiazem, le vérapamil) ; • une psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, la sertindole) ; • une dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ; • des troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ; • une allergie (par exemple la méciquazine, la mizolastine) ; • le paludisme (en particulier l'halofantrine) ; • le VIH/SIDA (les inhibiteurs de protéase) ; • un cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincamine).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques ou le VIH/SIDA.

Il est important de demander à votre médecin ou votre pharmacien si PERIDYS est sûr pour vous lorsque vous prenez d'autres médicaments, y compris des médicaments délivrés sans ordonnance.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse : Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si ce médicament vous est prescrit au cours de la grossesse, respectez la posologie et la durée du traitement établies par votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

32,80

