

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 08658 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : NATI EL MEKKI

Date de naissance : 03/11/1970

Adresse : ESC LAIA YOUNE

Tél. : 0666 281541 Total des frais engagés : 1556,20 (200 + 174,20 + 982,00) Dhs + 900

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22 NOV. 2023

Nom et prénom du malade : NATI WITDANE Age : 2000

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Copopathie

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie : _____

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : _____

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Constitue Le : 12/23

Signature de l'adhérent(e) : NATI WITDANE



Déclaration de Maladie

M23-0017610

190093


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Remboursement des Actes |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| NOV. 2023 07/12/22 | C | 1 | 200,00 | Benslimane ANDALOUSSI Med Docteur en Médecine et en Chirurgie Boulevard Abdellah Ben Khedda Résidence Al Ahfad N°4 Sidi Maarouf-Casablanca Téléphone : 0522 97 35 56 Residence Al Ahfad Résidence Al Ahfad Résidence Al Ahfad |

| EXECUTION DES ORDONNANCES | | |
|--|----------|-----------------------|
| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
| <i>Leila Lotfi</i> | 07/12/23 | 129,00 |

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|--|----------|------------------------------|------------------------|
| Laboratoire d'Analyse MJHARLAB Centre Commercial Soufiane Lot. Chicha Sidi Maarouf - Casablanca Tel: 0522 58 35 56 - Fax: 0522 58 60 00 | 07/12/23 | B: 1.850 | 900,00 DH |

| AUXILIAIRES MEDICAUX | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|-----|-----|---------------------------------|
| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | Montant détaillé des Honoraires |
| | | A M | P C | I M | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-------------|---|----------|---|----------|---|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|--|--|--|
| Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COEFFICIENT DES TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTANTS DES SOINS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBUT D'EXECUTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN D'EXECUTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANALYSES - RADIOPHOTOGRAPHIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.D.F PROTHESES DENTAIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>G</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td></td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00000000</td> <td></td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35533411</td> <td></td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | H | 25533412 | G | 21433552 | D | 00000000 | | 00000000 | | 00000000 | | 00000000 | | 35533411 | | 11433553 | B | | | |
| H | 25533412 | G | 21433552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 00000000 | | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00000000 | | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35533411 | | 11433553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTANTS DES SOINS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE DU DEVIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE DE L'EXECUTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Benslimane A. Mohammed

Docteur en Médecine, MG

Bd. Abou Bakr El kadiri, Rés. Al Ahfad Imm. "E"
1^{er} étage, N°4 Sidi Maarouf - Casablanca
Tél. : 05 22 33 51 01 - GSM : 0661 41 38 87

بنسلیمان اُمر حمر

دكتور في الطب

شارع أبو بكر القادرى إقامة الأحفاد عمارة "E"
رقم 4 الطابق الأول سيدى معروف -البيضاء
الهاتف : 0661 41 38 87 / 0522 33 51 01

Le: 22/11/28 ,

Ade Naji Windows

NFS + Feruhue

AC Antillean gull *gularis*

Type IVA

Ereunetes paradoxus Is
1910

Selley —

W. B. de Blieck

$\rightarrow \text{O}_2$

BENSI IMANE ANDALOUSSI Mohammed

~~ENSEIGNEMENT ANDALOU
DOCTEUR EN MEDECINE M~~

DOCTEUR EN MEDICINE
Av. Abou Badr El Kadi - Rés Ahfad
Sidi Maatouf - CASABLANCA

Tel 05 22 33 51 01

ICE : 002227238000015 - TP : 4303 / 2017 - INPE : 091028746

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MIJHARLAB

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI,
Sidi Maarouf, Casablanca

Tél : 0522583556 - Fax : 0522581805

IF: 15252767 - TP: 36167325 - CNSS: 43023445 - ICE: 000114256000076 - INPE: 093061760

FACTURE N° : 230014327

Casablanca le 27-11-2023

Mlle Wijdane NAJI

Demande N° 2311272058
Date de l'examen : 27-11-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses

| CN | Analyse | Val | Clefs |
|------|---|------|-------|
| 0118 | Recherche d'Ag Helicobacter pylori dans les selles | B150 | B |
| 0119 | Glycémie | B30 | B |
| 0119 | Hémoglobine glycosylée | B100 | B |
| 0154 | Ferritine | B250 | B |
| 0216 | Numération formule | B80 | B |
| 0254 | Parasitologie (Examen direct + enrichissement) | B40 | B |
| 0551 | Anticorps anti transglutaminase tissulaire IgA si prescription isolée | B200 | B |

Total des B : 850

TOTAL DOSSIER : 900.00 DH

Type de règlement : Espèces le 27-11-2023

Arrêtée la présente facture à la somme de : neuf cents dirham s

Laboratoire d'Analyse Médicales
MIJHARLAB
Centre Commercial Soufiane, Lot Chaima
Sidi Maarouf - Casablanca
Tél: n° 05 22 58 35 56 - Fax: 05 22 58 18 05



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale

D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux

Prélèvement du : 27-11-2023 à 11:55

Identifiant : 2311272058

Edition : 28-11-2023

Patient : Mlle NAJI Wijdane

Date de naissance : 17-11-2000

Référence : 2311272058

Prescripteur : Dr BENSLIMANE A.MOHAMMED

HEMATOCYTOLOGIE

Hémogramme : NFS

Cytométrie de flux(Penta 60C+)

| | | | |
|-------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Hématies : | 4.28 | $10^6/\mu\text{L}$ | (3.90-5.40) |
| Hémoglobine : | 13.5 | g/dL | (12.0-15.6) |
| Hématocrite : | 39.3 | % | (35.5-45.5) |
| VGM : | 92.0 | fL | (80.0-99.0) |
| TCMH : | 31.4 | pg | (27.0-33.5) |
| CCMH : | 34.3 | g/dL | (30.0-36.0) |
| Leucocytes : | 7.30 | $10^3/\mu\text{L}$ | (3.90-10.20) |
| Polynucléaires Neutrophiles : | 48.9 | % | |
| Soit: | 3.58 | $10^3/\mu\text{L}$ | (1.50-7.70) |
| Polynucléaires Eosinophiles : | 3.0 | % | |
| Soit: | 0.22 | $10^3/\mu\text{L}$ | (0.02-0.50) |
| Polynucléaires Basophiles : | 0.5 | % | |
| Soit: | 0.04 | $10^3/\mu\text{L}$ | (<0.20) |
| Lymphocytes : | 39.4 | % | |
| Soit: | 2.89 | $10^3/\mu\text{L}$ | (1.00-4.00) |
| Monocytes : | 8.2 | % | |
| Soit: | 0.60 | $10^3/\mu\text{L}$ | (0.10-0.90) |
| Plaquettes : | 266 | $10^3/\mu\text{L}$ | (150-370) |

BIOCHIMIE SANGUINE

| | | | |
|-----------------|------|--------|-------------|
| Glycémie à jeûn | 0.92 | g/L | (0.70-1.10) |
| | 5.11 | mmol/L | (3.89-6.11) |

Demande validée par : Dr Koutair Samira

Laboratoire d'Analyse Médicales
MIJHARLAB
Centre Commercial Soufiane, Lot Chaima
Sidi Maarouf - Casablanca
Page 1/4
Tél: 05 22 58 35 56 - 05 22 58 18 05 - Fax: 05 22 53 18 05

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - 05 22 58 18 05 - Contactez pour RDV ☎ 06 64 46 14 35 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale

D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux

2311272058 – Mlle Wijdane NAJI

**Hémoglobine glycosylée
(HbA1C)**
(HPLC TOSOH-GX)

5.5

Valeurs de référence :

Sujet normoglycémique : 4 à 6 %

Sujet diabétique équilibré : Objectif ciblé autour de 6.5 %

Diabète mal équilibré : Taux supérieur à 8%

Ferritine
(Technique immuno-fluorescence AIA-360)

17.70 ng/mL

(9.00–159.00)

AUTO-IMMUNITÉ

**Anticorps
anti-transglutaminases (IgA)**
(Elisa sur Algeria)

1.00 UI/ml

Interprétation:

<10:Négative

>10:Positive

BACTERIOLOGIE

Recherche d'Ag Helicobacter pylori dans les selles

Demande validée par : Dr. Samira Dr Koutair

Laboratoire d'Analyses Médicales
MIJHARLAB
Centre Commercial Soufiane, Lot. Chaima
Sidi Maarouf - Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - Fax: 05 22 58 18 05
Page 2/4

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - 05 22 58 18 05 - Contactez pour RDV ☎ 06 64 46 14 35 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr

IF : 15252767 - TP : 36167325 - CNSS : 43023445 - ICE : 000114256000076



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale


D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux

2311272058 – Mlle Wijdane NAJI

(Méthode immuno-chromatographique)

Résultat :

Recherche négative



Demande validée par : Dr. Samira Dr Koutair


Laboratoire d'Analyses Médicales
MIJHARLAB
Centre Commercial Soufiane, Lot Chaima,
Sidi Maarouf - Casablanca
Tel: 05 22 58 35 56 - Fax: 05 22 58 18 05
Page 3/4

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - 05 22 58 18 05 - Contactez pour RDV ☎ 06 64 46 14 35 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr

IF : 15252767 - TP : 36167325 - CNSS : 43023445 - ICE : 0001142560000076



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale

D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux

2311272058 – Mlle Wijdane NAJI

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE

EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES

Recueil

Reçueillies au laboratoire

Examen macroscopique :

Aspect

Dures, moulées

Couleur

Marron clair

Mucus

Absence

Examen microscopique:

Cristaux de Charcot-Leyden

Absence

Cellules épithéliales

Rares

Leucocytes

Quelques

Hématies

Rares

Levures

Rares

Examen parasitologique :

Examen microscopique

Absence d'oeufs, de kystes ou de formes végétatives de parasites

Demande validée par : Dr. Samira Dr Koutair


Laboratoire d'Analyses Médicales
MIJHARLAB
Centre Commercial Soufiane, Lot.
El Maarouf - Casablanca
Tél: 05 22 58 35 56 - 05 22 58 18 05 - Fax: 05 22 58 18 05
Page 4/4

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca

Tél: 05 22 58 35 56 - 05 22 58 18 05 - Contactez pour RDV ☎ 06 64 46 14 35 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr

IF : 15252767 - TP : 36167325 - CNSS : 43023445 - ICE : 000114256000076

Benslimane A. Mohammed

Docteur en Médecine, MG

Bd. Abou Bakr El kadiri, Rés. Al Ahfad Imm. "E"

1^{er} étage, N°4 Sidi Maarouf - Casablanca

Tél. : 05 22 33 51 01 - GSM : 0661 41 38 87

بنسلیمان ا. محمد

دكتور في الطب

شارع أبو بكر القادي إقامة الأحفاد عمارة "E"

رقم 4 الطابق الأول سيدى معروف - البيضاء

0661 41 38 87 / 0522 33 51 01

الهاتف :

Le: 22/11/23

Julie NAFI WIDANE

Second

1/5 1 dose Uniper

Écarbeur pur

1/5 2 - 2 - 0

Lixipir

1/5 0 - 0 - 1 x Mens

Calibre drg ut

0 - 0 - 1

BENSLIMANE ANDALOUSSI Mohammed
DOCTEUR EN MÉDECINE MG
Av. Abou Badr El Kadiri - Rés. Ahfad
Sidi Maarouf - CASABLANCA
Tel. 05 22 33 51 01

174,00

ICE : 00222723800015 - TP : 4303 / 2017 - INPE : 091028746



Benslimane A. Mohammed

Docteur en Médecine, MG

Bd. Abou Bakr El kadiri, Rés. Al Ahfad Imm. "E"
1^{er} étage, N°4 Sidi Maarouf - Casablanca
Tél. : 05 22 33 51 01 - GSM : 0661 41 38 87

بنسلیمان ا. محمد

دكتور في الطب

شارع أبو بكر القادرى إقامة الأحفاد عمارة "E"
رقم 4 الطابق الأول سيدى معروف - البيضاء
الهاتف : 0661 41 38 87 / 0522 33 51 01

Le:

07/12/23

Ms. Naji Wittame

Tropex Fol
1 - 0 - 0



Mars

BENSLIMANE ANDALOUSSI Mohammed
DOCTEUR EN MÉDECINE MG
Av. Abu Badr El Kadir - Rés. Al Ahfad
Sidi Maarouf - CASABLANCA
Tél. 05 22 33 51 01

PHARMACIE AMINE SARL
Lejia El Khoudra
Lotissement Amine, N° 65
Sidi Maarouf - Casablanca
Tel. 0522 97 25 85



ES UTILISATEURS

avis avec un docteur, demandez
d'en de la relire.
cette notice avant

2. Composition du médicament :
Chaque flacon uni-dose contient:
Principe actif (solution):
Fer protéiné succinate 800 mg (équivalent à 40 mg de Fe²⁺)
Excipient:
Sorbitol [E202], propylène glycol, parahydroxybenzoate de méthyle sel de sodium, parabéne, saccharine de sodium, eau purifiée.
Exceptués à effet notable: parahydroxybenzoate de méthyle sel de sodium, parahydroxybenzoate de propyle sel de sodium.

Principe actif (bouchon téterviroïd)
Calcium folinique pentahydrate 0,235 mg (équivalent à 0,185 mg de l'acide folinique)
Excipient:
Manitol [E421]

3. Classe pharmaco-thérapeutique :
Classe: pharmaco-thérapeutique : médicament antianémique
contenant du fer ferrrique en association avec de l'acide folinique.
Code ATC: B03DA09

4. Indications thérapeutiques :
Prévention et traitement des états de carence en fer et en acide folique: anémies hypochromes, normochromes, anémies mégaloblastiques et macrocytaires; chez les enfants, secondaires à un apport déficient ou à une diminution de l'absorption du fer ou des folates; anémies dues à la grossesse, post-partum, allaitement.

5. Posologie :
Adultes: 1 à 2 flacons par jour selon votre médecin prescripteur, enfants en deux prises, de préférence avant les repas.
En administrant 1,5 ml/jour selon votre médecin prescripteur, répartis en deux prises, de préférence avant les repas, le contenu du flacon peut être bu directement à platir du flacon ou peut être dilué dans de l'eau.
Enlever la bague de sécurité du bouchon réservoir. Pousser fermement le bouchon réservoir jusqu'à ce que la poudre se verse dans la solution. Bien agiter, retirer le bouchon réservoir et boire la

solution directement du flacon ou diluer avec de l'eau.
6. Contre-indications :
Hypersensibilité connue aux principes actifs ou à l'un des excipients.
Hémorragie, hémochromatose, anémie aplasique, hémolytique ou anémies sidéro-adréstitiques (sidéroblastiques) (anémies dues à l'utilisation du fer aftertreatment).

7. Effets indésirables :
Troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée, constipation, nausée et douleurs épigastriques peuvent très rarement se produire, particulièrement à très fortes doses; ces effets indésirables sont réduits par la diminution de la dose ou l'arrêt du traitement. Les effets à base de fer peuvent colorer les selles en noir ou gris noir.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi:
PRÉCAUTION D'EMPLOI:
Pas d'avertissements particulières sont nécessaires sur les risques de tolérance ou de dépendance. Le traitement ne doit pas dépasser 6 mois, sauf en cas de saignement persistant, ménorrhagie ou grossesse.

AVERTISSEMENT SPÉCIAL:
La cause de la carence en fer ou anémie par carence en fer doit être vérifiée et correctement traitée, à côté de la thérapie en fer. Toute maladie sous-jacente à une carence en fer ou anémie par carence en fer doit être vérifiée et correctement traitée.

Comme le produit contient des protéines de lait, il doit être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d'intolérance aux protéines de lait qui peuvent présenter des réactions allergiques.

FERPLEX FOL flacon uni-dose contient du sorbitol; les patients ayant une intolérance hépatofécale rare au fructose ne doivent pas prendre ce médicament.

FERPLEX FOL flacon uni-dose contient des parabénines (méthyl-parahydroxybenzoate sel de sodium) qui peuvent provoquer habituellement des réactions allergiques de type retardé.

9. Interactions:

Le fer peut altérer l'absorption ou la biodisponibilité des tétracyclines, bisphosphonates, quinolones, agents anti-infectieux, épiastrytiques, nausées, vomissements, diarrhées et hématomése, souvent associée à une somnolence, pâleur, cyanose, état de choc (anaphylaxie, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissent comme les antagonistes compétitifs des folates. Par conséquent, dans les maladies néoplasiques ou leucémiques traitées par des antifoliques, l'administration de FERPLEX FOL, ainsi que l'administration de tout autre médicament contenant de l'acide folinique, peut entraîner une diminution de l'efficacité de ces médicaments.

Aucune interaction pharmacologique n'a été signalée durant le traitement concordant avec les antagonistes H2.

Certains médicaments (antiphlogistiques et antileucémiques (aminoptérine, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissent comme les antagonistes compétitifs des folates. Par conséquent, dans les malades néoplasiques ou leucémiques traitées par des antifoliques, l'administration de FERPLEX FOL, ainsi que l'administration de tout autre médicament contenant de l'acide folinique, doit être évitée.

Vous devrez également éviter l'administration de FERPLEX FOL avec certains antibactériens (sulfamides, triméthoprime), car il peut diminuer l'efficacité de ces médicaments.

Interactions avec les aliments et les boissons:

Les agents complexant du fer (tel que les phosphates, les phytates et les oxalates) contenus dans les légumes et le lait, le café et le thé inhibent l'absorption du fer. FERPLEX FOL doit être pris après un intervalle de 2 heures après l'administration d'un de ces aliments ou boissons.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives:

Sans objet.

Interactions avec les essais analytiques:

FERPLEX FOL peut interférer avec les tests de laboratoire de recherche de sang occulte.

10. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement:

Il n'y a aucun avertissement particulier pendant la grossesse et en fer qui peuvent se produire dans de telles circonstances.

Cher la femme, bien qu'il existe pas d'études définitives, son utilisation n'est pas recommandée pendant le premier trimestre de grossesse, et si est utilisée, il faut toujours évaluer les risques possibles et les bénéfices du traitement.

Le paracetamol passe dans le lait maternel c'est pourquoi les femmes qui allaitent doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce médicament.

11. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines:

Aucune donnée n'est disponible sur l'effet de ce produit sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines. Cependant un effet est peu probable.

12. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage:

Après ingestion massive de sédu de fer, peuvent survenir des douleurs épiastrytiques, nausées, vomissements, diarrhées et hématomése,

souvent associée à une somnolence, pâleur, cyanose, état de choc pouvant aller jusqu'au coma. Le traitement consiste à l'administration immédiate d'un émétique suivi d'un lavage gastrostique si nécessaire, associé à des mesures preventives appropriées. Si nécessaire, des agents chelateurs du fer comme la déféroxamine peuvent être administrés.

Gastrite si nécessaire, associé à des mesures preventives appropriées. Si nécessaire, des agents chelateurs du fer comme la déféroxamine peuvent être administrés.

13. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses:

Parce qu'il n'y a pas d'effet cumulatif, une dose manquée peut être prise.

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la dose suivante le plus rapidement possible puis poursuivez votre traitement normalement.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

14. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Médicament soumis à prescription médicale.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur pour le protéger de la lumière.

15. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte après la mention EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les personnes non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment se définir de ces boîtes de médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

Aspect du produit et contenu de la boîte:

FERPLEX FOL se présente sous la forme d'une solution orale transparente de couleur marron et avec une odeur caractéristique.

Boîte de 10 flacons uni-doses avec bouchon réservoir contenant 100 mg de poudre pour solution extemporanée.

FABRICANT:

ITALFARMACO S.p.A.

CSan Isidro, 3, Polígono Industrial de Alcobendas

28108 Alcobendas-Madrid-Espagne.

ABC Farmaceutici S.p.A.

Establishment sis à Locilia San Bernardo-10090 Icrea [10].

Via Galton Moretti, 29 Italia

Province Bergamo, Italy.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ AU MAROC:

Versalya

Laboratoire pharmaceutique VERSALYA.

Zone industrielle Had Soualem lot 149.

Date de révision de la notice : Janvier 2018.



ES UTILISATEURS

avis avec un docteur, demandez
d'en de la relire.
cette notice avant

2. Composition du médicament :
Chaque flacon uni-dose contient:
Principe actif (solution):
Fer protéiné succinate 800 mg (équivalent à 40 mg de Fe²⁺)
Excipient:
Sorbitol [E202], propylène glycol, parahydroxybenzoate de méthyle sel de sodium, parabéne, saccharine de sodium, eau purifiée.
Exceptués à effet notable, parahydroxybenzoate de méthyle sel de sodium, parahydroxybenzoate de propyle sel de sodium.

Principe actif (bouchon téterviroïde)
Calcium folinique pentahydrate 0,235 mg (équivalent à 0,185 mg de l'acide folinique)
Excipient:
Manitol [E421]

3. Classe pharmaco-thérapeutique :
Classe: pharmaco-thérapeutique : médicament antianémique
contenant du fer ferrrique en association avec de l'acide folinique.
Code ATC: B03DA09

4. Indications thérapeutiques :
Prévention et traitement des états de carence en fer et en acide folique: anémies hypochromes, normochromes, anémies mégaloblastiques et macrocytaires; chez les enfants, secondaires à un apport déficient ou à une diminution de l'absorption du fer ou des folates; anémies dues à la grossesse, post-partum, allaitement.

5. Posologie :
Adultes: 1 à 2 flacons par jour selon votre médecin prescripteur, enfants en deux prises, de préférence avant les repas.
En administrant 1,5 ml/jour selon votre médecin prescripteur, répartis en deux prises, de préférence avant les repas, le contenu du flacon peut être bu directement à platir du flacon ou peut être dilué dans de l'eau.
Enlever la bague de sécurité du bouchon réservoir. Pousser fermement le bouchon réservoir jusqu'à ce que la poudre se verse dans la solution. Bien agiter, retirer le bouchon réservoir et boire la

solution directement du flacon ou diluer avec de l'eau.
6. Contre-indications :
Hypersensibilité connue aux principes actifs ou à l'un des excipients.
Hémorragie, hémocromatose, anémie aplasique, hémolytique ou anémies sidéro-adréstitiques (sidéroblastiques) (anémies dues à l'utilisation du fer aftertreatment).

7. Effets indésirables :
Troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée, constipation, nausée et douleurs épigastriques peuvent très rarement se produire, particulièrement à très fortes doses; ces effets indésirables sont réduits par la diminution de la dose ou l'arrêt du traitement. Les effets à base de fer peuvent colorer les selles en noir ou gris noir.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi:
PRÉCAUTION D'EMPLOI:

Sans objet.

9. Interactions :

Le fer peut altérer l'absorption ou la biodisponibilité des tétracyclines, bisphosphonates, quinolones, agents anti-infectieux, épiestrogènes, nausées, vomissements, diarrhées et hématomése, souvent associée à une somnolence, pâleur, cyanose, état de choc (anaphylaxie, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissent comme les antagonistes d'antacétides.

L'administration du fer peut être augmentée par l'administration d'environ 200 mg d'acide ascorbique ou réduit par l'utilisation d'un de ces médicaments.

Aucune interaction pharmacologique n'a été signalée durant le traitement concordant avec les antagonistes H2.

Certains médicaments (antiphlogistiques et antileucémiques (aminopéptidase, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissent comme les antagonistes compétents des folates. Par conséquent, dans les maladies néoplasiques ou leucémiques traitées par des antiphlogistiques, l'administration de FERPLEX FOL, ainsi que l'administration de tout autre médicament contenant de l'acide folinique, doit être évitée.

Vous devrez également éviter l'administration de FERPLEX FOL avec certains antibactériens (sulfamides, triméthoprime), car il peut diminuer l'efficacité de ces médicaments.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Les agents complexant du fer (tel que les phosphates, les phénates et les oxalates) contenus dans les légumes et le lait, le café et le thé inhibent l'absorption du fer. FERPLEX FOL doit être pris après un intervalle de 2 heures après l'administration d'un de ces aliments ou boissons.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Interactions avec les essais analytiques:

FERPLEX FOL peut interférer avec les tests de laboratoire de recherche de sang occulte.

10. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement:

Il n'y a aucun avertissement particulier pendant la grossesse et l'allaitement.

Pour avertissements particuliers, voir les sections "Précaution d'emploi" et "Effets indésirables".

11. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines:

Aucune donnée n'est disponible sur l'effet du produit sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines. Cependant un effet est peu probable.

12. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage:

Après ingestion massive de sel de fer, peuvent survenir des douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhées et hématomése, souvent associée à une somnolence, pâleur, cyanose, état de choc (anaphylaxie, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissant comme les antagonistes d'antacétides.

L'administration immédiate d'un émétique, suivi d'un lavage gastrique si nécessaire, associé à des mesures preventives appropriées. Si nécessaire, des agents chelateurs du fer comme la déféconamine peuvent être administrés.

13. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses:

Parce que l'absorption du fer est limitée par l'administration de FERPLEX FOL, il n'y a pas de double dose pour compenser les doses oubliées. Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la dose suivante le plus rapidement possible puis poursuivez votre traitement normalement. Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

14. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Médicamenteux soumis à prescription médicale

A. conseiller à une température inférieure à 25 °C.

B. conserver le flacon dans l'emballage extérieur pour le protéger de la lumière.

C. tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

D. Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte après la mention EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

E. Les personnes non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment se définir de ces boîtes de médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

F. Aspect du produit et contenu de la boîte:

FERPLEX FOL se présente sous la forme d'une solution orale transparente de couleur matron et avec une odeur caractéristique. Boîte de 10 flacons uni-doses avec bouchon réservoir contenant 100 mg de poudre pour solution extemporanée.

G. Fabricant:

ITALFARMACO S.A.
C/San Isidro, 3, Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas-Madrid, Espagne.
ABC Farmaceutici d.p.A.
Establishment s/s a Locality San Bernardo-10090 Icrea [10].
Via Galton Moretti, 29 Italia

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ AU MAROC:

Versalya
Laboratoire pharmaceutique VERSALYA.
Zone industrielle Had Soualem lot 149.
Province Beni Mellal, Maroc.

Date de révision de la notice : Janvier 2018.



ES UTILISATEURS

avis avec un docteur, demandez
d'en de la relire.
cette notice avant

2. Composition du médicament :
Chaque flacon uni-dose contient:
Principe actif (solution):
Fer protéiné succinate 800 mg (équivalent à 40 mg de Fe²⁺)
Excipient:
Sorbitol [E202], propylène glycol, parahydroxybenzoate de méthyle sel de sodium, parabéne, saccharine de sodium, eau purifiée.
Exceptués à effet notable, parahydroxybenzoate de méthyle sel de sodium, parahydroxybenzoate de propyle sel de sodium.

Principe actif (bouchon téterviroïd)
Calcium folinique pentahydrate 0,235 mg (équivalent à 0,185 mg de l'acide folinique)
Excipient:
Manitol [E421]

3. Classe pharmaco-thérapeutique :
Classe: pharmaco-thérapeutique : médicament antianémique
contenant du fer ferrrique en association avec de l'acide folinique.
Code ATC: B03DA09

4. Indications thérapeutiques :
Prévention et traitement des états de carence en fer et en acide folique: anémies hypochromes, normochromes, anémies mégaloblastiques et macrocytaires; chez les enfants, secondaires à un apport déficient ou à une diminution de l'absorption du fer ou des folates; anémies dues à la grossesse, post-partum, allaitement.

5. Posologie :
Adultes: 1 à 2 flacons par jour selon votre médecin prescripteur, enfants en deux prises, de préférence avant les repas.
En administrant 1,5 ml/jour selon votre médecin prescripteur, répartis en deux prises, de préférence avant les repas, le contenu du flacon peut être bu directement à partir du flacon ou peut être dilué dans de l'eau.
Enlever la bague de sécurité du bouchon réservoir. Pousser fermement le bouchon réservoir jusqu'à ce que la poudre se verse dans la solution. Bien agiter, retirer le bouchon réservoir et boire la

solution directement du flacon ou diluer avec de l'eau.
6. Contre-indications :
Hypersensibilité connue aux principes actifs ou à l'un des excipients.
Hémorragie, hémocromatose, anémie aplasique, hémolytique ou anémies sidéro-adréstitiques (sidéroblastiques) (anémies dues à l'utilisation du fer aftertreatment).

7. Effets indésirables :
Troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée, constipation, nausée et douleurs épigastriques peuvent très rarement se produire, particulièrement à très fortes doses; ces effets indésirables sont réduits par la diminution de la dose ou l'arrêt du traitement. Les effets à base de fer peuvent colorer les selles en noir ou gris noir.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi:
PRÉCAUTION D'EMPLOI:
Pas d'avertissements particulières sont nécessaires sur les risques de tolérance ou de dépendance. Le traitement ne doit pas dépasser 6 mois, sauf en cas de saignement persistant, ménorrhagie ou grossesse.

AVERTISSEMENT SPÉCIAL:
La cause de la carence en fer ou anémie par carence en fer doit être vérifiée et correctement traitée, à côté de la thérapie en fer. Toute maladie sous-jacente à une carence en fer ou anémie par carence en fer doit être vérifiée et correctement traitée.

Comme le produit contient des protéines de lait, il doit être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d'intolérance aux protéines de lait qui peuvent présenter des réactions allergiques.

FERPLEX FOL flacon uni-dose contient du sorbitol; les patients ayant une intolérance hépatofécale rare au fructose ne doivent pas prendre ce médicament.

FERPLEX FOL flacon uni-dose contient des parabénèses (methyl-parahydroxybenzoate sel de sodium) qui peuvent provoquer habituellement des réactions allergiques de type retardé.

9. Interactions:

Le fer peut altérer l'absorption ou la biodisponibilité des tétracyclines, bisphosphonates, quinolones, agents anti-infectieux, épiastrytiques, nausées, vomissements, diarrhées et hématomése, souvent associée à une somnolence, pâleur, cyanose, état de choc (anaphylaxie, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissent comme les antagonistes d'antacétiques.

L'administration du fer peut être augmentée par l'administration à la même heure.

Aucune interaction pharmacologique n'a été signalée durant le traitement concordant avec les antagonistes H2.

Certains médicaments (antiphénotypes et antileucémiques (aminoptérine, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissent comme les antagonistes compétents des folates. Par conséquent, dans les maladies néoplasiques ou leucémiques traitées par des antiphénotypes, l'administration de FERPLEX FOL, ainsi que l'administration de tout autre médicament contenant de l'acide folinique, de l'acide folinique, doit être évitée.

Vous devrez également éviter l'administration de FERPLEX FOL avec certains antibactériens (sulfamides, triméthoprime), car il peut diminuer l'efficacité de ces médicaments.

Interactions avec les aliments et les boissons:

Les agents complexant du fer (tel que les phosphates, les phytates et les oxalates) contenus dans les légumes et le lait, le café et le thé inhibent l'absorption du fer. FERPLEX FOL doit être pris après un intervalle de 2 heures après l'administration d'un de ces aliments ou boissons.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives:

Sans objet.

Interactions avec les essais analytiques:

FERPLEX FOL peut interférer avec les tests de laboratoire de recherche de sang occulte.

10. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement:

Il n'y a aucun avertissement particulier pendant la grossesse et en fer qui peuvent se produire dans de telles circonstances.

Cher la femme, bien qu'il existe pas d'études définitives, son utilisation n'est pas recommandée pendant le premier trimestre de grossesse, et si est utilisée, il faut toujours évaluer les risques possibles et les bénéfices du traitement.

Le paracetamol passe dans le lait maternel c'est pourquoi les femmes qui allaitent doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce médicament.

11. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines:

Aucune donnée n'est disponible sur l'effet de ce produit sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines. Cependant un effet est peu probable.

12. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage:

Après ingestion massive de sel de fer, peuvent survenir des douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhées et hématomése, souvent associée à une somnolence, pâleur, cyanose, état de choc (anaphylaxie, méthotrexate ou autres dérivés périphériques) agissant comme les antagonistes d'antacétiques.

L'administration immédiate d'un émétique, suivi d'un lavage gastrique si nécessaire, associé à des mesures preventives appropriées. Si nécessaire, des agents chélateurs du fer comme la défénacétamine peuvent être administrés.

13. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses:

Parce que l'absorption de l'acide folinique, doit être évitée.

Vous devrez également éviter l'administration de FERPLEX FOL avec certains antibactériens (sulfamides, triméthoprime), car il peut diminuer l'efficacité de ces médicaments.

14. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de Paracétamol :

• Sans objet.

15. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de Médiamente soumis à prescription médicale :

• A consever à une température inférieure à 25 °C.

16. Conserver le flacon dans l'emballage extérieur pour le protéger de la lumière.

17. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

18. Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte après la mention EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

19. Les médicaments non utilisés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment se définir de ces boîtes de médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

Aspect du produit et contenu de la boîte:

FERPLEX FOL se présente sous la forme d'une solution orale transparente de couleur marron et avec une odeur caractéristique.

Boîte de 10 flacons uni-doses avec bouchon réservoir contenant 100 mg de poudre pour solution extemporanée.

FABRICANT:

ITALFARMACO S.p.A.

CSan Isidro, 3, Polígono Industrial de Alcobendas

28108 Alcobendas-Madrid-Espagne.

ABC Farmaceutici S.p.A.

Establishment sis à Locilia San Bernardo-10090 Ivrrea [Italia].

Via Giulio Moretti, 29 Italia

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ AU MAROC:

Versalya

Laboratoire pharmaceutique VERSALYA.

Zone industrielle Had Soualem lot 149.

Province Beni Mellal, Maroc.

Date de révision de la notice : Janvier 2018.

Seconil®

Secnidazole anhydre / Anhydrous Secnidazole

2 g

LOT:230338

Voie Orale / Oral Route

PER:06/2027

PPV:43,20 DH




Boîte de / Box of

1

Sachet

Granulés
Pellets



Veuillez lire attentivement car elle contient des informations fournies par votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous en aurez peut-être besoin de ...
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après utilisation.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que EUCARBON® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUCARBON® ?
3. Comment prendre EUCARBON® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EUCARBON® ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE EUCARBON® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique

Laxatif de contact, sennosoides ; code ATC : A06AB06

EUCARBON® contient exclusivement des agents actifs végétaux et minéraux. EUCARBON® a un double effet : régulateur de la fonction intestinale et légèrement laxatif. Le charbon végétal adsorbe les toxines bactériennes et celles du métabolisme, les feuilles de séné et les racines de rhubarbe évacuent rapidement les toxines adsorbées par le charbon. En outre, EUCARBON® a un effet légèrement désinfectant dans l'intestin, antispasmodique et adoucissant.

Indications thérapeutiques

EUCARBON® est indiqué dans les cas suivants :

- Dyspepsie, digestion pénible.
- Flatulence, ballonnement, météorisme, émission de gaz, fermentation et putréfaction intestinale.
- Auto-intoxication intestinale.
- Paresse intestinale.
- Toutes les formes de constipation.
- Constipation due aux hémorroïdes ou fissures anales.
- Traitement du syndrome du côlon irritable (ICS).

Sportifs

Sans objet

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

Sans objet

Mentions relatives aux excipients à effet notoire

Ce médicament contient du saccharose. L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE EUCARBON® ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie et fréquence d'administration

Adultes et enfants à partir de 12 ans : 1 à 2 comprimés jusqu'à 3 fois / jour pendant ou après les repas pour obtenir un effet laxatif léger et réduire les ballonnements. Pour un effet laxatif plus fort, la dose du soir peut être augmentée jusqu'à 3 ou 4 comprimés.

Examen radiologique : pour un nettoyage intensif et une élimination totale des gaz des voies digestives (avant les examens radiologiques etc...) 6 à 8 comprimés le soir précédent l'examen.

Traitement du syndrome du côlon irritable (ICS) : 2 à 3 comprimés en 2 à 3 prises/jour, une réduction des symptômes nécessite une diminution de la dose en 1 à 2 comprimés, 2 fois/jour.

La dose nécessaire pour une action efficace peut être différente selon les cas individuels.

Mode et voie d'administration

Voie orale,

Prendre les comprimés avec une grande quantité de liquide pendant ou après les repas.

Durée du traitement

Sans objet

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de EUCARBON®, que vous n'auriez dû :

D'une manière générale, un surdosage en laxatifs peut être à la base d'un déséquilibre hydrique et électrolytique et diminuer la tolérance des composés de digitale.

La survenue d'une diarrhée est un signe de surdosage et le médicament doit être soit arrêté, soit diminuer la dose administrée.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

FORTÉ PHARMA

Lot/À coi
de préfér

X1029 1226

17M'

LOT

PER

Prix

99.00



700221 339503

COMPO.

| | |
|---------------------|-------|
| - Séné | 40 mg |
| - Radis Noir | 75 mg |
| - Anis Etoilé | 75 mg |
| - Cascara | 30 mg |

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spécialement formulé pour :

- Régulation du volume et de la fréquence des selles
- Réduction des gaz
- Ballonnement et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal
- Stimule le transit intestinal
- Combat les fermentations intestinales
- Favorise un transit régulier

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1gélule par jour le soir au coucher avec un verre d'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent sans avis médical.
- A conserver dans un endroit sec et frais.
- Sans ingrédient d'origine animale, sans gluten, sans gélatine.

PRESENTATION :

Boite de 15 gélules.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto
98000 - MONACO

FORTÉ PHARMA

Lot/À coi
de préfér

X1029 1226

17M'

LOT

PER

Prix

99.00



700221 339503

COMPO.

| | |
|---------------------|-------|
| - Séné | 40 mg |
| - Radis Noir | 75 mg |
| - Anis Etoilé | 75 mg |
| - Cascara | 30 mg |

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spécialement formulé pour :

- Régulation du volume et de la fréquence des selles
- Réduction des gaz
- Ballonnement et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal
- Stimule le transit intestinal
- Combat les fermentations intestinales
- Favorise un transit régulier

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1gélule par jour le soir au coucher avec un verre d'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent sans avis médical.
- A conserver dans un endroit sec et frais.
- Sans ingrédient d'origine animale, sans gluten, sans gélatine.

PRESENTATION :

Boite de 15 gélules.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto
98000 - MONACO