

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 3216 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ABD LIM SAID TAYAB N°3216

Date de naissance : 04-08-1993

Adresse : Derb Foukara Rue 5 N° 104 Casablanca

Tél. : 661361373 Total des frais engagés : 1265,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 26/12/2023

Nom et prénom du malade : TAYAB SAID Age : 32

Lien de parenté : Même-môme Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Allergie neuropsychiatry

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : hypertension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 12 JAN 2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Recouvrement des Actes
26/12/2023		eu	1500 Fr	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 	26.11.2023	115,10

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Casablanca le

26/12/2023

TAYZB-SAD

Tegretol 400. } Treeid
zppos 1/2 gr lemat } cb03
is peid } trees.
zppos } Mois
8190xb 4542b.

DociVot 6910

~~old esto~~ S1

gaw
Veetsh. (SV) help

شارع بنى امكيلد الطابع الأول الدارالبيضاء
Dorb Bouchentouf Rue 19 N° 5 arrondissement Rabat Beni M'Cid Casablanca

Tél: 05.22.80.42.83



- confusion mentale, agitation ou nervosité,
- réactions d'hypersensibilité à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments,
- porphirie,
- suspension orale: réactions allergiques aux conservateurs (parabène) ou intolérance au fructose (sorbitol).

ises en gardes spéciales et écautions particulières d'emploi :

Consultez immédiatement votre médecin ou faites en sorte qu'une autre personne puisse le faire à votre place si vous constatez un ou plusieurs des effets indésirables ci-dessous, qui apparaissent occasionnellement ou rarement. Ceux-ci pourraient être le signe précoce d'une atteinte grave du sang, de la foie, des reins ou d'autres organes et pourraient nécessiter une intervention rapide du médecin:

- fièvre, maux de gorge, éruption cutanée, ulcérations dans la bouche, gonflement des ganglions,
- coloration foncée des urines,
- signes d'une forte réaction cutanée (p. ex. peau qui pèle, éruption),
- jaunissement de la peau ou

- irréguliers, difficulté à respirer, douleurs dans la poitrine, perte de conscience,
- augmentation des convulsions,
- apparition d'hématomes suite à des chocs minimes.
- si la prise de Tégrétol provoque chez vous des vertiges, une somnolence, une chute de la pression artérielle ou une confusion, ce qui peut entraîner une chute.

Des réactions indésirables cutanées/d'hypersensibilité – graves et moins graves – peuvent rarement apparaître sous traitement par Tégrétol (en particulier durant les premiers mois de traitement). Ce risque peut être plus précisément évalué grâce à un examen sanguin spécifique effectué avant le début du traitement, surtout chez les patients européens, mais aussi chez les patients d'origine asiatique. Avant le début du traitement, vous devrez discuter de cet examen sanguin avec votre médecin traitant et l'effectuer. Il est important de souligner que des réactions indésirables cutanées pourront aussi apparaître malgré un examen sanguin négatif, et que, si les résultats sont positifs, les réactions indésirables n'apparaîtront pas forcément.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite

et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Informez également votre médecin si vous devez subir une intervention chirurgicale, même si elle est sans gravité.

Tégrétol, comme les autres médicaments psycho-actifs, peut réduire la tolérance à l'alcool, c'est pourquoi il est recommandé de renoncer à la consommation d'alcool pendant le traitement avec Tégrétol.

Ne consommez pas de jus de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse, car ils peuvent renforcer les effets du Tégrétol. Les autres jus de fruit sont sans effet. Les femmes qui prennent un traitement anticonceptionnel par voie orale (pilule) en même temps que Tégrétol, peuvent avoir des saignements en dehors des menstruations normales. L'efficacité de la pilule anticonceptionnelle peut être annulée, c'est pourquoi d'autres moyens de contraception devraient être utilisés en plus.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous avez une maladie des reins et vous prenez des médicaments pour baisser votre taux de sodium dans le sang, ou



- confusion mentale, agitation ou nervosité,
- réactions d'hypersensibilité à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments,
- porphirie,
- suspension orale: réactions allergiques aux conservateurs (parabène) ou intolérance au fructose (sorbitol).

ises en gardes spéciales et écautions particulières d'emploi :

Consultez immédiatement votre médecin ou faites en sorte qu'une autre personne puisse le faire à votre place si vous constatez un ou plusieurs des effets indésirables ci-dessous, qui apparaissent occasionnellement ou rarement. Ceux-ci pourraient être le signe précoce d'une atteinte grave du sang, de la foie, des reins ou d'autres organes et pourraient nécessiter une intervention rapide du médecin:

- fièvre, maux de gorge, éruption cutanée, ulcérations dans la bouche, gonflement des ganglions,
- coloration foncée des urines,
- signes d'une forte réaction cutanée (p. ex. peau qui pèle, éruption),
- jaunissement de la peau ou

- irréguliers, difficulté à respirer, douleurs dans la poitrine, perte de conscience,
- augmentation des convulsions,
- apparition d'hématomes suite à des chocs minimes.
- si la prise de Tégrétol provoque chez vous des vertiges, une somnolence, une chute de la pression artérielle ou une confusion, ce qui peut entraîner une chute.

Des réactions indésirables cutanées/d'hypersensibilité – graves et moins graves – peuvent rarement apparaître sous traitement par Tégrétol (en particulier durant les premiers mois de traitement). Ce risque peut être plus précisément évalué grâce à un examen sanguin spécifique effectué avant le début du traitement, surtout chez les patients européens, mais aussi chez les patients d'origine asiatique. Avant le début du traitement, vous devrez discuter de cet examen sanguin avec votre médecin traitant et l'effectuer. Il est important de souligner que des réactions indésirables cutanées pourront aussi apparaître malgré un examen sanguin négatif, et que, si les résultats sont positifs, les réactions indésirables n'apparaîtront pas forcément.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite

et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Informez également votre médecin si vous devez subir une intervention chirurgicale, même si elle est sans gravité.

Tégrétol, comme les autres médicaments psycho-actifs, peut réduire la tolérance à l'alcool, c'est pourquoi il est recommandé de renoncer à la consommation d'alcool pendant le traitement avec Tégrétol.

Ne consommez pas de jus de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse, car ils peuvent renforcer les effets du Tégrétol. Les autres jus de fruit sont sans effet. Les femmes qui prennent un traitement anticonceptionnel par voie orale (pilule) en même temps que Tégrétol, peuvent avoir des saignements en dehors des menstruations normales. L'efficacité de la pilule anticonceptionnelle peut être annulée, c'est pourquoi d'autres moyens de contraception devraient être utilisés en plus.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous avez une maladie des reins et vous prenez des médicaments pour baisser votre taux de sodium dans le sang, ou



- confusion mentale, agitation ou nervosité,
- réactions d'hypersensibilité à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments,
- porphirie,
- suspension orale: réactions allergiques aux conservateurs (parabène) ou intolérance au fructose (sorbitol).

ises en gardes spéciales et écautions particulières d'emploi :

Consultez immédiatement votre médecin ou faites en sorte qu'une autre personne puisse le faire à votre place si vous constatez un ou plusieurs des effets indésirables ci-dessous, qui apparaissent occasionnellement ou rarement. Ceux-ci pourraient être le signe précoce d'une atteinte grave du sang, de la foie, des reins ou d'autres organes et pourraient nécessiter une intervention rapide du médecin:

- fièvre, maux de gorge, éruption cutanée, ulcérations dans la bouche, gonflement des ganglions,
- coloration foncée des urines,
- signes d'une forte réaction cutanée (p. ex. peau qui pèle, éruption),
- jaunissement de la peau ou

- irréguliers, difficulté à respirer, douleurs dans la poitrine, perte de conscience,
- augmentation des convulsions,
- apparition d'hématomes suite à des chocs minimes.
- si la prise de Tégrétol provoque chez vous des vertiges, une somnolence, une chute de la pression artérielle ou une confusion, ce qui peut entraîner une chute.

Des réactions indésirables cutanées/d'hypersensibilité – graves et moins graves – peuvent rarement apparaître sous traitement par Tégrétol (en particulier durant les premiers mois de traitement). Ce risque peut être plus précisément évalué grâce à un examen sanguin spécifique effectué avant le début du traitement, surtout chez les patients européens, mais aussi chez les patients d'origine asiatique. Avant le début du traitement, vous devrez discuter de cet examen sanguin avec votre médecin traitant et l'effectuer. Il est important de souligner que des réactions indésirables cutanées pourront aussi apparaître malgré un examen sanguin négatif, et que, si les résultats sont positifs, les réactions indésirables n'apparaîtront pas forcément.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite

et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Informez également votre médecin si vous devez subir une intervention chirurgicale, même si elle est sans gravité.

Tégrétol, comme les autres médicaments psycho-actifs, peut réduire la tolérance à l'alcool, c'est pourquoi il est recommandé de renoncer à la consommation d'alcool pendant le traitement avec Tégrétol.

Ne consommez pas de jus de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse, car ils peuvent renforcer les effets du Tégrétol. Les autres jus de fruit sont sans effet. Les femmes qui prennent un traitement anticonceptionnel par voie orale (pilule) en même temps que Tégrétol, peuvent avoir des saignements en dehors des menstruations normales. L'efficacité de la pilule anticonceptionnelle peut être annulée, c'est pourquoi d'autres moyens de contraception devraient être utilisés en plus.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous avez une maladie des reins et vous prenez des médicaments pour baisser votre taux de sodium dans le sang, ou



- confusion mentale, agitation ou nervosité,
- réactions d'hypersensibilité à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments,
- porphirie,
- suspension orale: réactions allergiques aux conservateurs (parabène) ou intolérance au fructose (sorbitol).

ises en gardes spéciales et écautions particulières d'emploi :

Consultez immédiatement votre médecin ou faites en sorte qu'une autre personne puisse le faire à votre place si vous constatez un ou plusieurs des effets indésirables ci-dessous, qui apparaissent occasionnellement ou rarement. Ceux-ci pourraient être le signe précoce d'une atteinte grave du sang, de la foie, des reins ou d'autres organes et pourraient nécessiter une intervention rapide du médecin:

- fièvre, maux de gorge, éruption cutanée, ulcérations dans la bouche, gonflement des ganglions,
- coloration foncée des urines,
- signes d'une forte réaction cutanée (p. ex. peau qui pèle, éruption),
- jaunissement de la peau ou

- irréguliers, difficulté à respirer, douleurs dans la poitrine, perte de conscience,
- augmentation des convulsions,
- apparition d'hématomes suite à des chocs minimes.
- si la prise de Tégrétol provoque chez vous des vertiges, une somnolence, une chute de la pression artérielle ou une confusion, ce qui peut entraîner une chute.

Des réactions indésirables cutanées/d'hypersensibilité – graves et moins graves – peuvent rarement apparaître sous traitement par Tégrétol (en particulier durant les premiers mois de traitement). Ce risque peut être plus précisément évalué grâce à un examen sanguin spécifique effectué avant le début du traitement, surtout chez les patients européens, mais aussi chez les patients d'origine asiatique. Avant le début du traitement, vous devrez discuter de cet examen sanguin avec votre médecin traitant et l'effectuer. Il est important de souligner que des réactions indésirables cutanées pourront aussi apparaître malgré un examen sanguin négatif, et que, si les résultats sont positifs, les réactions indésirables n'apparaîtront pas forcément.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite

et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.


Informez également votre médecin si vous devez subir une intervention chirurgicale, même si elle est sans gravité.

Tégrétol, comme les autres médicaments psycho-actifs, peut réduire la tolérance à l'alcool, c'est pourquoi il est recommandé de renoncer à la consommation d'alcool pendant le traitement avec Tégrétol.

Ne consommez pas de jus de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse, car ils peuvent renforcer les effets du Tégrétol. Les autres jus de fruit sont sans effet. Les femmes qui prennent un traitement anticonceptionnel par voie orale (pilule) en même temps que Tégrétol, peuvent avoir des saignements en dehors des menstruations normales. L'efficacité de la pilule anticonceptionnelle peut être annulée, c'est pourquoi d'autres moyens de contraception devraient être utilisés en plus.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous avez une maladie des reins et vous prenez des médicaments pour baisser votre taux de sodium dans le sang, ou



- confusion mentale, agitation ou nervosité,
- réactions d'hypersensibilité à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments,
- porphirie,
- suspension orale: réactions allergiques aux conservateurs (parabène) ou intolérance au fructose (sorbitol).

ises en gardes spéciales et écautions particulières d'emploi :

Consultez immédiatement votre médecin ou faites en sorte qu'une autre personne puisse le faire à votre place si vous constatez un ou plusieurs des effets indésirables ci-dessous, qui apparaissent occasionnellement ou rarement. Ceux-ci pourraient être le signe précoce d'une atteinte grave du sang, de la foie, des reins ou d'autres organes et pourraient nécessiter une intervention rapide du médecin:

- fièvre, maux de gorge, éruption cutanée, ulcérations dans la bouche, gonflement des ganglions,
- coloration foncée des urines,
- signes d'une forte réaction cutanée (p. ex. peau qui pèle, éruption),
- jaunissement de la peau ou

- irréguliers, difficulté à respirer, douleurs dans la poitrine, perte de conscience,
- augmentation des convulsions,
- apparition d'hématomes suite à des chocs minimes.
- si la prise de Tégrétol provoque chez vous des vertiges, une somnolence, une chute de la pression artérielle ou une confusion, ce qui peut entraîner une chute.

Des réactions indésirables cutanées/d'hypersensibilité – graves et moins graves – peuvent rarement apparaître sous traitement par Tégrétol (en particulier durant les premiers mois de traitement). Ce risque peut être plus précisément évalué grâce à un examen sanguin spécifique effectué avant le début du traitement, surtout chez les patients européens, mais aussi chez les patients d'origine asiatique. Avant le début du traitement, vous devrez discuter de cet examen sanguin avec votre médecin traitant et l'effectuer. Il est important de souligner que des réactions indésirables cutanées pourront aussi apparaître malgré un examen sanguin négatif, et que, si les résultats sont positifs, les réactions indésirables n'apparaîtront pas forcément.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite

et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Informez également votre médecin si vous devez subir une intervention chirurgicale, même si elle est sans gravité.

Tégrétol, comme les autres médicaments psycho-actifs, peut réduire la tolérance à l'alcool, c'est pourquoi il est recommandé de renoncer à la consommation d'alcool pendant le traitement avec Tégrétol.

Ne consommez pas de jus de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse, car ils peuvent renforcer les effets du Tégrétol. Les autres jus de fruit sont sans effet. Les femmes qui prennent un traitement anticonceptionnel par voie orale (pilule) en même temps que Tégrétol, peuvent avoir des saignements en dehors des menstruations normales. L'efficacité de la pilule anticonceptionnelle peut être annulée, c'est pourquoi d'autres moyens de contraception devraient être utilisés en plus.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous avez une maladie des reins et vous prenez des médicaments pour baisser votre taux de sodium dans le sang, ou



jamais dépasser 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon

VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER

Vous êtes présent à l'occasion de certains lessives spécifiques

J5XT : LOT 3871 . Les autres médicaments, comme les

ER : 03/2025
PPV : 42 20 HD
ID: 64

Il existe plusieurs types de bronchites aiguës, dont les plus courantes sont les bronchites aiguës aiguës et les bronchites aiguës chroniques.

immunocytes) et de cellules dendriques (4 à 6 cellules) qui s'admmisent par voie immunitaire dans l'inspissatum pour embout buccal de l'inhalateur.

Ce médicament contient un beta-2 mimétique : le salbutamol.

durée par voie inhalée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

QUESTION : **DOUZE CAS EST-IL UTILISE ?**

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

55. Comment conserver VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon
+; quelques sorties et/ou les muscles éventuels;

pressurise? COMMERCIAL AIRLINES USE HIGH-TECH SUSPENSION SEAT MIRRORS IN THE CABIN

Suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?

pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?

Qu'est-ce que VENTOLINE 100 microgrammes/dose suspension pour inhalation en flacon

notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, au fil soit mentionné ou non dans cette liste, pourraient leur être notifi, même si les signes de leur maladie sont identiques aux autres.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé. Ne le donnez pas à d'autres personnes.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Lisez l'ensemble de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

SALBUTAMOL

suspension pour inhalation en flacon pressurisé

NOTICE : UN QUIMIQUAISON DE L'OUTILLAGE



Gorge au goût miel - citron est apprécié par l'adulte et l'enfant.

INFORMATION :

Extrait de Thym; Miel, Citron (arômes); Glycerol; Glycosides de stévia.

SEUILS D'UTILISATION :

Adulte et Enfant à partir de 3 ans : Introduire l'embout pulvériseur dans la gorge. Administrer 1 à 3 pulvérisations. Répéter l'opération 4 à 8 fois durant la journée si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser chez les personnes présentant une hypersensibilité à l'un des composants. Avant l'utilisation, vérifier que l'embout soit bien inséré sur le flacon. Après usage, laver l'embout avec de l'eau fraîche, sec et à l'abri de la lumière et à consommer dans un délai de 4 semaines. Ce produit peut être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et d'un complément alimentaire. N'est pas médicament.

Autorisation Ministère de la Santé : DA20201904513DMP/20UCA/MAV



Docivox
Comprimé
Voie orale

comprimé à sucer

Deva
Pharmaceuticals

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Docivox comprimé à sucer :

-Boite de 10 - Boite de 20

PROPRIÉTÉS :

Docivox est une association synergique de propolis, phytoactifs et vitamine C dont les propriétés sont bénéfiques pour la gorge et les voies respiratoires : • Apaise et dégage les voies respiratoires • Adoucit la gorge irritée en cas de toux • Renforce les défenses naturelles.

Propolis : la sphère d'action privilégiée de la propolis concerne l'ORL où elle permet d'aider à guérir facilement très rapidement de nombreuses affections couramment rencontrées, plus particulièrement en automne et hiver. Eucalyptus : remarquable décongestionnant respiratoire des muqueuses et des sinus, il facilite la respiration.

Échinacée : utilisée pour renforcer les défenses naturelles de l'organisme et aide à la prévention de la grippe ou le refroidissement (syndrome grippal).

UTILISATIONS :

Docivox comprimé à sucer est spécialement formulé pour protéger la muqueuse et aider à soulager :

-Enrouements passagers.

-Maux de gorge en cas de toux sèche d'irritation ou d'allergie.

Docivox procure une sensation de fraîcheur agréable et durable (goût original miel et citron).

POSÉOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

1 comprimé à sucer 3 fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche ou à l'eucalyptus.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

COMPOSITION :

propolis 80 mg, extrait d'eucalyptus (eucalyptus globulus) 120 mg, extrait de gingembre (zingiber officinalis) 12 mg, magnésium végétal, silice colloïdale, thaumatine, menthol.

Autorisation ministère de la santé n° 20221717



Distribution des mises nominatives
Quatre fois plus de mises nominatives de méridien que de septentrional dans les deux dernières périodes. Ces dernières périodes sont aussi caractérisées par une augmentation importante des mises nominatives de l'ouest. Les mises nominatives de l'est sont en revanche très peu nombreuses et leur évolution est difficile à déterminer. Les mises nominatives de l'ouest sont également très peu nombreuses mais leur évolution est plus facile à déterminer. Elles ont connu une croissance importante au cours des dernières périodes, atteignant un niveau record dans la dernière période. Les mises nominatives de l'est sont également très peu nombreuses mais leur évolution est plus difficile à déterminer. Elles ont connu une croissance importante au cours des dernières périodes, atteignant un niveau record dans la dernière période.