

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

19 03 20

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11761 Société : ROYAL AIR MAROC

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : YOUSSEF BARAK MOHAMED YACINE

Date de naissance : 10/05/1976

Adresse : Reg 1 App 23 Etg 4 GHB Fidast lounghir

101 1111 - DAB 300 ALZA

Tél. : 0661330377 Total des frais engagés : 150 + 166,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin MEDECIN GENERALISTE

Dr. Yassine BOUBIBI

MEDECIN GENERALISTE

101 1111

Bd Résistance Imra Mohamed Amine

Entree ABUBAKR - Mohammedia

Tel. : 05 23 27 11 11

INPE : 091235267

Cachet du médecin :

Date de consultation : 08/06/2021

Nom et prénom du malade : M. MOHAMED YACINE

Lien de parenté : Fils-mère Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Grippe


En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Grippe

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous l'obligation à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 01/06/2021

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08/01/2024	S		150,00	<p style="text-align: right;">INPE : 091235267</p> <p style="text-align: right;">ENTREE ADOUBKAR - Amine</p> <p style="text-align: right;">BANQUE MEDIAMARCA</p> <p style="text-align: right;">Tel.: 05 23 27 11 11</p> <p style="text-align: right;">INPE : 091235267</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE CHAMERI Dr. M. GHANEM media Falah 4, 11041 - 173 - 100 GSM : 06 80 18 27 55	8/01/2014	166.60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : []								
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []								
				MONTANTS DES SOINS []								
				DEBUT D'EXECUTION []								
				FIN D'EXECUTION []								
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE											
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []								
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td><td>21433552</td></tr> <tr> <td>25533412</td><td>00000000</td></tr> <tr> <td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr> <td>35533411</td><td>11433553</td></tr> </table>		H	21433552	25533412	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553		MONTANTS DES SOINS []
H	21433552											
25533412	00000000											
00000000	00000000											
35533411	11433553											
	<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			DATE DU DEVIS []								
				DATE DE L'EXECUTION []								

Dr.Yassine BOUSBI

Medecine générale

Diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de casablanca et le centre hospitalier Ibnou Rochd

Ancien médecin interne à l'hôpital Mohammed 6 - M'diq



الدكتور ياسين بوسبي

عيادة الطب العام

خريج كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
والمستشفى الجامعي ابن رشد

طبيب داخلي سابق في مستشفى محمد السادس - المضيق

Mohammedia, le :

08/01/2024

المحمدية، في :

m' Moharrak Mohamed /Assine

1/ Bvax 6 ₣
Beg 16 (05) ₣

2/ D. loft 3 ₣

3/ My x3 16 ₣

3/ Betastene 2 ₣
Bd 39 15 (05) ₣

4/ Oedus 2 ₣
Nist 6 ₣

SV SV SV

PHARMACIE GHANEM MYRIAM
Falah 4, lot 21, Lot 3 - Mohammedia
GSM : 06 80 18 27 55

PHARMACIE GHANEM MYRIAM
Dr. M. GHANEM
Falah 4, lot 21, Lot 3 - Mohammedia
GSM : 06 80 18 27 55

Dr. Yassine BOUSBI
Medecine générale
Immeuble Mohammed Amine,
entrée «ABOUBAKR» MOHAMMEDIA - Tél.: 05 23 271 111
ICE : 002244878000005 - INPE : 091235267



1er étage Bd de la Resistance Immeuble Mohammed Amine,
entrée «ABOUBAKR» MOHAMMEDIA - Tél.: 05 23 271 111

ICE : 002244878000005 - INPE : 091235267

5/11/2013
Skinfoone crème
raff/6 sf 

T = 16.6°

Dr. Yassine HOUSBI
MEDECIN CERTIFIÉ-STE
8d Resistance
Lutterbach 20100
Tél. 05 23 27 11 24
INPE : 091235267

Falih 4, GSM 0621 18 27 55
Dr M. GHANEM
PHARMACEUTIQUE LYRIAM
D.M. GHANEM LYRIAM

Skinosone®

(Bétaméthasone)

Composition :

Bétaméthasone (sous forme de dipropionate).
Excipients q.s.p.....

14.30

Propriétés :

Bétaméthasone est un dermocorticoïde d'activité inflammatoires, anti-prurigineuses et anti-allergiques.



Skinosone Crème
Tube de 15g

Indications :

- Eczémas de contact
- Dermatites atopiques
- Dermes séborrhéiques à l'exception du visage
- Psoriasis
- Lichens
- Dyshidroses
- Traitement symptomatique du prurit
- Skinosone est présentée sous deux formes :

Crème : destinée au traitement des lésions suintantes

Pommade : destinée au traitement des lésions sèches

Contre indications :

- Allergie à l'un des composants
- Dermatoses virales : Zona, Herpès, Varicelle.
- Infections bactériennes ou fongiques primitives

Effets indésirables :

- Communs à tous les dermacorticoïdes : dessèchement, folliculites, atrophie, prurit, télangiectasies, vergetures, excoriations, rosacée aggravée.
Ils sont exceptionnels lors d'un traitement court

Mises en garde et Précautions d'emploi :

- L'apparition d'une irritation locale impose l'arrêt du traitement.
- Les traitements sous pansements occlusifs comportent un risque de surinfection.
- L'utilisation prolongée, l'utilisation sur le visage ou chez l'enfant doivent être soumises à une stricte surveillance médicale.

Mode d'emploi et posologie :

Une application en couche mince 2 à 3 fois par jour.

Présentations :

Crème : Tube de 15g

Pommade : Tube de 15g

Tableau A.



Laboratoires Pharmaceutiques PHARMA 5
21, Rue des Asphodèles - Casablanca

EVOX® 500 mg

Levofloxacin (DCl) Hemihydrate

Boîtes de 5, 7 et 10 comprimés pelliculé sécables

Relevez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament, car il contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire. Si vous, avec d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE EVOX 500 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Classe Pharmacothérapeutique : antibiotiques de la famille des quinolones, fluoroquinolones - code ATC : J01MA12.

Le nom de votre médicament est EVOX 500 mg comprimé pelliculé sécable. EVOX 500 mg comprimé pelliculé sécable contient une substance active appelée la levofloxacin. Elle appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La levofloxacin est un antibiotique de type « quinolone ». Elle agit en tuant les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

Indications thérapeutiques

EVOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable peut être utilisé pour traiter les infections des :

- Sinus,

- Poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires chroniques ou une pneumonie,

- Voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou votre vessie.

- Prostate, lorsque vous avez une infection qui dure, Peau et tissus sous-cutanés, y compris les muscles. C'est ce que l'on appelle parfois les « tissus mous ».

Dans certaines situations particulières, EVOX 500 mg comprimé pelliculé sécable peut être utilisé pour diminuer les risques de contracter une maladie pulmonaire, appelée maladie du charbon ou les risques d'aggravation de la maladie après l'exposition à la bactérie du charbon.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE 500 mg, COMPRISE PELLICULÉ SÉCABLE?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais EVOX 500 mg comprimé pelliculé sécable si :

Vous êtes allergique à la levofloxacin, à d'autres antibiotiques de quinolone tels que la ciprofloxacine ou l'ofloxacine, ou à l'autre composants contenus dans ce médicament.

Les signes d'une réaction allergique sont notamment : une éruption cutanée ou une éruption importante, un gonflement des lèvres, du nez, des yeux ou de la langue.

Vous avez déjà eu des crises d'épilepsie.

Vous avez déjà eu un problème à vos tendons, tels qu'une tendinite, qu'en rapport avec un traitement par un antibiotique de la famille des quinolones ou un muscle s'insère sur un os.

Le tendon est la structure par laquelle un muscle se croise dans le corps. Les signes d'une réaction allergique sont notamment : une éruption cutanée ou une éruption importante, un gonflement des lèvres, du nez, des yeux ou de la langue.

Vous avez déjà eu des crises d'épilepsie.

Vous avez pas de tendinites, mais que vous prenez un autre médicament ou que vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre EVOX 500 mg comprimé pelliculé sécable.

Avertissements et précautions

Avant de prendre ce médicament

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluorquinolones/quinolones, incluant la levofloxacin, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adresser-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre EVOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable si :

Vous avez 60 ans ou plus.

Vous prenez des corticoïdes, parfois appelés stéroïdes.

Vous avez subi une transplantation

Vous avez déjà fait une crise d'épilepsie (convulsions).

Vous avez des lésions du cerveau du fait d'un accident vasculaire cérébral ou une autre lésion cérébrale.

Vous avez des problèmes rénaux.

Vous souffrez de ce que l'on appelle un « déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase ». Vous êtes plus susceptible de présenter des problèmes sanguins graves lorsque vous prenez ce médicament.

Vous avez ou avez déjà eu des problèmes de santé mentale.

Vous avez eu des problèmes cardiaques ; il faut être prudent avec ce type de médicament si vous êtes né avec un allongement de l'intervalle QT ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé à l'ECG, enregistrement électrique du cœur), si vous avez un déséquilibre électrolytique dans le sang (en particulier des taux bas de potassium ou de magnéinium dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si vous avez un cœur affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme, ou si vous êtes âgée) ou si vous prenez d'autres médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG.

Vous êtes diabétique.

Vous avez déjà eu des problèmes hépatiques.

Vous êtes atteint(e) de myasthénie.

Vous avez eu un diagnostic d'hypertrophie ou de « renflement » d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau).

N° lot :

22660

75, 10

EXP :

PPV Dhs :

EVOX® 500 mg
Levofloxacin
5 Comprimés pelliculé sécables



Vous avez déjà eu des crises d'épilepsie.

Vous avez pas de tendinites, mais que vous prenez un autre médicament ou que vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre EVOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable.

Avant de prendre ce médicament

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluorquinolones/quinolones, incluant la levofloxacin, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adresser-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre EVOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable si :

Vous avez 60 ans ou plus.

Vous prenez des corticoïdes, parfois appelés stéroïdes.

Vous avez subi une transplantation

Vous avez déjà fait une crise d'épilepsie (convulsions).

Vous avez des lésions du cerveau du fait d'un accident vasculaire cérébral ou une autre lésion cérébrale.

Vous avez des problèmes rénaux.

Vous souffrez de ce que l'on appelle un « déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase ». Vous êtes plus susceptible de présenter des problèmes sanguins graves lorsque vous prenez ce médicament.

Vous avez ou avez déjà eu des problèmes de santé mentale.

Vous avez eu des problèmes cardiaques ; il faut être prudent avec ce type de médicament si vous êtes né avec un allongement de l'intervalle QT ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé à l'ECG, enregistrement électrique du cœur), si vous avez un déséquilibre électrolytique dans le sang (en particulier des taux bas de potassium ou de magnéinium dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si vous avez un cœur affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme, ou si vous êtes âgée) ou si vous prenez d'autres médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG.

Vous êtes diabétique.

Vous avez déjà eu des problèmes hépatiques.

Vous êtes atteint(e) de myasthénie.

Vous avez eu un diagnostic d'hypertrophie ou de « renflement » d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau).

Voir dr

au re

les r

accu

gladi

ath

land

ation

es la

ant le

sp

e R

l'ent

niq

e in

ble

Des q

s ye

cutan

o-gri

la p

s.

initi

sur le

du cor

ns im

ics (é

ave d

l'effic

ent,

com

gras

au

un

ton

tion

gras

et au

avez des prot

L'infat

peut

se produire des premières

plusieurs mois après l'arrêt du traitement

de douleur ou d'inflammation d'u

cheville, du poignet, ou des doigts de l'épaule

médicamenteux, contactez votre médecin

Evitez tout effort inutile car cela pourra

troubles de la vue, du goût, de l'odorat

invalidants ou potentiellement irreversibles

chez les enfants, les adolescents

et/ou une faiblesse musculaire peuvent

être associées à des maux de tête, de

épidémie et informez immédiatement le médicament

troubles de la mémoire, d'une fatig

sommeil.

Si vous présentez l'un de ces effets indésirables, contactez immédiatement votre médecin ou pharmacien.

Vous décidez avec votre médecin de

envoyer également le recours à un a

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être pris par

Interactions avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien

ou pourriez prendre tout autre médicam

peut affecter le mo

certains médicaments peuvent

compris

comprimé pelliculé sécable.

Dolostop®

Paracétamol

DOLOSTOP 500 mg, comprimé

DOLOSTOP 1000 mg, comprimé

DOLOSTOP 500 mg, comprimé effervescent

DOLOSTOP 1000 mg, comprimé effervescent

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

PRÉSENTATION

DOLOSTOP 500 mg comprimé, boîte de 20.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé, boîte de 8.

DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent, boîte de 16.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent, boîte de 8.

COMPOSITION

Substance active : Paracétamol

DOLOSTOP 500 mg comprimé, contient 500 mg de paracétamol par comprimé.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé, contient 1000 mg de paracétamol par comprimé.

DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent, contient 500 mg de paracétamol par comprimé.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent, contient 1000 mg de paracétamol par comprimé.

Excipients

DOLOSTOP 500 mg comprimé, q.s.p 1 comprimé

DOLOSTOP 1000 mg comprimé, q.s.p 1 comprimé

DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent, q.s.p 1 comprimé

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.
- En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, DOLOSTOP doit être utilisé avec précaution.
- Dolostop 500 mg comprimé effervescent contient 366 mg de sodium par comprimé effervescent. DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent contient 418 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium. EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Signalez que vous ou votre enfant prenez Dolostop si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang. Si vous ou votre enfant prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS, LES BOISSONS ET L'ALCOOL

Sans objet

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THERAPIES ALTERNATIVES

Sans objet

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

SPORTIFS

Sans objet

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VÉHICULES OU À UTILISER DES MACHINES

Sans objet

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

- DOLOSTOP 500 mg comprimé et DOLOSTOP 1000 mg comprimé : Sans objet
- DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent et DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent : Sodium

POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT

Malnutrition chronique

Déshydratation

Si vous avez l'impression que l'effet de trop faible, consultez votre médecin ou EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

DOLOSTOP 500 mg et DOLOSTOP 1000 mg

Les comprimés eau, lait, jus de

DOLOSTOP 500 mg effervescent :

Laisser dissoudre boire immédiatement

Fréquence d'administration

Les prises systématiques ou de fièvre.

Chez l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures et d'au moins 4 heures.

Chez l'adulte, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises doivent être espacées de 8 heures minimum.

DURÉE DU TRAITEMENT

La durée du traitement est limitée:

- à 5 jours en cas de douleurs
- à 3 jours en cas de fièvre Si les douleurs persistent plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

SURDOSSAGE

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.

INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

Dolostop® 1000mg

Boîte de 8 comprimés



A23027

Adulte

LOT : 6533
PER : 07 - 26
P.P.V : 10 DH 60

*OEDES® 20 mg

Microgranules gastrorésistants en gélule (Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

1. Identification du médicament:

Forme pharmaceutique et présentation:

OEDES® 20 mg. Microgranules gastro-résistants en gélules, boîtes de 7, 28 et 56

2. Composition du médicament :

Principes actifs :

Oméprazole 20 mg

EXCIPIENTS : q.s.p une gélule

Excipient à effet notable : Saccharose.

3. Classe pharmaco-thérapeutique :

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- un excès d'acidité dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$:

- le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limite.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

5. Posologie, Mode et/ou voies(s) d'administration. Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide.

Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé par l'acidité, il peut prescrire entre 20 et 30 gélules fractionnées.

gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

• Toujours remuer avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

6. Contre-indications :

Ne prenez jamais OEDES® 20 mg, gélule :

- si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OEDES® 20 mg.

• si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à proton (par exemple pantoprazole, lanoprazole, rabéprazole, esomeprazole).

• Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

• Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg.

7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

• Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et du gosier ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

• Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.

• Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Tous les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Mauvaise de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.
- Nausées ou vomissements.
- Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissements, fourmillements, somnolence.
- Vergetés.
- Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

• Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

• Malaise général, manque d'énergie.

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

• Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.

• Réactions allergiques, parfois très graves induisant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une respirацию silente.

• Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

• Agitation, confusion ou dépression.

• Troubles du goût.

• Troubles de la vue, tels que vision trouble.



... supérieure à un ...
de la hanche, du poignet ou des ...
si vous souffrez d'ostéoporose ou ...
peuvent augmenter le risque d'...
Si vous avez une éruption sur la ...
chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci

étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique nécessitent un traitement à long terme. Ne donner pas ce de 1 an ou < 10 kg.

Mentions relatives aux excipiens

En raison de la présence de déconseillé chez les patients présentant un syndrome de malabsorption, déficit en sucrase/éomatase (m)

9. Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. OEDES® 20 mg peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES® 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES® 20 mg si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH). Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

• Kétoconazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques) ;

• Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques) ;

• Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire) ;

• Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg.

• Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg;

• Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) ;

• Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) ;

• Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) ;

• Milteperut (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) ;

• Clostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente) ;

• Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) ;

• Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)).

• Etoricoxib (utilisé dans le traitement du cancer).

• Méthyltrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose).

LOT 220652
EXP 11/2024
PPV 30.00DH