

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

M22- 0018769

00972

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 00971

Société : Ram

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ECHATIBI MBARKA

Date de naissance :

01/01/1951

Adresse :

JARLAMANE BLOC CS Tammouz

Tél. :

0634614776 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation :

99

Nom et prénom du malade :

Echabibi M'Baraka

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Diabète

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casab

Le : 29/12/2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29.12.93		C ₂	3000.00	DR. ADOUANI HAM
10.01.94	Contrat	Gratuit		DR. ADOUANI HAM

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. PHARMACIE DU PARADIS 2001 Dr. H. ZAKIA Tél: 05 20 80 71	01.24	14880

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
Laboratoire Dr. H. ZAKIA Tél: 05 20 80 71	29.12.93 64.00		588.00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS	DEBUT D'EXECUTION	FIN D'EXECUTION	O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX
			H	25533412 21433552	
			D	00000000 00000000	
			B	35533411 11433553	
			G		

MONTANTS DES SOINS	DATE DU DEVIS	DATE DE L'EXECUTION	O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX
			H	25533412 21433552	
			D	00000000 00000000	
			B	35533411 11433553	
			G		

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	35533411 11433553
G	

O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
H	25533412 21433552

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie-
Cholestérol- Traitement de L'obésité - Maigreur
Glande Thyoïde- Surrénales- Sein - Stérilité
-Médecine Fonctionnelle et Métabolique
-Pied Diabétique
-Plaies et Cicatrisation
-Retard de Croissance



أخصائية في أمراض السكري.
الغدد. السمنة والهرمونات
- الطب الغذائي والوظيفي
- قدم السكري
- تأخير النمو

Casablanca le : 29.12.2023

Dr. ADOUAN ILHAM

- Hb A1c .

- urea. alk.

- L. l.

- GOT, GPT, OAT

Laboratoire populaire
12 Bd La Grande Ceinture
Haut Mohammadi, Casablanca
laboratoire.populaire@pam.ma
Télé1 : 05 22 61 51 34
Télé2 : 05 22 61 55 39
Fax : 05 22 61 35 35
GSM : 6 6 3 7 7 1 9

DR. ADOUAN ILHAM
Endocrinologie - Diabétologie - Nutritionniste
Hakam 1, Bd Ibn Tachfin N° 464
1er Etg - Casablanca
Tél : 05 22 63 62 79

حكم 1 شارع ابن تاشفين رقم 464. الطابق الأول - الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 63 62 79

Hakam 1, Boulevard Ibn Tachfin N° 464 1er étage - Casablanca - Tél : 05 22 63 62 79

LABORATOIRE POPULAIRE D'ANALYSES MEDICALES**12 Bd la grande ceinture Hay Mohammadi Casablanca****Tél : 05 22 61 33 34 / 08 08 52 55 39 - Fax : 05 22 61 33 35****ICE : 002331414000069****Patente : 30300440****IF : 96513170****FACTURE N° : 231201008**

CASABLANCA le 29-12-2023

Mme ECHATIBI Mbarka

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Clé	Coefficient
9106	Forfait traitement autre échantillon	B	0
0146	Transaminases O (TGO)	B	50
0106	Cholestérol total	B	30
0141	Gamma glutamyl transférase (GGT)	B	50
0119	Hémoglobine glycosylée	B	100
0108	Cholestérol H D L	B	50
0484	Microalbumine de 24H par immunonephélemétrie	B	120
0134	Triglycérides	B	60
	LDL calculé	B	30
0147	Transaminases P (TGP)	B	50

TOTAL DES B : 490

TOTAL DOSSIER : 588.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cinq cent quatre-vingt-huit dirhams .





Date du prélèvement : 29-12-2023 11:07
 Code patient : 2109280050
 Né(e) le : 01-01-1957 (67 ans)


Mme ECHATIBI Mbarka
 Dossier N° : 2312290043
 Prescripteur : Dr ADOUAN ILHAM



BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

01-09-2023

Hémoglobine glyquée : 5.8 % (4.0-6.0) 6.2
 (HPLC)



01-09-2023
 Cholestérol total : 2.19 g/L (2.00) 2.57
 (Enzymatique–colorimétrique–Trinder) 5.66 mmol/L (<5.17)

Normal	< 2 g/L	5.17 mmol/L
Risque modéré	2-2.39 g/L	5.17-6.18 mmol/L
Risque élevé	>2.40 g/L	6.21 mmol/L

01-09-2023
 HDL-Cholestérol : 0.70 g/L (>0.35) 0.84
 (Enzymatique–Colorimétrique) 1.80 mmol/L (>0.90)



2312290043 – Mme ECHATIBI Mbarka

01-09-2023

LDL-Cholestérol
 (Calculée)

1.27 g/L
 3.27 mmol/L

1.59

Acceptable	< 1.30g/L	3.4 mmol/L
Limite de risque	1.30–1.60 g/L	3.4 – 4.1 mmol/L
Risque Elevé	> 1.60 g/L	> 4.1 mmol/L

01-09-2023

Triglycérides :
 (Enzymatique–colorimétrique)

1.09 g/L

(<2.00)

0.72

Normal :	< 2g/L
Risque modéré :	2 - 4 g/L
Risque élevé :	> 4 g/L

10-03-2023

Transaminases GPT (ALAT):
 (IFCC– Cinétique)

24.90 U/L

(<34.00)

13.90

10-03-2023

Transaminase TGO (ASAT):
 (IFCC– Cinétique)

17.70 U/L

(<31.00)

14.00

10-03-2023

Gamma glutamyl-transferase (GGT) :
 (IFCC- Enzymatique)

33.20 U/L

(<38.00)

21.20

2312290043 – Mme ECHATIBI Mbarka

BIOCHIMIE URINAIRE

Microalbuminurie des 24H

Diurèse	1.50	L	(0.80–2.00)
Microalbuminurie (échantillon)	7.84	mg/l	
Microalbuminurie des 24h (Immunoturbidimétrique)	11.76	mg / 24h	(<30.00)
	103.96	µmol/24h	(<265.20)

Valeurs de références :

Normal: <30 mg/jour

Microalbuminurie : 30–300 mg/jour

Macroalbuminurie >300 mg / jour

Validé par : Dr. SENHAJI RHAZEL FATIMA ZAHRA



Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie-
Cholestérol- Traitement de L'obésité - Maigreur
Glande Thyroïde- Surrénales- Sein - Stérilité
- Médecine Fonctionnelle et Métabolique
- Pied Diabétique
- Plaies et Cicatrisation
- Retard de Croissance



أخصائية في أمراض السكري.
الغدد. السمنة والهرمونات
- الطبع الغذائي والوظيفي
- قدم السكري
- تأخر النمو

Casablanca le : 10.01.2024



Dr. Bouchaib Bakkali

4960 - Dr. Farid :
14880
1
x3
Naq / 115 j llt 3 mois
puis Naq / mois llt 3 mois

S.V

Dr. ADOUAN ILHAM
Endocrinologue - Diabetologue - Nutritionniste
Hakam 1, Bd. Ibn Tachfin, N°464
1er Etg - Casablanca
Tél: 05 22 63 62 79

Notice :
Information de l'utilisateur
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

PPV: 4,60 DH
LOT: 23C29
EXP: 03/2026

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Instructions

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.
- si vous avez une hypervitaminose D.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphate,
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire),
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalcémie, (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines)
- si vous souffrez de sarcoidose compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, il y a lieu de surveiller la calcémie et la calciurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphorique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les taux de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlés.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines ainsi que la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées recevant un traitement concomitant par glycosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) ou diurétiques (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire). En cas d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) ou de signes de dysfonction rénale, la dose doit être réduite ou le traitement interrompu. Il est recommandé de réduire le dosage ou d'interrompre le traitement momentanément si le calciurie dépasse 7,5 mmol/24 heures (300 mg/24 heures).

Autres médicaments et D-Cure forte :

N'oubliez pas de mentionner à votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

L'utilisation concomitante de phénytoïne (utilisée pour traiter l'épilepsie) ou de barbituriques (utilisés pour traiter l'épilepsie, les troubles du sommeil et en tant qu'anesthésique) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Les diurétiques thiazidiques (par ex. les dérivés de benzothiadiazine) sont des médicaments qui stimulent l'excrétion urinaire et qui peuvent provoquer une hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) car ils réduisent l'élimination rénale du calcium. Par conséquent, il convient de surveiller les taux de calcium dans le sang et les urines en cas de traitement prolongé.

L'administration concomitante de glucocorticoïdes (utilisés pour traiter certaines maladies allergiques) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Le risque d'effet indésirable peut être accru chez les patients prenant des glucosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) en raison de l'augmentation du taux de calcium dans le sang pendant un traitement par la vitamine D (risque d'arythmies cardiaques). Il convient de faire un ECG ainsi que de surveiller le dosage des taux de calcium dans le sang et les urines.

Veuillez tenir compte du fait que ces précautions s'appliquent également aux médicaments que vous avez pris récemment.

Interactions avec les aliments ou les boissons :

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Demandez toujours conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre un médicament.

D-CURE FORTE ne doit être administré chez la femme enceinte qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement à des doses absolument nécessaires pour éliminer la carence. Chez la femme enceinte, un surdosage en vitamine D doit être évité car une hypercalcémie prolongée (augmentation du taux de calcium dans le sang) peut provoquer un retard physique et mental, une maladie cardiaque congénitale et une maladie oculaire chez l'enfant.

La vitamine D et ses métabolites passent dans le lait maternel. Un surdosage induit de cette manière n'a cependant jamais été observé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucune mesure de précaution spéciale n'est requise.

3. COMMENT PRENDRE D-CURE FORTE ?

Mode et voies d'administration :

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de la notice.

Notice :
Information de l'utilisateur
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

PPV: 4,60 DH
LOT: 23C29
EXP: 03/2026

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Instructions

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.
- si vous avez une hypervitaminose D.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphate,
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire),
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalcémie, (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines)
- si vous souffrez de sarcoidose compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, il y a lieu de surveiller la calcémie et la calciurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphorique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les taux de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlés.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines ainsi que la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées recevant un traitement concomitant par glycosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) ou diurétiques (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire). En cas d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) ou de signes de dysfonction rénale, la dose doit être réduite ou le traitement interrompu. Il est recommandé de réduire le dosage ou d'interrompre le traitement momentanément si le calciurie dépasse 7,5 mmol/24 heures (300 mg/24 heures).

Autres médicaments et D-Cure forte :

N'oubliez pas de mentionner à votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

L'utilisation concomitante de phénytoïne (utilisée pour traiter l'épilepsie) ou de barbituriques (utilisés pour traiter l'épilepsie, les troubles du sommeil et en tant qu'anesthésique) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Les diurétiques thiazidiques (par ex. les dérivés de benzothiadiazine) sont des médicaments qui stimulent l'excrétion urinaire et qui peuvent provoquer une hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) car ils réduisent l'élimination rénale du calcium. Par conséquent, il convient de surveiller les taux de calcium dans le sang et les urines en cas de traitement prolongé.

L'administration concomitante de glucocorticoïdes (utilisés pour traiter certaines maladies allergiques) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Le risque d'effet indésirable peut être accru chez les patients prenant des glucosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) en raison de l'augmentation du taux de calcium dans le sang pendant un traitement par la vitamine D (risque d'arythmies cardiaques). Il convient de faire un ECG ainsi que de surveiller le dosage des taux de calcium dans le sang et les urines.

Veuillez tenir compte du fait que ces précautions s'appliquent également aux médicaments que vous avez pris récemment.

Interactions avec les aliments ou les boissons :

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Demandez toujours conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre un médicament.

D-CURE FORTE ne doit être administré chez la femme enceinte qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement à des doses absolument nécessaires pour éliminer la carence. Chez la femme enceinte, un surdosage en vitamine D doit être évité car une hypercalcémie prolongée (augmentation du taux de calcium dans le sang) peut provoquer un retard physique et mental, une maladie cardiaque congénitale et une maladie oculaire chez l'enfant.

La vitamine D et ses métabolites passent dans le lait maternel. Un surdosage induit de cette manière n'a cependant jamais été observé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucune mesure de précaution spéciale n'est requise.

3. COMMENT PRENDRE D-CURE FORTE ?

Mode et voies d'administration :

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de la notice.

Notice :
Information de l'utilisateur
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

PPV: 4,60 DH
LOT: 23C29
EXP: 03/2026

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Instructions

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.
- si vous avez une hypervitaminose D.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphate,
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire),
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalcémie, (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines)
- si vous souffrez de sarcoidose compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, il y a lieu de surveiller la calcémie et la calciurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphorique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les taux de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlés.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines ainsi que la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées recevant un traitement concomitant par glycosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) ou diurétiques (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire). En cas d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) ou de signes de dysfonction rénale, la dose doit être réduite ou le traitement interrompu. Il est recommandé de réduire le dosage ou d'interrompre le traitement momentanément si le calciurie dépasse 7,5 mmol/24 heures (300 mg/24 heures).

Autres médicaments et D-Cure forte :

N'oubliez pas de mentionner à votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

L'utilisation concomitante de phénytoïne (utilisée pour traiter l'épilepsie) ou de barbituriques (utilisés pour traiter l'épilepsie, les troubles du sommeil et en tant qu'anesthésique) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Les diurétiques thiazidiques (par ex. les dérivés de benzothiadiazine) sont des médicaments qui stimulent l'excrétion urinaire et qui peuvent provoquer une hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) car ils réduisent l'élimination rénale du calcium. Par conséquent, il convient de surveiller les taux de calcium dans le sang et les urines en cas de traitement prolongé.

L'administration concomitante de glucocorticoïdes (utilisés pour traiter certaines maladies allergiques) peut réduire l'effet de la vitamine D.

Le risque d'effet indésirable peut être accru chez les patients prenant des glucosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) en raison de l'augmentation du taux de calcium dans le sang pendant un traitement par la vitamine D (risque d'arythmies cardiaques). Il convient de faire un ECG ainsi que de surveiller le dosage des taux de calcium dans le sang et les urines.

Veuillez tenir compte du fait que ces précautions s'appliquent également aux médicaments que vous avez pris récemment.

Interactions avec les aliments ou les boissons :

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Demandez toujours conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre un médicament.

D-CURE FORTE ne doit être administré chez la femme enceinte qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement à des doses absolument nécessaires pour éliminer la carence. Chez la femme enceinte, un surdosage en vitamine D doit être évité car une hypercalcémie prolongée (augmentation du taux de calcium dans le sang) peut provoquer un retard physique et mental, une maladie cardiaque congénitale et une maladie oculaire chez l'enfant.

La vitamine D et ses métabolites passent dans le lait maternel. Un surdosage induit de cette manière n'a cependant jamais été observé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucune mesure de précaution spéciale n'est requise.

3. COMMENT PRENDRE D-CURE FORTE ?

Mode et voies d'administration :

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de la notice.