

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : 122711		Société : R.A.N	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : Crossous Elum Keltaem		Date de naissance : 25/12/1988	
Adresse : 478, rue des Grèbles CGR, mille route		Tél. : 0662711273	
Total des frais engagés : 900 Dhs			
Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade : Crossous Elum Keltaem Age :			
Lien de parenté : R.wo Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : R.wo Rétinopathie			
Affection longue durée ou chronique : <input type="checkbox"/> ALD <input type="checkbox"/> ALC Pathologie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.			
Fait à : Casablanca Le : 26/01/2019			
Signature de l'adhérent(e) :			

CABINET DE SLAOUI MOHAMMED ASTRO ENTEROLOGUE
82, Rue Soumaya 2^e Etage - Casablanca
Tél: 0522 25 99 87 - 06 98 97 11 18
Email: sliommed.slaoui@orange.com

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet de signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/11 2024	V2		1000	BENT DR SLAoui GASTROENTEROLOGISTE RECEPTION 82, Rue Soumaya, 2 ^e Etage 101522 25 99 87 - 0 bent.slaoui.med.doc@free.fr

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la facture
	18/11/20	45011.0

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Laboratoire de Parc du Centre 52, Boulevard Zektaoui Casablanca Tél: 0522 22 51 31/34 Fax: 0522 22 50 00	18/01/29	P409	450,00

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES															
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.															
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.															
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX											
MONTANTS DES SOINS															
DEBUT D'EXECUTION															
FIN D'EXECUTION															
O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES		DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE													
		<p>H</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> </table> <p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>	25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		CŒFFICIENT DES TRAVAUX
			25533412	21433552											
			00000000	00000000											
			D												
			00000000	00000000											
			35533411	11433553											
			B												
MONTANTS DES SOINS															
DATE DU DEVIS															
DATE DE L'EXECUTION															
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS															
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'															

Le标本已送达实验室日期：16/01/24
取材部位或临床表现：Duodénium + Estomac
年龄：46岁
正常
其他：正常 HP 7

COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

Il a été communiqué trois biopsies mesurant 2 à 3 mm de grand axe.

Un fragment montre une muqueuse duodénale aux villosités longues et fines revêtues de cellules cylindriques ne présentant pas d'atypies nucléo-cytoplasmiques. Les glandes sont normocrites disposées de façon homogène au sein d'un chorion siège d'un discret infiltrat inflammatoire mononucléé. Absence d'atrophie villositaire et d'hyperlymphocytose intraépithéliale (LIE = 10%).

Les deux autres fragments montrent une muqueuse antrale dont l'épithélium de revêtement de surface et des cryptes est bordé de cellules mucosécrétantes régulières sans atypies cytonucléaires. Les glandes sont normocrites et régulières, distribuées au sein d'un chorion siège d'un léger infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire.

Absence d'HP

Absence de métaplasie intestinale.


Absence de signes histologiques de malignité.

Conclusion :

- Muqueuse duodénale de morphologie conservée, sans atrophie villositaire et sans hyperlymphocytose intraépithéliale.
- Gastrite antrale chronique, d'intensité légère, non atrophique et non active avec absence d'HP
- Absence de métaplasie intestinale et de dysplasie.

Dr Nouhad BENKIRANE

52, Bd. Mohammed V, Casablanca, Maroc
Dr. BENKIRANE Nouhad
ANATOMO-PATHOLOGISTE



Laboratoire de Pathologie du Centre

Dr. Nouhad BENKIRANE

Pr. Laila LARAQUI

Casablanca, le 18/01/2024

FACTURE N° : 24/01573

Le laboratoire vous prie de croire à l'assurance de ses meilleurs sentiments et vous présente le relevé de ses honoraires s'élevant à la somme de :

450,00 Dhs

QUATRE CENT CINQUANTE DIRHAMS

Concernant les analyses exécutées le **18/01/2024**

Pour **GUESSOUS OUM KELTOUM**

Sur ordonnance du : **Dr SLAOUI MOHAMED**

Laboratoire de Pathologie
du Centre
52, Boulevard Zerkouni, Casablanca
Tél. : 022.2251.31/34
Fax : 022.2250.90



AKDITAL

Clinique Longchamps
مصحة لونشون

Casablanca, le

11/1/26

Mme GUESSOUS OUM KEL

Né le : 25/12/1978



CLC24A17085529

123,60 x 3 = 370,80

- INSIXIUM uo44

1

-

SV

x 7

58,30

SV

x 1000

(-) REGASHUN 1644

Mr. 1
11

SV

LIBRAX
10453
118101121

Pharmacie Dyar Al Andalous
Res: Dyar Al Andalous, GHA
N° 10 - BOUSKOURA
Tel: 05 22 33 49 81

Docteur Mohamed SLAOUI
Gastro - Entérologue
Clinique Longchamps
CASABLANCA

Docteur Mohamed SLAOUI
Gastro - Entérologue
Clinique Longchamps
CASABLANCA

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétante. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démöxépam, desméthyldiazepam. Le démöxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans la circulation jusqu'à l'amine féciale soumise à peu d'effectue l'oxygénation. Les fèces sont donc rosantes et peuvent contenir des dérivés de l'amino-acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du bromure de clidinium inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant d'un état spastique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le matin ou au cours des repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par une dose faible et augmenter progressivement la posologie jusqu'à la dose optimale.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et la taille, avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

Librax® 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019



LOT : 23230 PER : 10/2026
PPV : 21,00 DH

à peu

peut être

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MEGASFON® ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible.

N'utilisez jamais MEGASFON® :

- Si vous êtes allergique au phloroglucinol, au triméthylphloroglucinol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam dans le MEGASFON®, comprimé orodispersible.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser MEGASFON®.

Enfants et adolescents

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible : Sans objet.

MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible : Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

MEGASFON®

pas adapté

Autres m

Informez

récemment

MEGAS

Sans ob

Grosse

Si vous

encein

médeci

Gross

L'utili

de la

Allai

L'adn

femme qui allaité.

Conduite de véhicules et utilatio

MEGASFON® n'a aucun effet ou qu'un effe

négligeable sur

l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

1 comprimé orodispersible, au moment de la crise.

Renouvez en cas de spasmes importants en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 comprimés orodispersibles par jour.

Utilisation chez les enfants et adolescents

Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire :

Chez l'adulte

1 suppositoire, trois fois par jour en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 suppositoires par jour.

Utilisation chez les enfants

Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

Voie et mode d'administration

MEGASFON® comprimé orodispersible : Voie orale.

Chez l'adulte, les comprimés sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant, les comprimés sont à dissoudre dans un verre d'eau.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire : Voie rectale.

Si vous avez utilisé plus de MEGASFON® que vous

n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre

pharmacien

utiliser MEGASFON® :

se double pour compenser la dose que prendre.

utiliser MEGASFON® :

questions sur l'utilisation de ce

medicament, demandez plus d'informations à votre médecin,

pharmacien.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquence indéterminée :

• Une éruption étendue squameuse rouge avec des masses

et qui contient MEGASFON®.

MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible :

La substance active : Phloroglucinol

Phloroglucinol dihydraté 80 mg
(Sous forme de phloroglucinol anhydre)

Excipients q.s.p 1 comprimé

Excipients à effet notoire : Aspartam, lactose.

MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible :

La substance active : Phloroglucinol

Phloroglucinol hydraté 160 mg
Excipients q.s.p 1 comprimé

Excipient à effet notoire : Aspartam.

MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire :

Les substances actives : Phloroglucinol/Triméthylphloroglucinol

Phloroglucinol hydraté 150 mg
(Sous forme de phloroglucinol anhydre)

Triméthylphloroglucinol 150 mg
Excipients q.s.p 1 suppositoire

Qu'est-ce que MEGASFON® et contenu de l'emballage extérieur ?

MEGASFON® se présente sous forme de comprimé orodispersible et suppositoire :

- MEGASFON® 80 mg, comprimé orodispersible, boîte de 10 et boîte de 20.

- MEGASFON® 160 mg, comprimé orodispersible, boîte de 10 et boîte de 20.

- MEGASFON® 150 mg/150 mg, suppositoire, boîte de 8.

Conditions de délivrance :

Médicament non soumis à prescription médicale.

Date de révision de la notice :

Juin 2020.

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium ?
2. Comment prendre INexium ?
3. Comment stocker INexium ?
4. Comment éliminer INexium ?
5. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac ?
6. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle ?



1. Qu'est-ce que INexium ?
- INexium est un médicament gastro-résistant contre l'acidité. Il appartient à une famille de médicaments appelée inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA). Ces médicaments empêchent l'aspiration d'acide dans l'estomac et empêchent l'apparition d'ulcères de l'estomac et de l'intestin grêle.
2. Comment prendre INexium ?
- INexium est pris par voie orale. Prenez-le avec de l'eau. Suivez les instructions de votre pharmacien ou de votre médecin.
3. Comment stocker INexium ?
- Stockez INexium à température ambiante, entre 15 et 30 °C, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe.
4. Comment éliminer INexium ?
- INexium est éliminé par les urines. Les personnes qui prennent INexium doivent faire attention à l'acidité de leurs urines.
5. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac ?
- INexium empêche l'aspiration d'acide dans l'estomac et empêche l'apparition d'ulcères de l'estomac. Cependant, il peut également provoquer des effets indésirables tels que l'ulcère.
6. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle ?
- INexium empêche l'aspiration d'acide dans l'estomac et empêche l'apparition d'ulcères de l'estomac. Cependant, il peut également provoquer des effets indésirables tels que l'ulcère.

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.

- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

éosoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium ?
2. Comment prendre INexium ?
3. Comment stocker INexium ?
4. Comment éliminer INexium ?
5. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac ?
6. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle ?



1. Qu'est-ce que INexium ? INexium est un médicament gastro-résistant qui contient de l'éosoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé inhibiteurs de l'acide réticulé (IAR). L'éosoméprazole est une quantité d'acide produite par l'estomac.
2. Comment prendre INexium ? INexium peut être pris avec ou sans manger. Prenez-le avec une grande quantité d'eau. Il peut également être pris avec ou sans manger. INexium peut également être pris avec ou sans manger.
3. Comment stocker INexium ? INexium doit être conservé à température ambiante (entre 15 et 25 °C) et à l'abri de la lumière. Ne pas le mettre dans un endroit où il peut être atteint par les enfants.
4. Comment éliminer INexium ? INexium est éliminé par l'urine. Les personnes qui prennent INexium doivent faire attention à l'urine, car elle peut être rouge ou orange.
5. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac ? INexium peut empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac. Cependant, il ne peut pas empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac.
6. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle ? INexium peut empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle. Cependant, il ne peut pas empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle.

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.
- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

éosoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium ?
2. Comment prendre INexium ?
3. Comment stocker INexium ?
4. Comment éliminer INexium ?
5. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac ?
6. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle ?



1. Qu'est-ce que INexium ? INexium est un médicament gastro-résistant qui contient de l'éosoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé inhibiteurs de l'acide réticulé (IAR). L'éosoméprazole est une quantité d'acide produite par l'estomac.
2. Comment prendre INexium ? INexium peut être pris avec ou sans manger. Prenez-le avec une grande quantité d'eau. Il peut également être pris avec ou sans manger. INexium peut également être pris avec ou sans manger.
3. Comment stocker INexium ? INexium doit être conservé à température ambiante (entre 15 et 25 °C) et à l'abri de la lumière. Ne pas le mettre dans un endroit où il peut être atteint par les enfants.
4. Comment éliminer INexium ? INexium est éliminé par l'urine. Les personnes qui prennent INexium doivent faire attention à l'urine, car elle peut être rouge ou orange.
5. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac ? INexium peut empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac. Cependant, il ne peut pas empêcher l'apparition d'ulcères de l'estomac.
6. Comment empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle ? INexium peut empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle. Cependant, il ne peut pas empêcher l'apparition d'ulcères de l'intestin grêle.

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.
- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium