

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire


Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7699 Société : RAM
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : SAMIA MOSIT AFA
 Date de naissance : 12.12.55
 Adresse : Nouvelle adresse
 Tél. 06 74888484 Total des frais engagés : 420,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :


Date de consultation : 06/11/2019 Age : 54

Nom et prénom du malade : SELEMI ROSTE Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Depuis 2019

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : Depuis 2019

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : En cas d'accident

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 05/11/2019 Le : 05/11/2019

Signature de l'adhérent(e) : Signature

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRE

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION



BDERRAHIM

GENERALE

Service des Urgences
 Dr. Abdellah
 à la Cour des Tribunaux

hammedia, le ...

الدكتور نعيم عبد الرحيم

الطب العام

رئيس قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله سابقا
 خبير محلف لدى المحاكم

08-1-27
 الحمدية، في

120,40

PHARMACIE CHABAB CASA
 49150
 05 23 30 30 23
 Rue Doukkala
 Kasbah Mohammedia
 Tel: 05 23 30 30 23

40,00

61,00

270,90

clarulan 1g 6,
 11x21
 21 amaxol 500
 11x21
 - Preedy 20
 11x21 x 9,

Baroceg 11x21

Tel: 05 23 30 30 23
 Bd. des F.A.R. Rue Doukkala
 Mohammedia
 Décatur N°101 Abderrahim

شارع الجيش الملكي زنقة دكالة إقامة القصبة الحمدية - الهاتف : 05 23 30 30 23
 Bd. des F.A.R. Rue Doukkala Immeuble Walili Kasbah Mohammedia - Tél.: 05 23 30 30 23

CURAXO

Solution buvable pour A

Edulcorée sans sucre

- Apaise et dégage les voies respiratoires
- Adoucit la gorge irritée
- Renforce les défenses de l'organisme

الجهاز التنفسي، تهدئة التهاب الحلق و تقوية دفاع الجسم.
بروبيوليس : يحرك جيدا قبل الاستعمال.
للحالات والمرضى.
غذائي، ليس بدواء.
غير ملئن للباراز.

FR CURA+XOL est à base de propolis et d'huiles essentielles. Pour le confort respiratoire, l'apaisement et le renforcement des défenses de l'organisme.

Composition : Eau purifiée, Sorbitol, Glycerine, Propolis, Gomme xanthane, Benzoate de Sodium, Sorbate de Potassium, Huile Essentielle d'Eucalyptus Globulus, Huile Essentielle de Thymus Vulgaris, Huile Essentielle d'Eugenia Caryophyllus, Huile Essentielle de Mentha Piperita.

Mode d'emploi : 1 cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour. Cette solution contient des particules de propolis : bien agiter le flacon avant l'emploi.

Composants	Quantité (g/100ml)	Par dose Journalière (g/45 ml)
Propolis poudre	0,50	0,22
Huile essentielle d'Eucalyptus Globulus	0,09	0,04
Huile essentielle de Thymus Vulgaris	0,07	0,03
Huile essentielle d'Eugenia Caryophyllus	0,03	0,01
Huile essentielle de Mentha Piperita	0,03	0,01

Précautions d'emploi : Ne pas utiliser en cas de sensibilité aux produits de la ruche ou à l'un des composants. Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante. Tenir hors de la portée des enfants.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. Après ouverture, consommer dans un délai d'un mois.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. Ce complément alimentaire ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée. La consommation excessive de cette solution peut entraîner un effet laxatif.

Lot/Date de péremption : voir sur l'emballage.

Agrément ONSSA n° : CAPV.9.214.22

Autorisation Ministère de Santé n° : 20222211646/V1/CA/DPS/DMP/18

EN CURA+XOL Drinkable solution for adults - Sugar free sweetened

Made with Propolis and Essentiels oils : Clove, Eucalyptus, Thyme and Mint.

For respiratory comfort, soothing irritations and sore throats, and strengthening the body's defences.

How to use : 1 tablespoon, 3 to 4 times per day. This solution contains propolis particles:

the bottle well before use. **Precaution for use :** Avoid using in case of sensitivity to hive products Shake or to any of the components. Not recommended for pregnant and breast-feeding women.

Keep out of the reach of children. **Storage conditions:** Store in a cool and dry place, away from light.

After opening, consume within one month. Dietary supplement, it is not a medicine.

This dietary supplement cannot replace a varied and balanced diet.

Excessive consumption of this solution may cause a laxative effect.

البروبوليـس

ـ الزـيـرـةـ الـاسـاسـيـةـ

ـ فـرنـقـلـ،ـ أـوكـالـيـبـتوـسـ،ـ زـعـنـ،ـ نـطـاعـ

كوراك

محلول للشرب

المحلي بدون سكر

يريح الجهاز الهـ

ـ يهدـى التـهـابـ الـ

ـ يـقـويـ دـفـاعـ الـجـ

AR كورا+كسول مكون من البروبوليـسـ

طـرـيـقـ الـاسـتـعـالـ :ـ مـلـقـةـ كـبـيرـةـ 3ـ إـلـىـ 4ـ

ـ اـحـيـاطـاتـ الـاسـتـعـالـ :ـ تـجـنـبـ الـاسـتـعـالـ فـ

ـ نـصـاصـ التـخـزـينـ :ـ يـحـفـظـ بـعـدـ عـنـ الرـطـوـ

ـ تـنـاـولـ الـمـكـمـلـاتـ الـذـانـيـةـ لـ يـعـوـضـ نـظـاماـ

ـ يـحـمـىـ وـ يـمـنـثـ

ـ 125ـ مـلـ

ـ يـرـيحـ وـ يـمـنـثـ

ـ الـرـيـفـرـمـ

AZ-PHARMA
LABORATOIRES



125 مل

PREDNI® 20 Cooper

Comprimé effervescent sécable - Boîte de 20
(Prednisolone)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice : prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit par d'autres personnes. Il pourrait leur être nécessaire de signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si l'un des effets indésirables devient grave ou un effet indésirable non mentionné dans cette notice, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'est-ce que cette notice ?

1. Qu'est-ce que Predni 20 Cooper, comprimé effervescent et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître ?

3. Comment prendre Predni 20 Cooper, comprimé effervescent ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE - Code ATC : H02AB06 (H. Hormones non sexuelles).

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 10 kg. Ce médicament est utilisé dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet des greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable ?

Ne prenez jamais Predni 20 Cooper, comprimé effervescent sécable

• Si vous êtes allergique à la substance active (prednisolone) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

• Si vous avez une infection.

• Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).

• Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.

• Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).

Avertissements et précautions

Ce médicament doit être pris sous une stricte surveillance médicale. Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les prématurés et les nouveau-nés à terme. Cependant, chez les nourrissons prématurés traités par d'autres médicaments de la même classe, une échographie cardiaque doit être effectuée pour surveiller la structure et la fonction du muscle cardiaque.



Follow the advice of your doctor or pharmacist.
Suivez les conseils de votre pharmacien.

Medecin ou de votre pharmacien.
Sodium (composant principal),
équivaut à 1,26 % de l'apport
de sodium pour un adulte.
20 Cooper, comprimé

à l'enfant de plus de 10 kg,
otre médecin, en fonction de
e est strictement individuelle.
est adapté si vous débutez un
e un traitement sur une courte
nes ou fortes.

ent sur une durée prolongée et à
par jour, il existe des dosages plus

voie orale.

imprimés dans un verre d'eau. Avalez le
ence au cours du repas, en une prise le

votre médecin.

suivez régulièrement le traitement et de ne pas
brutalement sans l'avis de votre médecin.
En cas de traitement prolongé, suivez les recommandations de votre
médecin pour la diminution des doses.

Si vous avez pris plus de Predni 20 Cooper comprimé effervescent sécable que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin.

Si vous oubliez de prendre Predni 20 Cooper comprimé effervescent sécable :

Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement.
Cependant, si vous oubliez de prendre une dose, continuez le
traitement normalement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament,
demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des
effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement
chez tout le monde.

Ce médicament, indispensable à votre santé, est le plus souvent bien
toléré lorsque l'on suit les recommandations et notamment le régime
pauvre en sel, en sucre et riche en protéines (voir également le
paragraphe « Avertissements et précautions »).

Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement,
des effets plus ou moins gênants.

Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés sont :

• Une modification de certains résultats de vos analyses (sel, sucre, potassium) pouvant nécessiter un régime ou un traitement complémentaire.

• Une apparition de bleus.

• Une élévation de la tension artérielle, rétention d'eau et de sel
pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.

• Des troubles de l'humeur (excitation, euphorie), troubles du
sommeil (insomnie).

• Un ensemble de troubles appelé syndrome de Cushing
reconnaissable par une prise de poids, un gonflement et une rougeur
du visage, un développement excessif des poils.

• Une fragilité osseuse (ostéoporose, fractures, tassements
vertébraux notamment).

• Des atteintes douloureuses des os au niveau de l'articulation de la
hanche (arthrose).

الأثار الجانبية الشائعة جداً:

يمكن أن تظهر لدى أكثر من شخص واحد من أصل 10:

- الإسهال (عند الكبار).

الأثار الجانبية الشائعة:

يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 10:

- الملاط (عوادي نتيجة عن العطريات التي تهوى المريضات، والتثبيات الجلدية).

الغثيان، لاسيما عند تناول جرعتين متتاليتين.

إذا ظهرت عليك أو على طفلك هذه الآثار بسيطة، فاعمل

التي:

- الإسهال (لدى الأطفال).

الأثار الجانبية قليلة الشيوع:

يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100:

- طفح جلدي، حكة.

طفح جلدي يزداد مع حكة (شرى).

- عسر الهضم.

نواة.

صداع الرأس.

الأثار الجانبية قليلة الشيوع التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

- ارتفاع معدل بعض المواد (الأنزيمات) التي ينتجها الكبد.

الأثار الجانبية النادرة:

يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 1000:

- طفح جلدي، يمكن أن تكون منه تهجدات تشبه بقعاً سفلياً.

منطقة أكثر شحوبية، وحولها حلقة داكنة: حمامي عديدي الاشارة.

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك على وجه الـ

الأثار الجانبية النادرة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

- انخفاض عدد الخلايا التي تساهم في تثبيت الدم (الصفائحات).

انخفاض عدد الكريات البيضاء.

أثار جانبية أخرى:

يمكن أن تظهر أثار جانبية أخرى لدى عدد ضئيل من الأشخاص:

- ردود فعل تحسسية (انظر أعلاه).

• التهاب الأمعاء الغليظة (انظر أعلاه).

• التهاب الغشاء العصبي الذي يحيط بالدماغ (التهاب السحايا العصبية).

ردود الفعل الجانبية الحادة:

طفح منتشر بصاحبه تجدادات وتوسعة الجلد، وأسماوا حول الفم

اللتسلسية (أثار سيفلنس جونسون)، وشكل من الطفح أكثر حد

(أكثر من 30 بالمائة من السطح الجلدي: متلازمة لوب).

طفح جلدي أحمر منتشر بصاحبه تجدادات صغيرة تحتوي على

القشرة.

طفح حارشي أحمر تصاحبه تجدادات دم غير طبيعية (ما في ذلك زيادة خلايا الدم البيضاء

الكبد): فرط التحمس من الأدوية.

إذا ظهرت عليك أحد هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك على الفور.

• التهاب الكبد.

• البرقان، الذي ينتج عن ارتفاع معدل البيليروبين في الدم (وهي

ثلوان أصفر للبشرة وفي المنطقة البيضاء من العين).

• التهاب الكلية.

• استنطالة دم تختفي الدم.

• فرط النشاط.

• تشنحات (التي الأشخاص الذين يتناولون جرعتين متتاليتين من كلارولان

اللسان الأسود (أشرار اللسان):

• ثلوان الألسن (لدى الأطفال)، وبختالي عموماً عند فرش الأسنان.

الأثار الجانبية التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم أو البول:

- انخفاض مهم في عدد الكريات البيضاء.

• انخفاض عدد الكريات الحمراء (فرط الدم الاحتفالي).

• بلورات في البول.

التصريح بالآثار الجانبية:

إن شعرت بأثر غير متسبب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي

متسبباً لم يرد ذكره بهذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار

الوطنية أو على العنوان:

GlaxoSmithKline Maroc 42-44

تالار البيضاء 20000

e-na@gsk.com

5. كيف يمكن حفظه

يحفظ بعيداً عن متناول

تاريخنتهاء الصلاحية

لا ينفي استخدامه كلفاف

المكتور على العلبة.

PPV: 120/40
LOT: 651425
PER: 03/25

CLAVULIN

CLAVULIN 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension Amoxicilline/acide clavulanique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice médicamenteuse car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la à l'avenir.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations au pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (enfant). Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être dangereux même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous ne le mentionnez pas dans cette notice, parlez-en au médecin.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CLAVULIN et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament?
3. Comment prendre CLAVULIN?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver CLAVULIN?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CLAVULIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Association de pénicilline et d'acide clavulanique.

- code ATC : J01CR02.

CLAVULIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments à large spectre. Ils peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'acide clavulanique empêche cette inactivation.

CLAVULIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les abcès,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE SUR CLAVULIN?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à CLAVULIN, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CLAVULIN :

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée, une rougeur ou une éruption du visage ou du cou,
- si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou à la vésicule biliaire (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un autre antibiotique.

→ Ne prenez pas CLAVULIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien ou prenez CLAVULIN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet.

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux voies biliaires,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien ou prenez CLAVULIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra prescrire un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

CLAVULIN peut aggraver certaines maladies déjà engendrées, notamment des réactions allergiques, des convulsions et du gros intestin. Lorsque vous prenez CLAVULIN, vous pouvez avoir des symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions particulières », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules

N200885-01

