

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7699

Société :

Optique

Autres

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

SAMALI MOSTAFA

Date de naissance :

12.12.55

Adresse :

N° 1ème étage

Tél. : 0674888484

Total des frais engagés : 2071,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

15.01.2024

Nom et prénom du malade :

ScamPaf Mostafa

Age: 69

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

gastro-entérologie + Compl. de la pharynx

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes 15/01/24	Natures des Actes Le Jour De Pa FOGD	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes <i>Dr. AIT BELLA NARNA</i> Hépatogastro-Entérologie Proctologie Médico - Chirurgicale Tél : 06 16 17 01 40
-----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------	---

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	15/01/24	1671,10

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Médecin	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Centre de Pathologie Zohr Dr. Hind Al Attar RDC Arabe 17 Louvia Centre Belmoula - Tétouan - Maroc</i>	15/01/24	P 363	400 DA

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
MONTANTS DES SOINS				
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412	21433552	
D	00000000	00000000		
	00000000	00000000		
B	35533411	11433553		
MONTANTS DES SOINS				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



- Ex Médecin interne au CHU ibno Rochd Casablanca
- Membre de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie.

- طبيبة داخلية سابقة بالمستشفي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء
- عضو بالجمعية الفرنسية لامراض الجهاز الهضمي

- Hépatologie
- Maladies de l'estomac et de l'intestin
- Proctologie Médico - Chirurgicale
- Endoscopie Digestive
- Echographie Abdominale.

- أمراض الكبد
- أمراض المعدة والآماء
- أمراض وجرحية الشرج والبواسير
- الفحص بالمنظار
- الفحص بالصدري

Dr. AIT BELLA Naima
Hépato-gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
Tél : 06 16 17 b1 40

Casablanca, le : 05/01/24

دار البيضاء في : Samlah. Mstafa

123,60x5

1) Fixation gel x 4

18x2/5

pdt 1 mois

92,50x2 1/4 h antigel

2) Afongis 10g gel

903,- Agel 10g pdt 10gr

3) Pyrena gel

65,10 Agel x 4) 5,- pdt 10 gr

4) Ultralav gel

Angle Bd Ahmed Mekouar et Rue de la Plage (Place Flès Ifkak)

1^{er} Best Business Center 1^{er} Etage Appt N°9 Att Sebbat Casablanca

05 22 67 20 98 - Cabinet.naitbella@gmail.com

PHARMACIE ELABAD CASA
Elabdad, 1^{er} Etage N° 31
Tel: 05 22 75 90 15

Dr. AIT BELLA
Hépato-gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
Tél: 06 16 17 b1 40

Docteur Naima Ait Bella

Spécialiste en Hépato-Gastro
Entérologie



- Ex Médecin interne au CHU ibno Rochd Casablanca
- Membre de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie.

- Hépatologie
- Maladies de l'estomac et de l'intestin
- Proctologie Médico - Chirurgicale
- Endoscopie Digestive
- Echographie Abdominale.

الدكتورة نعيمة آيت بل
أخصائية في أمراض الكبد

و الجهاز الهضمي

- طبيبة داخلية سابقة بالمستشفي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء
- عضو بالجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي

- أمراض الكبد
- أمراض المعدة والآماء
- أمراض وجراحة الشرج والبواسير
- الفحص بالمنظار
- الفحص بالصدى

Casablanca, le : ٢٥/٠١/٢٤ الدار البيضاء في:

Dr. Samia Ait Bella

FOD

Dr. AIT BELLA Naima
Hépato-Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
Tél : 06 16 17 01 49

Angle Bd Ahmed Mekouar et Rue de la Plage (Place Fkas Ifkak)

Imm Best Business Center 1^{er} Etage Appt N°9 Ain Sebaa - Casablanca

05 22 67 20 98 - Cabinet.naitbella@gmail.com

CENTRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE IBN ZOHR

Casablanca le 15/01/2024

FACTURE : N°24/0264

NOM ET PRENOM : SAMLALI MOSTAFA

Nature du prélèvement : Duodénum Estomac

Date du prélèvement : 15/01/2024

Montant de : 400, 00 Dh.

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cents dirhams.

Signé



Patente N° 34708372 ICE :001864938000053 INPE :091151944

17 , Louvre centre, Angle Bd Abdelmoumen et Rue Bachir El Alj, App : N°1
(Tramway ,Station Abdelmoumen)- Casablanca



CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR

CENTRE DE PATHOLOGIE
IBN ZOHR

Dr. Hind ALATAWNA

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIQUE

Ordonnance du Docteur : Dr. Ait Bella

Nom et prénom : Samali Moustapha Mr Mme Mlle ENF

Age :

Référence :

Siège et nature du prélèvement : Digestion + External

- Traitements éventuels :

Renseignements cliniques et paracliniques : Epanchement gastrique
au scanner

FOD, Candidose pharyngée
Gastrite aigüe exulcérée Gastrite d'ondation
congestive.

Cytologie :

- Frottis de dépistage : Vagin Exocol Endocol Endomètre

- Date des dernières règles :

Date : 15/01/21

Signature :

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR
Dr. Hind ALATAWNA
ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTE
Louvre Centre RDC Angle
Abdelmoumen et Bachir Laalai
Casablanca - Tel: 05 22 23 37 50

APPLN°9 Aïn Sebaa - Casablanca
Meknès - Centre 40000 Béni Mellal
TBS Business Center 40000 Béni Mellal
GASTRO-ENTEROLOGY
TBS Business Center 40000 Béni Mellal
Dr. HIND ALATAWNA
AL BELLA



CENTRE DE PATHOLOGIE
IBN ZOHR

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR

مركز تشريح الخلايا والأنسجة ابن زهر

Dr. Hind ALATAWNA

RECU LE : 15/01/2024
EDITE LE : 16/01/2024

NOM & PRENOM : SAMLALI MOSTAFA
PRESCRIPTEUR : DR AIT BELLA NAIMA
Age : 69 ANS
N/REF : H40115426

Nature du prélèvement : Duodénum Estomac

Renseignements cliniques :
Epaississement gastrique au scanner
FOGD : Candidose oesophagienne
Gastrite antrale exulcérée
Gastrite fundique congestive.

COMPTE RENDU

Reçu 11 fragments biopsiques de bonne taille mesurant entre 2 et 5 mm de grand axe, sont examinés sur des plans de coupes étagés.

Ils montrent une muqueuse de type duodénal (2F) au relief villositaire préservé.

Les structures épithéliales de surface et glandulaire sont normosécrétantes et bien différenciées. Il n'est pas retrouvé de lymphocytose intraépithéliale.

Le chorion est oedémato-congestif et ponctué d'un discret infiltrat inflammatoire mononucléé lymphoplasmocytaire, associé à un amas lymphoïde de morphologie banale.

La sous muqueuse abrite des glandes de Brünner.

Absence de mise en évidence de lésion granulomateuse.

Absence d'individualisation de giardia lamblia.

La muqueuse gastrique de type antral (5F) et fundique (4F) montre un volume glandulaire global légèrement diminué de volume au niveau de l'antrum. Les structures épithéliales de surface et glandulaires sont partout normosécrétantes et bien différenciées, sans lésion dysplasique. Présence d'une métaplasie intestinale minime au niveau de l'antrum.

Le chorion fibreux abrite un infiltrat inflammatoire d'intensité modérée, polymorphe, composé essentiellement de lymphocytes, de plasmocytes associés à des neutrophiles. Présence d'un foyer de dysplasie de bas grade constitué par des glandes adossées, à revêtement de surface dédifferencier avec nucléole proéminent et des mitoses.

La coloration du Giemsa montre la présence d'HP++ au sein du film muqueux de surface et dans le fond des cryptes.

CONCLUSION :

- Duodénite oedémato-congestive non spécifique.

Absence d'atrophie villositaire.

Absence de giardiase.

-Gastrite chronique antro-fundique modérée, légèrement active, avec métaplasie intestinale minime au niveau de l'antrum et atrophie minime de l'antrum. Présence focale minime d'un foyer de dysplasie de bas grade au niveau antral, avec HP++.

Signé : Dr. Hind ALATAWNA

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ZOHR
Dr. Hind ALATAWNA
ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTE
17 Louvre Centre RIC Angle
Bd. Abdelmoumen et Bachir El Alj
Casablanca - Tél. 05 22 23 37 50



AKDITAL

Hôpital Privé Casablanca Ain Sebaa المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع

Mr SAMLALI MOSTAFA

15/01/2024

Age : 69 ans

ATCD : tabagique chronique, diabétique

RC : admis pour détresse respiratoire, épaississement antro-pylorique au scanner.

Compte rendu de la FOGD

Œsophage : - Cardia à 38 cm des arcades dentaires.

- Ligne Z en place, régulière
- La muqueuse œsophagienne est tapissé de dépôts blanchâtres ne s'effaçant pas au lavage.

Estomac :

- Lac muqueux peu abondant.
- Plis fundiques conservés avec une muqueuse en regard congestive érythémateuse.
(Biopsies)
- La muqueuse antrale est érythémateuse, siège de 3 exulcérations. (Biopsies)

Rétrovision : sans anomalies

Pylore : franchi.

Bulbe : sans anomalies

Duodénum : plis conservés avec une muqueuse duodénale d'aspect normal. (Biopsies)

Conclusion :

Candidose œsophagienne
Gastrite antrale exulcérée.
Gastrite fundique congestive.

Dr. AIT BELLA Naima
Hépatogastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
Tél : 06 16 17 91 40

Lot :
مودع:

Fab :
صنع:

EXP. :
 صالح لغاية:

est déconseillé

est déconseillé

des véhicules

licament.

e poudre pour

ou si vous avez
ar l'incapacité à
ce médicament,

poudre pour

ns de votre

1176 12 2022 12 2025
BIOCODEX MAROC PPV 65.10 DH

La substance active est Saccharomyces boulardii CNM I-745 250 mg sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

Les autres composants sont : lactose monohydraté - stéarate de magnésium - gélatine - dioxyde de titane E171.

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable :

- La substance active est *Saccharomyces boulardii* CNM I-745 250 mg sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).
- Les autres composants sont : lactose monohydraté - fructose - silice colloïdale anhydre - arôme tutti frutti (contenant du sorbitol ; E420).

Qu'est ce que ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur
ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules :

Flacon en verre de 10 gélules.

Plaquette thermoformée (aluminium et aluminium/PVC) de 10, 20, et 30 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable :

Boîte de 10, et 20 sachets-doses.

Nom et adresse du laboratoire fabricant :

BIOCODEX

1 Avenue Blaise Pascal

60000 BEAUVAINS

France

Nom et adresse de l'établissement pharmaceutique industriel titulaire de l'AMM au Maroc :

BIOCODEX Maroc

Technopole Aéroport MV B.P.126 Nouaceur

CASABLANCA

Maroc

Veuillez contacter avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament.

Statut légal de délivrance

Délivrance libre.

Pharmacien Responsable: Ghita OUAJJOU.

La dernière approbation de cette notice date de 04/2021

Information suivante est uniquement destinée aux médecins et autres professionnels de santé

En raison d'un risque de contamination aéroportée, les sachets ou gélules ne peuvent pas être ouverts dans les chambres des patients. Les professionnels de la santé doivent porter des gants durant la manipulation de probiotiques en vue de leur administration, puis les jeter immédiatement après usage et se laver les mains avec soin.

De très rares cas de fongémie (avec une hémoculture positive aux souches de *Saccharomyces*) ont été rapportés principalement chez des patients porteurs d'un cathéter veineux central et chez des patients dans un état critique ou immunodéficients, se traduisant le plus souvent par de la fièvre.

Dans la plupart des cas, l'issu a été satisfaisante après arrêt du traitement par *Saccharomyces boulardii*, administration d'un traitement antifongique et, le cas échéant, retrait du cathéter.

Cependant, chez certains patients dans un état critique, l'issu a été fatale.

Comme avec tout médicament contenant des micro-organismes vivants, une attention particulière doit être portée lors de la manipulation du produit en présence de patients porteurs de cathéter veineux central principalement, mais aussi de patients porteurs de cathéter périphérique, même non traités par *Saccharomyces boulardii*, afin d'éviter toute contamination manuelle et/ou la dissémination des micro-organismes dans l'air.

LOT : M1065
PER : 05/2025
PPV : 92,50 DH

نجيس 150 ملغ

Deva
Pharmaceutique

فلوكونازول

عن طريق الفم

- الرجاء قراءة النشرة كاملة ويعناية قبل البدء بتناول الدواء.
- إذا كان لديك إستفسار آخر أو شك، أطلب المزيد من المعلومات إلى طبيبك أو الصيدلاني.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً لا تعطه إلى أي شخص آخر حتى ولو كان لديه نفس الأعراض التي لديك لأنّه من الممكن أن يضر به.
- إذا أصبحت بعض الآثار الجانبية خطيرة أو لاحظت آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة فالمرجو إخبار الطبيب أو الصيدلاني.

التركيب :

أفونجيس 150 ملغ

فلوكونازول 150 ملغ

سواغ كمية كافية لكبسولة واحدة.

دواعي الاستعمال :

أفونجيس يستعمل ضد الفطريات المضرة (يمنع تكاثر الفطريات المجهريّة) يجب لزوم إتباع الوصفة الطبية.

مضادات الاستعمال :

- حساسية ضد فلوكونازول.

- استعمال دواء من فئة سيزابيريد في نفس الوقت.

- المرأة الحامل أو المرضع.

التأثيرات الغير مرغوب فيها :

اضطرابات هضمية : غثيان، آلام في البطن، إسهال.

اضطرابات جلدية.

صداع الرأس.

احتياطات عند الاستعمال :

LOT : M1065
PER : 05/2025
PPV : 92,50 DH

نجيس 150 ملغ

Deva
Pharmaceutique

فلوكونازول

عن طريق الفم

- الرجاء قراءة النشرة كاملة ويعناية قبل البدء بتناول الدواء.
- إذا كان لديك إستفسار آخر أو شك، أطلب المزيد من المعلومات إلى طبيبك أو الصيدلاني.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً لا تعطه إلى أي شخص آخر حتى ولو كان لديه نفس الأعراض التي لديك لأنّه من الممكن أن يضر به.
- إذا أصبحت بعض الآثار الجانبية خطيرة أو لاحظت آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة فالمرجو إخبار الطبيب أو الصيدلاني.

التركيب :

أفونجيس 150 ملغ

فلوكونازول 150 ملغ

سواغ كمية كافية لكبسولة واحدة.

دواعي الاستعمال :

أفونجيس يستعمل ضد الفطريات المضرة (يمنع تكاثر الفطريات المجهريّة) يجب لزوم إتباع الوصفة الطبية.

مضادات الاستعمال :

- حساسية ضد فلوكونازول.

- استعمال دواء من فئة سيزابيريد في نفس الوقت.

- المرأة الحامل أو المرضع.

التأثيرات الغير مرغوب فيها :

اضطرابات هضمية : غثيان، آلام في البطن، إسهال.

اضطرابات جلدية.

صداع الرأس.

احتياطات عند الاستعمال :

HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION

These highlights do not include all the information needed to use PYLERA® effectively. See full prescribing information for PYLERA.

PYLERA (bismuth subcitrate potassium, metronidazole for oral use)

Initial U.S. Approval: 2006

PYLERA® gélules

Boîte de 1 flacon de 120.

AMM N°281 DMP / 21 / NNP

PPV : 803,00 DH

Titulaire de l'AMM / Distributeur

SOTHEMA, B.P.N° 1.27182 Bourg-en-Bresse, MAROC



6 118001 072262

WARNING: POTENTIAL FOR CARCINOGENICITY

See full prescribing information for complete warning.

Metronidazole has been shown to be carcinogenic in mice and rats. It is unknown whether metronidazole is associated with carcinogenicity in humans (5.1).

RECENT MAJOR CHANGES

Warnings and Precautions, Drugs Interactions (5.14)

03/2021

INDICATIONS AND USAGE

PYLERA is a combination of metronidazole, a nitroimidazole antimicrobial, tetracycline, - a tetracycline class antimicrobial and bismuth subcitrate potassium, indicated for use, in combination with omeprazole, for the treatment of patients with *Helicobacter pylori* infection and duodenal ulcer disease (active or history of within the past 5 years) to eradicate *H. pylori*. (1.1)

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of PYLERA and other antibacterial drugs, PYLERA should be used only to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria. (1.2)

DOSAGE AND ADMINISTRATION

- Administer three PYLERA capsules 4 times a day (after meals and at bedtime) for 10 days.
- Administer PYLERA with omeprazole 20 mg twice daily (after the morning and evening meals).

DOSAGE FORMS AND STRENGTHS

Each capsule of PYLERA contains: (3)

- 140 mg of bismuth subcitrate potassium
- 125 mg metronidazole
- 125 mg of tetracycline hydrochloride

CONTRAINDICATIONS

- Concurrent usage of Methoxyflurane.(4.1, 7.1)
- Disulfiram usage within the last two weeks.(4.2, 7.2)
- Alcoholic beverage consumption for at least three days during or after therapy.
- Severe liver disease.

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. INexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Adultes

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.
- Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une excroissance au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).
- La poursuite du traitement de INexium par voie intraveineuse après prévention de la récidive hémorragique d'un ulcère.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

Ne prenez jamais INexium :

Si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (p. ex., pantoprazole, omeprazole).

Si vous prenez un médicament :

SYNTHMEDIC
22 rue soult al aquam roches
noires casablanca
INEXIUM
Cf GR
40 mg
Boite 14
641756MP/21NRO P.P.V.: 123,60 DH
6 118001 020607
KEM61601

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.
- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement. Parfois, les cloques peuvent être sévères et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres,

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. INexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Adultes

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.
- Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une excroissance au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).
- La poursuite du traitement de INexium par voie intraveineuse après prévention de la récidive hémorragique d'un ulcère.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

Ne prenez jamais INexium :

- Si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (p. ex., pantoprazole, omeprazole).
- Si vous prenez un médicament :

SYNTHMEDIC
22 rue soubeir, marrakech aquam roches
INEXIUM
40 mg C.G.R.
Boîte 14
641750MP/21NRO P.P.V.: 123,60 DH
6 118001 020607

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.
- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement. Parfois, les cloques peuvent être sévères et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres,

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. INexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Adultes

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.
- Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une excroissance au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).
- La poursuite du traitement de INexium par voie intraveineuse après prévention de la récidive hémorragique d'un ulcère.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

Ne prenez jamais INexium :

Si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (p. ex., pantoprazole, omeprazole).

Si vous prenez un médicament :

SYNTHMEDIC
22 rue soult al aquam roches
noires casablanca
INEXIUM
Cf GR
40 mg
Boite 14
641756MP/21NRO P.P.V.: 123,60 DH
6 118001 020607
KEM61601

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.
- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement. Parfois, les cloques peuvent être sévères et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres,

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. INexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Adultes

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.
- Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une excroissance au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).
- La poursuite du traitement de INexium par voie intraveineuse après prévention de la récidive hémorragique d'un ulcère.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

Ne prenez jamais INexium :

Si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (p. ex., pantoprazole, omeprazole).

Si vous prenez un médicament :

SYNTHMEDIC
22 rue soult al aquam roches
noires casablanca
INEXIUM
Cf GR
40 mg
Boite 14
641756MP/21NRO P.P.V.: 123,60 DH
6 118001 020607

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.
- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement. Parfois, les cloques peuvent être sévères et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres,

Notice : Information du patient

INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
3. Comment prendre INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que INexium et dans quels cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. INexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Adultes

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.
- Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une excroissance au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).
- La poursuite du traitement de INexium par voie intraveineuse après prévention de la récidive hémorragique d'un ulcère.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium

Ne prenez jamais INexium :

Si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (p. ex., pantoprazole, omeprazole).

Si vous prenez un médicament :

SYNTHMEDIC
22 rue soult al aquam roches
noires casablanca
INEXIUM
Cf GR
40 mg
Boite 14
641756MP/21NRO P.P.V.: 123,60 DH
6 118001 020607

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés :
 - Mettez les comprimés dans un verre d'eau plate (non gazeuse). Aucun autre liquide ne doit être utilisé.
 - Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent (le mélange ne sera pas clair). Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange juste avant de le boire.
 - Afin de prendre la totalité du médicament, rincez bien le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne les mâchez pas et ne les croquez pas.
- Si vous ne pouvez pas du tout avaler, le comprimé peut être mélangé à de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors vous être administré directement dans l'estomac par « sonde gastrique ».

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans. L'information sur la posologie pour les enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans la notice de INexium sachet (demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Personnes âgées

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement. Parfois, les cloques peuvent être sévères et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres,