

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :	3687	Société :	R
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	MAKHLOUKI MUSAPHA
Nom & Prénom :		Date de naissance :	
23-1-1953		Adresse :	
Tél. : 06 64 87 55 60		Total des frais engagés : 660.90 Dhs	

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 02 FEV. 2024

Nom et prénom du malade : 17 AKMLOUKI Rustyin Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : *laryngite* *pediculosis capitis*

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 17/02/2024 Le : 05 FEV. 2024

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07 FEV 2024	C	1	200,-	Dr. SAIDI N° 356 AV. Hassan II Casablanca Dr. Mohammedi Tel. 00-20-20

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE AL MAMOUDIA Mr. Mme BENMOUADIA Oufaa tel: 0522 24 80 54 Fax: 0522 24 85 44 GSM: 05 89 51 62 81</i>	02/02/24	460,90

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
ODF PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur SANDAOUI Mostafa

Omnipraticien

Ancien Médecin à L'hôpital AL Hassani
Nador

356, Av. Chouhada (en Face Cinéma Saâda)
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél : 05 22 60 20 20

الدكتور سنداوي مصطفى

الطب العام

طبيب سابق بمستشفى الحسني
الناظور

356, مح الشهاد (مقابل سينما السعادة)
الحي المحمدي - الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 60 20 20

02 FEV. 2024

NAKHLONKI Mustapha

50.00

4 Nastagh 500

40.80 light 3/ + D

21 Xyfall 17

17.00 duffalhi ay

31 Sors kiyah

169.50 1 gr x 2/ ay

44 Ciment Zts

49.50 1 gr + 1 ngr

57 hizm lew al

38.70 x 4 eff lgh hi

6/ tenshif er

460.90 1 gr x 2/ + 3 7

PHARMACIE AL MASSIRA
Dr. M. S. S. N. A. B. A. O. S. A. O. S. A.
Tél: 05 22 60 20 20 / 05 22 65 47
Fax: 05 22 60 20 20 / 05 22 65 47
Oujda : 05 23 51 62 81

Dr. SANDAOUI Mostafa
356 AV. CHOUHADA
Hay Mohammadi - Casablanca
05 22 60 20 20

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE – code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament

sert à :

- Soigner la dépression chez les adultes (épisodes dépressifs majeurs)
- Soulager les douleurs neuropathiques chez les adultes
- Prophylaxie des céphalées de tension chez les adultes
- Traitement de fond de la migraine chez les adultes
- Soigner l'enurésie (pipi au lit) nocturne chez les enfants de 6 ans et plus, uniquement lorsque des causes organiques, telles que spina bifida et troubles associés, ont été exclues et en l'absence de réponse à tous les autres traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, y compris les relaxants musculaires et la desmopressine. Ce médicament doit être prescrit uniquement par des médecins expérimentés dans la prise en charge de l'enurésie persistante.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé:

- si vous êtes allergique à l'amitriptyline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez récemment eu une attaque cardiaque (infarctus du myocarde)
- si vous avez eu des problèmes cardiaques tels que des troubles du rythme que l'on détecte à l'électrocardiogramme (ECG), un bloc cardiaque, ou une insuffisance coronarienne
- si vous prenez des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO).
- si vous avez pris des IMAO au cours des 14 derniers jours
- si vous avez pris du moébémamide la veille

Énurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'enurésie.

Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent altérer l'action d'autres médicaments et cela peut parfois entraîner des effets indésirables graves.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, tel que :

- des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), par ex. phénelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide ou tranylcypromine (pour la dépression), ou sélegiline (pour la maladie de Parkinson). Ces médicaments ne doivent pas être pris en même temps que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé (voir la rubrique 2 Ne prenez pas LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé),
- adrénaline, éphédrine, isoprévaline, noradrénaline, phényléphrine et phénylpropanolamine (ceux-ci peuvent être présents dans des médicaments contre la toux ou le rhume, et dans certains anesthésiques),
- des médicaments contre l'hypertension, par exemple des inhibiteurs des canaux calciques (par ex. diltiazem et vérapamil), guanéthidine, bétanidine, clonidine, réserpine et méthyldopa,
- médicaments anticholinergiques comme certains médicaments pour traiter la maladie de Parkinson et des troubles gastro-intestinaux (par ex. atropine, hyoscymine),
- thioridazine (pour la schizophrénie),
- tramadol (analgésique),
- médicaments contre les infections fongiques [par ex. fluconazole, terbinafine, kétoconazole],
- sédatifs (par ex. barbituriques),
- antidépresseurs (par ex. IS [imipramine], fluvoxamine), duloxétine et
- médicaments pour certaines maladies neurologiques [par ex. bloquants et antiarythmiques],
- cimétidine (contre les ulcères),
- méthylphénidate (pour le TDAH),
- ritonavir (pour le VIH),
- contraceptifs oraux.

6 118001 040384
LAROXYL 25 mg
(Chlorhydrate d'amitriptyline)
60 comprimés pelliculés
BOTTU S.A. PPV: 38 DH 70
JANUARY 2010

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDEPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE - code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament sert à :

- Soigner la dépression chez les adultes (épisodes dépressifs majeurs)
 - Soulager les douleurs neuropathiques chez les adultes
 - Prophylaxie des céphalées de tension chez les adultes
 - Traitement de fond de la migraine chez les adultes
 - Soigner l'enurésie (pipi au lit) nocturne chez les enfants de 6 ans et plus, uniquement lorsque des causes organiques, telles que spina bifida et troubles associés, ont été exclues et en l'absence de réponse à tous les autres traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, y compris les relaxants musculaires et la desmopressine. Ce médicament doit être prescrit uniquement par des médecins expérimentés dans la prise en charge de l'enurésie persistante.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Enurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'enurésie.

Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent altérer l'action d'autres médicaments et cela peut parfois entraîner des effets indésirables graves. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, tel que :

- des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), par ex. phénelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide ou tranylcypromine (pour la dépression), ou sélegiline (pour la maladie de Parkinson). Ces médicaments ne doivent pas être pris en même temps que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé (voir la rubrique 2 Ne prenez pas LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé),
- adrénaline, éphédrine, isoprénaline, noradrénaline, phényléphrine et phénylpropanolamine (ceux-ci peuvent être présents dans des médicaments dans certains anesthésiques)
- des médicaments contre l'hypertension (par ex. les inhibiteurs des canaux de calcium : verapamil), guanéthidine, bêta-méthildopa,
- médicaments anticholinergiques pour traiter la maladie de Fibrosing colique intestinale (par ex. atropine).



6 118001 040384

LAROXYL 25 mg

(Chlorhydrate d'amitriptyline)

60 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV: 38 DH 70

LIOTON® 1000 gel

héparine sodique

109P5D

COMPOSITION

100 g de gel contiennent:

Principe actif: 100 000 U.I. d'héparine sodique.

Excipients: carbomère, méthyle p-hydroxy-benzoate, propyle p-hydroxy-benzoate, essence de néroli, essence de lavande, éthanol, triethanolamine, eau purifiée.

Excipients à effet notoire: méthyle p-hydroxy-benzoate, propyle p-hydroxy-benzoate.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Syndromes variqueux et leurs complications; phlébothromboses, thrombophlébites, périphlébites superficielles, ulcères variqueux.

Varicophlébites post-opératoires, séquelles de saphènectomie.

Traumatismes et contusions; infiltrats et œdèmes localisés; hématomes sous-cutanés. Affections traumatiques des appareils musculo-tendineux et capsulo-ligamentueux.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité individuelle liée au produit.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTION D'EMPLOI

LIOTON ne doit pas être appliqué en cas de saignement, sur des blessures ouvertes et sur les muqueuses, ainsi que sur les sièges d'infection, en cas de processus suppuratifs. L'emploi de LIOTON en présence de phénomènes hémorragiques doit être évalué attentivement.

L'utilisation, en particulier prolongée, de produits topiques peut engendrer des phénomènes de sensibilisation; dans ce cas, il faut interrompre le traitement et instaurer une thérapie appropriée.

Il n'y a pas de données spécifiques concernant l'utilisation de la préparation en cas de grossesse et d'allaitement.

Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce médicament, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

L'administration d'héparine peut prolonger ultérieurement le temps de prothrombine chez des patients traités avec des anticoagulants oraux.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

De une à trois applications par jour; étaler, sur la zone cutanée concernée, 3-10 cm de gel, en massant délicatement.

SURDOSAGE

Jusqu'à présent, aucun phénomène lié au surdosage n'a été décrit. Si un tel phénomène devait se produire, le sulfate de protamine peut être utilisé comme antagoniste de l'effet de l'héparine.

EFFETS SECONDAIRES.

L'utilisation, en particulier prolongée, de produits topiques peut engendrer des phénomènes de sensibilisation.

Communiquer au médecin traitant ou au pharmacien tout effet non désiré qui n'est pas décrit dans ce feuillet illustratif.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

30 g, 50 g de gel pour utilisation topique contiennent 100 000 U.I.%

CONSERVATION:

A conserver à température inférieure à 25° C et à l'abri de la chaleur.

LISTE II

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas dépasser la dose prescrite.

Date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois: Févr.

Fabriqué par:

A. MENARINI Manufacturing Logistics and Services
s.r.l. - Florence - Italie

* VIGNETTE
Lioton® 1000 gel
tube de 50g
PPV 49DH50

Distribué par :

LABORATOIRES PHARMACEUTICAL INSTITUTE

BP 4491 - 12100 Ain El Aouda - MAROC

h.i PHARMACIEN RESPONSABLE : Maria SEDRATI



Comprimé
Voie orale

curarti® forte

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de bêta-cyclodextrine (humectant) et de curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma-Curcuma longa standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), antiagglomérant (dioxyde de silicium), stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), antiagglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux), molybdate d'ammonium, agent d'enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, cellulose, acides gras et colorants (oxyde de fer).

PROPRIETES :

Curarti® forte contribue à la mobilité et au confort articulaires tout en limitant l'usure du cartilage.

CONSEILS D'UTILISATION :

Phase d'attaque : 1 comprimé 2 fois par jour.

Phase d'entretien : 1 comprimé par jour.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Respecter la dose journalière conseillée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À conserver au sec et à l'abri de la lumière.

Complément alimentaire, ce n'est pas un mé-

PPC : 149,50 DH

Lot :

À consommer de préférence avant le :

curarti® forte
comprimé



Fabriqué par PLAMECA - Espagne.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma.

Autorisation Ministère de la santé n° : 20221406630/MAV4/CA/D



Notice : Informations de l'utilisateur



XYZALL® 5 mg, comprimé pelliculé

Dichlorhydrate de lévocétirizine
Boîtes de 14 ou de 28

Adultes et enfants à partir de 6 ans

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Antihistaminiques à usage systémique, dérivés de la pipérazine, code ATC : R06AE09

Le dichlorhydrate de lévocétirizine est la substance active de XYZALL.

XYZALL est un médicament utilisé dans le traitement de l'allergie.

XYZALL est indiqué pour le traitement des symptômes associés à :

- la rhinite allergique (incluant la rhinite allergique persistante) ;
- des démangeaisons et rougeurs (urticaire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au dichlorhydrate de lévocétirizine, à la cétrizine, à l'hydroxyzine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre XYZALL.

Si vous êtes susceptible de ne pas pouvoir vider votre vessie (en raison d'une lésion de la moelle épinière ou d'une augmentation du volume de la prostate), veuillez demander conseil à votre médecin.

Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin, l'utilisation de XYZALL peut provoquer une aggravation des crises.

Si vous avez prévu de faire des tests d'allergie, demandez à votre médecin si vous devez arrêter de prendre XYZALL pendant plusieurs jours avant le test. Ce médicament peut affecter les résultats de vos tests d'allergie.

Enfants

XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé n'est pas adapté à l'enfant de moins de 6 ans, la forme comprimé ne permettant pas l'adaptation de la dose.

Autres médicaments et XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, des boissons et de l'alcool

La prudence est recommandée en cas de prise d'alcool ou d'autres substances agissant sur le cerveau en même temps que XYZALL.

Chez les patients sensibles, la prise d'alcool ou d'autres substances agissant sur le cerveau en même temps que XYZALL peut entraîner une réduction plus importante de la vigilance et des performances.

XYZALL peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité:

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Certains patients traités par XYZALL peuvent ressentir somnolence/endormissement, fatigue et épuisement. Par conséquent, soyez prudent si vous devez conduire ou utiliser une machine jusqu'à ce que vous sachiez comment vous réagissez à ce médicament. Cependant, aux doses recommandées, il n'a pas été mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire au cours des tests réalisés chez des volontaires sains.

XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé contient du lactose

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE XYZALL 5 mg

VEUillez à toujours prendre ce médicament de votre médecin ou pharmacien, pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée chez l'adulte comprimé par jour.

Utilisation chez des populations particulières

Insuffisance rénale et hépatique

Chez les patients présentant une insuffisance rénale en réduisant la dose en fonction de la sévérité de l'insuffisance.

Chez les enfants, le poids corporel sera pris en compte pour déterminer la dose.

Les patients présentant une insuffisance hépatique peuvent prendre la dose recommandée.

Chez les patients présentant seulement une insuffisance rénale, il suffit de prendre le médicament à la dose normale prescrite.

Chez les patients présentant à la fois insuffisance rénale et hépatique, la posologie pourra être adaptée en fonction de la gravité de l'insuffisance rénale.

Chez les enfants, le poids corporel sera pris en compte pour déterminer la dose.

La dose adaptée sera déterminée en fonction de l'âge et de la sévérité de l'insuffisance rénale.

Chez les enfants, le poids corporel sera pris en compte pour déterminer la dose.

Patients âgés de 65 ans et plus : Il n'y a pas lieu d'ajuster la dose chez ces patients.

Chez les patients présentant une insuffisance rénale et hépatique, la posologie pourra être adaptée en fonction de la gravité de l'insuffisance rénale.

Chez les patients présentant à la fois insuffisance rénale et hépatique, la posologie pourra être adaptée en fonction de la gravité de l'insuffisance rénale.

LOT 230300 1

EXP 12 2026

PPV 40 10



Xyzall 5 mg

Boîte de 14 comprimés pelliculés
AMM N° 21/190/MP/21/NR/CDN



6 118000 021582

SORBHEPATIC®

FORME ET PRÉSENTATION

Comprimés effervescents : tube de 20

COMPOSITION

• Sorbitol	1,500 g
• Phosphate disodique anhydre	0,050 g
• Sulfate de sodium anhydre	0,025 g
• Excipient q.s.p	1 comprimé

PHARMACODYNAMIE

Le sorbhepatic est une association conférant au produit un effet cholagogue doux et neutralisant de l'acide chlorhydrique en excès dans l'estomac.

Le sorbitol en plus de ses actions cholécystokinétique et cholérétique, accélère le transit intestinal, stimule le péristaltisme en déclenchant la sécrétion de la villikinine et augmente l'apport des enzymes pancréatiques en déclenchant la sécrétion de la pancréozymine.

INDICATIONS

- Dyspepsie
- Pesanteurs
- Constipation
- Dyskinésies biliaires

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

1 comprimé à dissoudre dans 1/2 verre d'eau avant les repas.

En cas de constipation : 2 comprimés au coucher et 2 comprimés le matin à jeûn.

PRÉCAUTIONS

Etant donné sa teneur en sodium (245 mg par comprimé), il faut l'utiliser avec précaution chez les malades soumis à un régime désodé strict.

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE

Sodium environ 245 mg par comprimé

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : su

pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses cons

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en gr

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous av

NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Our

26499F56558P1010

SORBHEPATIC®

FPPV 17DH00
EXP 01/2026
LOT 32022 3

SORBHEPATIC®
20 comprimés
effervescents



6 118000 031956

ASTAPH®

(Flucloxacilline)

Composi:

- Formes orales :

Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

Excipient qsp 1 gélule.

Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) par cuillère-mesure de 5ml.

Poudre pour suspension buvable à 125 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 125 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) par cuillère-mesure de 5ml.

- Formes injectables :

Injectable à 250 mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

+ ampoule de 3ml d'eau P.P.I.

Injectable à 500mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3%.

Injectable à 1 g :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 1 g (sous forme de sel sodique monohydraté)

+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3%.

Propriétés :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines semi-synthétiques du groupe M, résistant à la pénicillinase staphylococcique. La flucloxacilline est un bactéricide.

Le spectre d'activité : Staphylococcus auréus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyrogènes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium spp, Bacillus anthracis, Neisseria spp.

Indications :

Infections à germes sensibles :

- infections de la peau et des tissus mous;
- infections ostéo-articulaires;
- infections des voies respiratoires;
- infections de la sphère ORL;
- Septicémie, entérocolite, ostéomyelite, méningite et endocardite à staphylocoques.

Contre-indications :

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines).

Mises en garde et précautions d'emploi :

- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois mortelles sont parfois observées chez des malades traités par les pénicillines M. leur interrogatoire préalable. Devant des antécédents d'allergie typique il est formelle.
- En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie.
- Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison de compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère).

50DH

Grossesse et allaitement :

Grossesse : la flucloxacilline doit être utilisée avec précaution.

Allaitement : La flucloxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une transmission à l'enfant doit être envisagée.

Effets indésirables :

- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT).
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies.



NÔTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDEPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE - code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament sert à :

- Soigner la dépression chez les adultes (épisodes dépressifs majeurs)
- Soulager les douleurs neuropathiques chez les adultes
- Prophylaxie des céphalées de tension chez les adultes
- Traitement de fond de la migraine chez les adultes

Énurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'énurésie.

Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent altérer l'action de Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé et cela peut parfois entraîner de graves réactions. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment pris ou pourriez prendre :

- des inhibiteurs de la monoamine ex. phénelzine, iproniazide, tranylcypromine (pour la dépression et la maladie de Parkinson). Ces médicaments doivent être pris en même temps que Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé (voir la rubrique 2 Ne prendre pas avec...).



6 118001 040384
LAROXYL 25 mg

(Chlorhydrate d'amitriptyline)
60 comprimés pelliculés
BOTTU S.A.

PPV: 38 DH 70

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Laroxyl 25 mg, comprimé pelliculé

Amitriptyline



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE – code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament sert à :

- Soigner la dépression chez les adultes (épisodes dépressifs majeurs)
- Soulager les douleurs neuropathiques chez les adultes
- Prophylaxie des céphalées de tension chez les adultes
- Traitement de fond de la migraine chez les adultes

Énurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'énurésie.

Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables et cela peut parfois entraîner

- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment pris ou pourriez prendre :
- des inhibiteurs de la monoamine ex. phénrizine, iproniazide, tranylcypromine (pour la maladie de Parkinson). Ces médicaments doivent être pris en même temps que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé.



6 118001 040384
LAROXYL 25 mg
(Chlorhydrate d'amitriptyline)
60 comprimés pelliculés
BOTTU S.A. PPV: 38 DH 70